



علم الأمراض والطب الشرعي



الدكتورة

مها أبو ياسين
إختصاصي علم الأمراض

الدكتور

محمود حرزالله
إختصاصي الطب الشرعي

علم الأمراض
والطب الشرعي

علم الأمراض والطب الشرعي

الدكتور
مها أيو ياسين
اختصاصي علم الأمراض

الدكتور
محمود حرز الله
اختصاصي الطب الشرعي

الطبعة الأولى

1431هـ-2010م

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة
المكتبة الوطنية
2010

حرز الله، محمود

علم الأمراض والطب الشرعي / محمود حرز الله. - عمان: دار زهران،
2010.

() ص.

الواصفات: / علم الأمراض // الطب الشرعي //

✦ أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف للأرشفة
✦ يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصلحه ولا يعرضها للمصلح عن
دلي دائرة المكتبة الوطنية لم أي جهة حكومية أخرى.

Copyright ©
All Rights Reserved

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزين مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي وجه أو بأي
طريقة إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل وبخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على
هذا الكتاب مقدماً .

المتخصصون في الكتاب الجامعي الأكاديمي العربي والأجنبي

دار زهران للنشر والتوزيع

تلفاكس : 5331289 - 6 - +962، ص.ب 1170 عمان 11941 الأردن

E-mail : Zahran.publishers@gmail.com

www.darzahran.net

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ان اعتقادنا بأهمية مادتي علم الأمراض والطب الشرعي وعلاقتيهما الحميمة دفعا لأن نقوم بإعداد هذا الكتاب والمرجع التعليمي والتثقيفي بحيث شمل أهم القواعد المبدئية والبنية التحتية لهذه العلوم آخذين بعين الاعتبار وعلى وجه الخصوص منهاج المواضيع المقررة من قبل وزارة التعليم العالي ليكون خير معين للطلاب على جميع المستويات واختلاف التخصصات في معاهد التمريض المساعدة، كليات المجتمع والجامعات الخاصة بما فيه طلاب الطب وأفراد المجتمع على اختلاف ثقافتهم وتنوع اعمالهم وذلك لاستيعاب بعض النواحي الطبية وكيفية تطبيقها وتكييفها في شتى المجالات الطبية العامة والقضائية العملية خاصة والتي أصبحت جزءاً ضرورياً في شتى مجالات حياة الانسان وعلى المستوى اليومي في عصرنا هذا .

وعمدنا ما وسعنا الجهد ان تكون لغة هذا الكتاب اللغة العربية - الانجليزية المبسطة والواضحة ليكون سهلاً في متناول كل انسان مثقف وخاصة الطلاب وفقاً للمقررات التدريسية المفروضة عليهم كل حسب الصرح التعليمي والتخصص الذي ينتمي اليه .

نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا الى ما نصبو اليه وأن يلهمنا ويسدد خطانا في تشييد مستقبل ونخير أمتنا الزاهر .

المؤلفان

الفهرس

علم الأمراض

- ١- مقدمة في علم الأمراض ١١
- ٢- الخلية ١٩
- ٣- الالتهاب ٢٧
- ٤- العدوى ٣٥
- ٥- المناعة ٥٩
- ٦- الأورام ٧٩
- ٧- التوازن الحامضي - القاعدي واضطرابات الدورة الدموية ٨٩
- ٨- القلب والأوعية الدموية ١١٩
- ٩- الدم والعقد اللمفاوية ١٤٥
- ١٠- الجهاز التنفسي ١٥٧
- ١١- الجهاز الهضمي ١٧٧
- ١٢- الكبد، المرارة، البنكرياس ١٩٣
- ١٣- الجهاز البولي التناسلي ٢١٥
- ١٤- الجهاز التناسلي الأنثوي ٢٢٩
- ١٥- أمراض الثدي ٢٣٩
- ١٦- العظام ونقي العظم ٢٥١
- ١٧- الغدد الصماء ٢٥٩

الطب الشرعي

- ١- لمحة تاريخية - والحالات الطبية القضائية ٢٧١
- ٢- الاستمراف ٢٩٧
- ٣- الجروح والإصابات ٣٢٩
- ٤- جروح الأعيرة النارية ٣٥٨
- ٥- الحروق ٣٧١
- ٦- الجرائم الجنسية ٣٨١
- ٧- الإجهاض غير المشروع ٤٠٣
- ٨- الموت وعلامات الوفاة ٤١٥
- ٩- موت الفجأة ٤٢٩
- ١٠- الإختناق (Asphyxia) ٤٤١
- ١١- الفرق ٤٥٧
- ١٢- الطب الشرعي النفسي ٤٦٣

الوحدة الأولى

الوحدة الأولى

مقدمة في علم الأمراض

• التعريف

• طرق بحث ودراسة المرض .

• مبادئ التحضير النسيجي .

يعتمد الطالب في فهم علم الأمراض على فهم مضمون المرض الذي يعرف ببساطة على أنه تفاوت تركيبي و / أو وظيفي يخرج عن معدل التوازن الطبيعي « الفسيولوجي » للجسم، ومن هنا يمكن تعريف علم الأمراض على أنه العلم الذي يبحث في ماهية نشوء المرض من حيث الأسباب، الآلية الميكانيكية، التطور مع وصف للتغيرات النسيجية وما يترتب على ذلك من أعراض سريرية ومضاعفات عامة .

لذا يُعد من أهم العلوم الطبية كحجر أساس تعتمد عليه الممارسة العملية في العلوم الطبية العامة والجراحية على حد سواء .

الدراسة العلمية الاكاديمية (Scientific Study)

المرض (Disease)

تفاوت تركيبي و/ أو وظيفي
يخرج عن المعدل الفسيولوجي



علم الأمراض (Pathology)

- الأسباب (Causes) بما فيها

الآلية (Pathophysiology)

- الأعراض (Manifestations)

- التقدم بما فيه تطور العلاقات

(Progress, incl Sequels)



الممارسة السريرية (Clinical Practice)

العلاج والجراحة (Medicine and Surgery)

- التشخيص (Diagnosis)

- المصير - العلاج - الوقاية

(Prognosis - Therapy and Prophylaxis)

وخلاصة ما تقدم يبدو واضحاً أن هناك علاقة وطيدة بين التركيب التشريحي والوظيفة الفسيولوجية من ناحية والمرض من ناحية أخرى وما ينعكس عن ذلك من أعراض ومضاعفات نتيجة حدوث تلف أو ضرر ما تحت تأثير عامل مؤذ .

المرض = تفاعل الجسم + عامل مؤذ → تلف أو ضرر
(Damage) (Harmful Agent) + (Body's Reaction) = (Disease)

لذا نجد أن طرق بحث ودراسة المرض في علم الأمراض تعتمد على تقسيم هذا العلم الى قسمين رئيسيين يساند كل منهما الآخر من حيث النوعية والأهمية :

١- علم الأمراض السريري (Clinical Pathology)

ويندرج هنا :

- أ- علم الخلايا (Cytology) ويدرس الخلايا في مختلف سوائل الجسم .
- ب- علم الدمويات (Haematology) .
- ج- علم الجراثيم (Bacteriology) .
- د- الكيمياء الحيوية (Biochemistry) .
- هـ- علم المناعيات (Immunology) .

٢- علم الأمراض التشريحي (Surgical Anatomical Pathology)

والذي يعتمد في الممارسة العملية على فحص التغيرات في الخلية (Cell) ومن ثم النسيج (Tissue) بواسطة المشاهدة بالعين المجردة (Gross) وبالتالي المجهر الضوئي (Light Microscope) ومن هنا يتضح ضرورة المعرفة الدقيقة لعلم النسيج (Histology)، من أجل فهم التفاوت في التغيرات الفسيولوجية - المرضية على مستوى الخلية الواحدة ومن ثم النسيج والعضو كوحدة متكاملة .

- ولعل مما تقدم شرحه سابقاً يبدو واضحاً ضرورة التعاون بين الأقسام العلاجية الجراحية والمخبرية التشخيصية من أجل تحضير عينة نسيجية .

- مبادئ التحضير النسيجي :

- ١- تؤخذ عينة نسيجية من الجزء المريض في جسم الإنسان .
- ٢- توضع العينة ضمن مثبت خاص عادة هو الفورمالين بتركيز ١٠٪ بحيث يكون حجم المثبت المغمور فيه النسيج عشرة أضعاف حجم النسيج في وعاء مناسب الحجم والشكل مع اغلاقه بإحكام، وضع ملصق على الجدار الخارجي لهذا الوعاء يكتب عليه اسم المريض ، العمر، الجنس (ذكر أو أنثى) مصدر العينة، اسم الطبيب وعنوانه .
- ملاحظة : يعتبر الفورمالين بتركيز ١٠٪ أكثر المحاليل المستخدمة روتينياً لغايات التثبيت والحفظ حيث أن الهدف من عملية التثبيت هو حفظ النسيج من التحلل التعفن، والإنحلال الذاتي وبالتالي المحافظة على التركيب الخلوي والنسيجي للعينة في حالة مشابهة جداً من حالتها الحية .
- ٣- يرفق مع الوعاء نموذج طبي يوضح ما سبق بالإضافة الى السيرة المرضية والتشخيص السريري .
- ٤- ترسل العينة الى مختبر قسم التشريح المرضي حيث يقوم الفني بإستلامها وذلك بتدوين العينة في سجل عام بتاريخ الإستلام مع اعطاء كل عينة رقم متسلسل وتسجيل جميع المعلومات المدونة على النموذج في السجل .
- ٥- يقوم الفني بترتيب العينات على طاولة التشريح بشكل متسلسل مضيفاً إلى كل عينة كيمولات خاصة يكتب عليها رقم العينة بالرقاص حتى لا يذوب في المحاليل .

٦- يقوم الطبيب بأخذ مقاطع نسيجية رقيقة لا تزيد سماكتها عن ٣-٥ مم توضع داخل الكبسولات المرفقة وهذه يتم جمعها في سلة خاصة مع تدوين الملاحظات والملاحظات الخاصة بكل عينة على النموذج الطبي الخاص بها .

٧- توضع السلة في جهاز معالجة الأنسجة (Tissue Processor) (Fixation) الذي يحتوي على محاليل التثبيت كالفورمالين والتجفيف كالكحول (Dehydration) التنقية كالزيلين أو الكلوروفورم (Clearing) ثم الأشباع بشمع البرافين (Parafin Im- pregnation) حيث تبقى في الجهاز ضمن برنامج زمني مبرمج لها .

٨- عملية الطمر (الإدماج بشمع البرافين Embedding) :

تؤخذ العينات من جهاز المعالجة وتوضع في قوالب خاصة ويصب عليها شمع البرافين لتصبح قالباً شمعيًا يحتوي على المقاطع النسيجية.

٩- عملية التقطيع (Microtomy) :

يتم تقطيع (Cutting) القوالب الشمعية إلى شرائح نسيجية لا تزيد سماكتها عن (٥) ميكرون بواسطة جهاز التقطيع (Microtome) .

١٠- عملية التحميل « اللصق » (Mounting) :

توضع هذه الشرائح النسيجية في حمام مائي لا تزيد درجة الحرارة فيه عن (٦٠) درجة مئوية ثم تحمل على شرائح زجاجية نظيفة مع الانتباه لضرورة كتابة أرقام العينات على هذه الشرائح الزجاجية قبل عملية التحميل .

١١- توضع الشرائح النسيجية المحملة في الفرن من أجل التجفيف من الماء والالتصاق لمدة ١/٢-١ ساعة .

١٢- عملية الصباغة (Staining) : تبدأ عملية الصباغة الأساسية ضمن محاليل خاصة أهمها الهيماتوكسيلين (Hematoxylin) لصبغ النواة (Nuclei) باللون الأزرق والايوسين (Eosin) لصبغ السيتوبلازم (Cytoplasm) باللون الزهري المجانس .

١٣- ثم تغطى الشرائح بغطاء زجاجي رقيق (Cover slide) بعد وضع مادة لزجة لاصقة عادة (كندا بلسم) وتترك لتجف فترة زمنية وبذلك تكون جاهزة للدراسة والفحص المجهرى ومن ثم الحفظ في خزائن مصنوعة لهذه الغاية .


ويتضح مما سبق شرحة أعلاه أن هذه الطريقة التقليدية لعمل شريحة نسيجية تستغرق ما يقارب ٤٨-٧٢ ساعة على الأقل بينما هناك طرق أخرى سريعة لإنتاج شرائح نسيجية لا تتجاوز مدة تحضيرها عن ٢٠ دقيقة أهمها التجميد السريع للأنسجة (Frozen Sectioning) غالباً بواسطة ما يسمى بجهاز (CRYOSTAT) دون الحاجة الى استخدام المحاليل السابق ذكرها من حفظ وتثبيت، تجفيف وتنقية ومن ثم المرور خلال المراحل السابقة الشرح في الحالات الإستكشافية المستعجلة والمريض في غرفة العمليات وذلك بهدف التشخيص السريع .

- أما بالنسبة للأنسجة الصلبة الغنية بأملاح الكالسيوم مثل العظام والأسنان والتي يتعذر تقطيعها بواسطة جهاز القطع فلا بد من نزع الكلس منها أولاً (Decalcification) بواسطة محاليل مختلفة من أكثرها استخداماً حامض النيتريك ثم يتم معالجتها بنفس الطريقة التقليدية لتحضير الشريحة النسيجية السابق شرحتها أعلاه .

الوحدة الثانية

الوحدة الثانية

الخلية Cell



- التوازن الخلوي الفسيولوجي (Cellular Fisiology)

- الاختلال الخلوي المرضي (Cellular Pathology)

أنواعه :

أ- التنكس « الاستحالة » (Degeneration) .

ب- التنخر « الموت الخلوي » (Necrosis) .

- اضطرابات النمو .

توجد الخلية في حالة ثبات وتوازن فسيولوجي في جسم الإنسان ما لم تتعرض لعامل مؤذ خارجي أو داخلي قد يؤدي إلى تلفها تركيبياً ووظيفياً، حيث تعتبر الخلية الحية الوحدة التركيبية الأساسية لكل الأنسجة والأعضاء في الكائن الحي على الإطلاق .

تركيب الخلية

تتكون الخلية الواحدة من جزئين رئيسيين هما :

• السيتوبلازم (Cytoplasma)

• النواة (Nucleus)

يحيط بهما غشاء خلوي (Plasma membrane) يحفظ مكونات السيتوبلازم من الوسط الخارجي، عبارة عن جسيمات (Organelles) مختلفة التركيب والوظيفة نذكر أهمها :

- الميتوكوندريا (Mitochondria)

- الرايوسومات (Ribosomes)

- الشبكة الاندوبلازمية (Endoplasmic Reticulum)

- جهاز جولجي ("Aparatus" Golgi Complex)

- الأجسام الحالة (Lysosomes)

أما النواة يفصلها الغشاء النووي عن باقي محتويات الخلية السيتوبلازمية تحتوي على الكروماتين (Chromatin) والنوية (Necleolus) غنيان بمادة DNA و RNA الوراثية حيث تعتبر النواة المسؤول الرئيسي عن تنظيم عمليات

توليد الطاقة (Energy) والهيمنة على الوظائف الخلوية الأنجى فى توازن متكامل .

الطاقة (Energy)

المصدر (Source)

انتاج Production

$O_2 + \text{Glucose} \rightarrow \text{Via Mitochondria} \rightarrow \text{Release of} \rightarrow$

ADP ATP تحرير الطاقة

(Oxidative Phosphorylation)

الاستهلاك لجميع الوظائف الخلوية Utilisation For all Cellular Activities

ويبدو واضحاً ان تأثير عامل مؤذ على مستوى أي من هذه المراحل فى عملية توليد الطاقة ينعكس على جميع اتجاهات الوظيفة الخلوية .

أما العوامل المؤذية فهى عديدة الأنواع :

١- نقص الأكسجين : مثال أمراض الجهاز التنفسي، الدورة الدموية والقلب، فقر الدم .

٢- عوامل فيزيائية : الرضوض والجروح، الحرارة والبرودة، الإشعاعات .

٣- عوامل كيميائية : وهذه فى إزدياد مستمر نتيجة التقدم الصناعي والتكنولوجي وبالتالي زيادة استخدام المواد الكيميائية والسامة على اختلاف أشكالها .

٤- عوامل حيوية : بكتيريا، فيروسات، فطريات، طفيليات، نباتات وحيوانات سامة .

- ٥- عوامل مناعية : مثال الحساسية المفرطة، أمراض الكبد الكلوية .
 - ٦- خلل جيني : متظاهرة داون Down's Syndrome .
 - ٧- عدم التوازن الغذائي : نقص الفيتامينات، سوء الامتصاص .
- علماً بأن التلف الخلوي قد يكون قابل أو غير قابل للتراجع بناءً على نوعية، مدة وشدة العامل المؤذي بالإضافة الى وضع ونوعية الخلية في الجسم . ومن هنا يبدو واضحاً لنا أن التغير الخلوي قد يظهر على هيئة :
- ١- تنكس « استحالته » Degeneration
- تغير قابل للتراجع تعود فيه الخلية والأنسجة المتضررة الى وضعها الطبيعي مع إزالة العامل الضار .
- ٢- تنخر (موت الخلية) Necrosis
- تغير غير قابل للتراجع نتيجة تحلل عناصر الخلية السيتوبلازمية والنوية .

أنواع التنكس :

- ١- التورم السائلي (Hydropic Swelling Formerly Cloudy Degeneration)
- سابقاً كان يعرف بالتنكس الكدر من أحد مظاهر التنكس الفجوي والذي يتميز بتكوين فجوات «فقاعات» داخل السيتوبلازم .
- ٢- التنكس « التغير » الدهني : Fatty Change
- ونراه عادة عند أمراض فقد الدم، القلب والجهاز التنفسي، الداء السكري وسوء التغذية وينتج عن عجز في استقلاب المواد الدهنية مما يؤدي إلى تجمعها في الخلايا وبالتالي زيادة حجم العضو .

٣- التفسخ المخاطي (Mucoïd Degeneration)

يزداد تجمع المخاط عادة في الخلايا المخاطية في حالات الالتهابات النزلية، السرطانات المخاطية أو الورم المخاطية داخل النسيج الضام .

٤- التفسخ الهيايلىن (Hyaline Degeneration)

نتيجة تكون وترسب الهيايلىن وهي مادة بروتينية الأصل، مثال في حالة تصلب الشرايين، الالتهابات المزمنة مثل التهاب الكبد .

أنواع التفسخ :

١- التفسخ التخثري (Coagulative Necrosis)

الأكثر حدوثاً وينتج عن نقص في التروية الدموية كما هو الحال في الاحتشاء .

٢- التفسخ التميعي (Colliquative Necrosis)

يلزم احتشاء الدماغ والخراجات القيحية نتيجة فعل الأنزيمات المحللة

٣- التفسخ التجبنى (Caseous Necrosis)

يحدث عادة في التدرن ويكون النسيج المتفسخ مشابهاً للجبن الطري المتفتت على هيئة حبيبات ينتج عن خليط من التفسخ التخثري والتميعي .

٤- التفسخ الدهني Fatty Necrosis

السبب انزيمى ويتميز بموت النسيج الدهني في التهاب البنكرياس لنزفي أو رضى في الثدي .

ومن أهم مضاعفات النخر « التمثول الخلوي »

١- الفرغرينا : وتحدث غالباً في الأطراف السفلية حيث يتراكم على الجزء المتنخر فعل البكتيريا بالإضافة إلى نقص الترويه الدموية ونميز الفرغرينا الجافة، الرطبة والغازية .

- مصير النسيج المتنخر :

- ١- إن كان صغير الحجم فيتم التخلص منه عن طريق البالعات .
- ٢- إن كان كبير الحجم يؤدي إلى الالتهاب وتكوين نسيج حبيبي ومن ثم التليف .
- ٣- وإذا لم يتم التخلص منه عن طريق التليف يحدث التكتل الخلوي (Dystrophic Calcification) نتيجة ترسب الكالسيوم - مثال التدرن .

الوحدة الثالثة

الوحدة الثالثة الالتهاب (Inflammation)

- المراحل الرئيسية :

١- الالتهاب الحاد (Acute inflammation)

• العلامات العرضية (Manifestations)

• آلية التغيرات المجهرية (Microscopic Changes)


• أنواعه الخاصة (Special types)

• المصير (Sequels)

٢- الإلتهاب المزمن (Chronic Inflammation)

يعرف الإلتهاب بأنه رد فعل الأنسجة الحية الديناميكي تجاه الأذى خاصة على المستوى الوعائي - النسيج الضام لحصر فعل العامل المؤذي وإعادة الأنسجة المصابة إلى وضعها الطبيعي ما أمكن .

أما الأسباب فهي عديدة :



١- حادة (Acute) إذا كان البدء سريع نتيجة تأثير العامل المؤذي لفترة قصيرة وشديدة وبالتالي يكون رد فعل النسيج قوي وحاد .
أما إذا طال تأثير العوامل المؤذية زمنياً وبالتالي يكون رد فعل النسيج تدريجي ومستمر مما يؤدي الى :

٢- المرحلة المزمنة (Chronic)

ونميز أيضاً التهاب تحت الحاد (Subacute) وهو مرحلة العبور ما بين الالتهاب الحاد والمزمن :

ومن أهم علامات الالتهاب الحاد :

١- الإحمرار (Redness)

٢- الحرارة (Heat)

٣- التورم (Swelling)

٤- الألم (Pain)

٥- خلل وظيفي (Loss of Function)

وتفسر هذه الأعراض بناءً على التغيرات الخلوية المجهرية التالية :

١- رد الفعل الوعائي الدموي (Hyperaemia) وينعكس على هيئة تدفق الدم نتيجة التوسع الوعائي بشكل عام وهو المسؤول عن الإحمرار والحرارة .

٢- تشكيل النتحه الالتهابية (سائل وخلايا) Exudation ازدياد خروج السائل النتحى - الغني بالبروتينات من خلال جدار الأوعية الدموية في الموضع الملتهب الى النسيج الضام وهذا يوضح التورم والألم نتيجة الضغط على

النهايات العصبية، حيث تكون المحصلة النهائية لهذه الأعراض الاستغناء عن الجزء المصاب مؤقتاً - خلل وظيفي .

٣- هجرة الخلايا البيضاء (Emigration of Leucocytes) : حيث تنسل كريات الدم البيضاء خارج جدار الوعاء الدموي (الشريينات Venules) بحركة أميبية عن طريق تشكيل أقداماً كاذبة في نفس الوقت مع الخلايا وحيدة النواة وكريات الدم الحمراء حيث تعمل جميعها على بلع (بلعمه Phagocytosis) العوامل المؤذية والنسيج المتحوت بهدف التخلص منها . ومن الملاحظ أنه لا يمكن أن يوجد رد فعل نسيجي على الالتهاب دون تدخل مواد كيميائية وسيطة وذلك حسب حاجة الجسم ونوعية المادة المسببة للالتهاب نكتفي بذكر أهمها على سبيل المثال : الهستامين (Histamine)، براديكينين (Bradykinin)، سيروتينين (Serotonin) وكاليكريين (Kallikrein) .

وبناءً على ما تقدم شرحه عن خصائص وآلية حدوث الالتهاب الحاد نميز بعض الأنواع الخاصة منه :

١- الالتهاب النزلي (Catarrhal inflammation)

ويعتاز بزيادة افراز المخاط في الأنسجة المخاطية - الرشح .

٢- الالتهاب التنحي (Exudative inflammation)

ويظهر في أشكال مختلفة معتمداً على العنصر الأساسي الغالب في التكوين مثل :

أ- الالتهاب المصلي (Serous inflammation)

سائل تنحي مصلي - الحروق من الدرجة الأولى .

ب- الالتهاب الفيبريني (Fibrinous inflammation)

كثرة وجود الفيبرينوجين - التهاب ذات الرئة .

جـ التهاب القيحي (Suppurative inflammation)

تشكيل القيح نتيجة تأثير الجراثيم المقيحة غالباً - الخراج (Abscess)

د- الالتهاب النزفي (Haemorrhagic inflammation)

السائل التنحي غني بكريات الدم الحمراء نتيجة التحطم الشديد
لجدران الأوعية الدموية - ذات الرئة والقصبات
(Bronchopneumonia) .

- مصير الالتهاب الحاد يكون عادة إما :

١- الشفاء التام (Resolution)

٢- النقيح والانتشار (Suppuration)

٣- الالتئام بتكوين قشرة فيبرينية (Repair and Organization)

٤- الأزمان (Chronic Inflammation)

- الإلتهاب المزمن :

وعلى الرغم أنه قد يحدث نتيجة استمرارية الالتهاب الحاد على هيئة
مضاعفة ثانوية إلا أنه عادة يكون بدئي ولذا تميز الالتهاب المزمن النوعي حيث
يكون المسبب متخصص في حدوث مرض معين لا يسببه غيره مثل التدرد،
الافرنجي، البلهارسيا .

أما الالتهاب المزمن الغير نوعي عادة يكون المسبب قادر على احداث
اكثر من نوع مرضي في الأنسجة المختلفة .

ويمتاز الالتهاب المزمن بالخصائص التالية :

زيادة عدد الخلايا الليمفاوية (Lymphocytes)، البلازمية (Plasma Cells) والبالعة الكبيرة (Macrophages) مع قلة عدد الخلايا البيضاء بالإضافة الى تشكيل شبكة وعائية دموية تكثر فيها الشبكة الفيبرينية (Fibrous tissue) مما يؤدي الى تكوين ما يعرف بالحيبيوم (Granuloma) .

الرمح والراية


الوحدة الرابعة العدوى (Infection)

- التعريف
- طرق العدوى وأسبابها
- الأعراض السريرية العامة
- أنواع العدوى
- ١- جرثومية Bacterial : حادة (Acute Bacterial Infection)
- مزمنة / نوعية / حبيبيية (Chronic Granulomatous Bacterial Infection)
- ٢- فطرية (Fungal)
- ٣- طفيلية (Parasitic)
- ٤- دودية (Helminths)
- ٥- فيروسية (Viral)

تُعرف العدوى على أنها دخول ثم تكاثر عوامل حية ممرضة (Pathogenic) إلى داخل جسم الإنسان يلزمها أعراض سريرية نتيجة حدوث تلف نسيجي معين .

وعلى الرغم من وجود الكثير من الكائنات الحية الدقيقة (Micro-organisms) التي تعيش في حالة توازن منفعي على السطح الخارجي والداخلي لجسم الإنسان إلا أنها لا تسبب أمراضاً معدية (على سبيل المثال الجلد (Skin)، الجهاز التنفسي العلوي والهضمي (Upper Respiratory and Alimentary Tracts).

Common Sites of Contamination



طرق العدوى :

- ١- الجلد أو الأغشية المخاطية (Skin or Mucous Membranes)
 - أ- الاتصال المباشر : الأمراض الجنسية (Venereal Disease)
 - ب- تلوث الخدوش والجروح (Contamination of Abrasions and wounds)
 - ج- اللدغ (Inoculation)
 - الحشرات (Insect bite-Yellow fever).
- ٢- الجهاز الهضمي (Ingestion)
 - الغذاء والشراب الملوث (وباء الكبد المعدي) .

٣- الجهاز التنفسي (Inhalation)

الرباذا والغبار (Influenza) .

إلا أن الجسم يتمتع بالإضافة إلى البنية الجيدة والصحة العامة بأجهزة وقائية عالية الكفاءة تعمل على صنع حدوث العدوى * على مستوى الجسم المضيف (in Host) وتقسم إلى :

١- فيزيائية (Physical)

أ. الغشاء الظهاري المتقرن - الجلد


Cornified Squamous Epithelium

ب. الدموع (Tears) - العين

ج. التنقي (Filtration) والمخاط (Mucin) - الأنف

د. البول (Urine) - الكلى

Physical barriers
e.g. (a) SKIN



Cornified
squamous
epithelium


Secretions

Washing action by


(a) TEARS




(b) URINE



(b) FILTRATION
by
nostril
hairs



(c) MUCIN (aided by
ciliary action in
respiratory tract)



٢- كيميائية (Chemical)

أ. الإفراز الحمضي للمعدة والجهاز البولي- (Acid Secretion in Stomach and Urinary Tract)

ب. الأجسام الحالة (lysosomes) والانزيمات القادرة على تحليل الغشاء الخارجى للجراثيم (الدموع - اللعاب)

ج. مواد مثبطة غير نوعيه (البول - العرق - افرازات دهنيه)

Sebum Sweat Urine

د. الغلوبولين المناعي أ (Immunoglobulin A(IgA)): الدموع
(Intestinal Secretions) افرازات معوية (Tears)

• أما على مستوى الكائن الحي الدقيق (In the Micro Organism)

١- كمية الجرعة (Quantity of dose).

٢- شدة وقوة التأثير (Virulence).

أما الآلية الوقائية (الأعراض الوقائية) التي لابد من حدوثها لحصر وتعديل العدوى فهي :

١- الالتهاب (Inflammation)

حاد (Acute) أو مزمن (Chronic) حسب نوعية العدوى، إلا أن أكثر وأهم الأعراض التي يتميز بها الالتهاب هي :

• الحمى (Pyrexia) نتيجة ارتفاع درجة الحرارة .

• تغيرات استقلابية (Change in Metabolism) تتمثل بقلة الشهية ونقص الوزن .

* تغيرات في الدم (البروتينات البلازمية) عادة ارتفاع في (ESR- Erythrocytic Sedimentation Rate) وفي بعض الأمراض ارتفاع الغلوبولينات المناعية (Hyperglobulinaemia)

٢- البلعمة (Phagocytosis) .

٣- التجاوب المناعي (The immune response) .

٤- إنتاج الانترفيرون (Interferon Production) - الأمراض الفيروسية .

ويبدو واضحاً مما سبق شرحه أن العدوى الجرثومية قد تسبب مضاعفات مختلفة أهمها :

١- الإنتشار بواسطة :

أ- الأوعية الليمفاوية (Lymphatics) مما يؤدي الى تضخم العقد الليمفاوية .

ب- الدم (Blood Stream) ما يسبب :

• تجرثم الدم (Bacteraemia) .

• أو تقيح الدم (Pyæmia) .

• أو انتان الدم وعفونته (Septicaemia) .

• تجرثم الدم : عرض شائع الحدوث في العدوى إلا انه موضعي وليس من الأعراض الخطرة (مثال : التهاب الضرس) .

• تقيح الدم : حالة خطيرة جداً مع تسمم عالي الدرجة حيث تميل الكائنات الحية الدقيقة لتكوين تجمعات صغيرة جداً على هيئة صمامات (Micro-emboli) في الدم والنتيجة عادة تكون إما حدوث :

أ-خراجات القيحية (Pyæmic Abscesses) .

ب- الاحتشاء الأتاني (Septic infarction) .

• انتان الدم وعفونته : عرض جدير بالإهتمام يؤدي الى التسمم (Toxaemia) والصدمة (Shock) قد يكون :

١- بدئي (Primary) : نتيجة التأثير الشديد (Virulence) للمكورات السحائية والعنقودية (Meningococcus Streptococci) .

٢- ثانوي (Secondary) يرافق التلازم الصدمي (Shock Syndrome) الناتج عن اسباب أخرى - خاصة أمراض الجهاز الهضمي .

٣- أثناء العلاج الطبي لبعض الأمراض نتيجة خلل مناعي .

• ومن أكثر أنواع العدوى الجرثومية الحادة شيوعاً هي :

• عدوى الجلد على هيئة مثلاً دُمل (Boil) أو خراج (Absces) .

• التهاب اللوزتين (Tonsillitis) .

• ذات الرئة والقصبات (Broncho-Pneumonia) .

• التهاب السحايا (Leptomeningitis) .

• الكزاز (Tetanus) .

وتقسم الجراثيم من حيث المبدأ الوظيفي والتركيبى لها الى مجموعتين اساسيتين هما :

١- جرام سالبة

٢- جرام موجبة

(Gram-negative)

(Gram-positive)

وكل مجموعة تقسم الى :

- هوائية (Aerobic) : الجهاز الهضمي
- لا هوائية (Anaerobic) : (Alimentary Tract) (E.Coli, B. proteus)

تفرز سموم داخلية تؤدي الى الالتهاب
وتحدث تلف نسيجي .

الكزاز (Clostridium Tetani)

نتيجة افراز سموم خارجية ولا تسبب تلف نسيجي .

- العدوى النوعية المزمنة «تشكيل جسيمات» "Graunlomas"

حيث أن الآلية الأساسية لردة الفعل النسيجي تكون على هيئة التهاب مزمن إلا أن التجاوب المناعي للمضيف (Host) يأخذ أيضاً دوراً دفاعياً هاماً.

التدرن «السل» "Tuberculosis"

وهو من أكثر الأمراض المعدية شيوعاً في الأقطار في طور النمو وبتزايد واضح مع ظهور متلازمة النقص المناعي المكتسب (الايدز) في الدول المتقدمة يصيب الأطفال والكبار على حد سواء .

المسبب هو من نوع (Mycobacterium Tuberculosis) أو المتفطرة الدرنية، حيث يمتاز بالمقاومة العالية للعوامل الخارجية (الحمضية والكحول) نتيجة المحفظة الدهنية (Acid-Alcohol Fast) تميز نوعان من حيث الإصابة الأولية :

١- البدئي (Primary)

ويعني دخول المسبب للمرة الأولى الى الجسم عادة يصيب الأطفال

الأقل مناعة مما يؤدي إلى تكوين بؤرة أولية تتوضع في محيط الفص الرئوي العلوي إلا أنها أحياناً قد تتوضع في اللوزتين أو الأمعاء الدقيقة . ومن أهم خصائص التغيرات النسيجية للتدرن هو تشكيل حبيبوم (Granuloma) يعرف بالدرنه (Tubercle) يتكون من :

– موت تجبني خلوي في المنتصف (Caseous Necrosis) يحيط به طوق من الخلايا البالعة الكبيرة (Macrophages) عادة من نوع وحيدة النواة (Epithelial Cells) يتخللها خلايا عملاقة متعددة النواة (Giant Cells) تشبه حذوة الفرس تعرف بخلايا لانجهانس (Langhan's giant Cells) حيث أن هذه الخلايا خاصة بميزة لدرنه السل ومن الخارج طوق كثيف من الخلايا الليمفاوية (Lymphocytes) يتخللها خيوط كولاجينية (Collagen Strands).

وتعتبر الدرنه الآلية الوحيدة الأساسية في تطور وتنشيط المرض – حيث أن مجموع عدة درنات في نفس النسيج المصاب يشكل ما يسمى بؤرة غون (Ghon's Focus) أما انتشار هذه الدرنات بواسطة الأوعية الليمفاوية إلى العقد الليمفاوية السرية (Local, hilar) يشكل ما يسمى بالمركب البدئي – الدرني (Primary Complex).

ومن مضاعفات التدرن في هذه المرحلة من العدوى :

أ– الشفاء (Healing) : التندب والتكلس الخثلي للعقد الليمفاوية (Scarring and Calcified Lymph-Nodes).

ب– الانتشار بواسطة الدم (Spread Via Bolld) قد يكون عاماً (General) : في جميع أنحاء الجسم مسبباً ما يعرف بالتدرن الدخن (Miliary Tuberculosis) نتيجة انتشار درنات صغيرة الحجم في جميع أنسجة وأعضاء الجسم .

أو متوضعا (Local) : يشمل عضو أو بعض الأعضاء / مثال : العظام والمفاصل الخ .

٢- التدرن الثانوي (Secondary)

(RE-infection Tuberculosis)

يصيب الأطفال البالغين وكبار السن نتيجة تفعيل بورة بدئية سابقة أو نقص مناعي بعد التطعيم بمصل BCG ومن خصائصه تكوين :

١- التهاب نتحي مصلي (Exudative inflammation) على هيئة تجمع سائلي يعرف بـ (Ascites) عادة نراه في تجويف القفص الصدري أو التجويف البطني .

٢- تكوين خراجات قححية «باردة» (Cold Abscesses) .

٣- تدرن تليفني (Fibrotic Tuberculosis) حيث يعتبر شكل من اشكال الشفاء البطيء .

٤- كهوف (Cavitation) وهذه عادة تؤدي الى النزف .

الداء الغرناوى - الساركويد (Sarcoidosis Boeck's)

يعتبر من الأمراض الغير معدية، إلا أنه يتم ذكره في هذه الوحدة بين الأمراض المعدية التي تتميز بتكوين حبيبومات نوعية لشدة التشابه بين الساركويد والتدرن .

السبب مجهول ويصيب جهازاً أو أكثر من جهاز في آن واحد حيث يعتبر الجلد بعد الرئة أكثر الأعضاء إصابة الذي قد يسبب الانتشار المدخن (Miliary Infiltration) لهذه الحبيبومات الساركويدية في النسيج الرئوي

مشبهاً (بالعاصفة الثلجية (Snow-Storm)) عند التصوير بالأشعة - X إلا أنه يصيب أيضاً العين بالذات (Uveal Tract) العقد الليمفاوية، الطحال والكبد .
• التغيرات النسيجية :

يتكون حبيبوم يشبه درنه السل إلا أنه لا يوجد تنخر تجبني في منتصف الحبيبوم (Granuloma) .

• المصير (Prognosis)

١- الشفاء التام .

٢- التليف (العقد الليمفاوية العين) : مما يؤدي الى العمى أو في الرئة الى التهاب الرئة التليفني (Pulmonary Fibrosis/ Honey-Comb Lung) وهذه تؤدي الى القلب الرئوي .

٣- وقد تحدث الوفاة نتيجة إصابة أعضاء حيوية مثل القلب والجهاز العصبي بالإضافة الى الرئة .

الجذام (Leprosy)

ما زال هذا المرض منتشراً في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية حيث تستمر فترة الحضانة سنين عديدة قد تصل الى ١٠ سنوات وتكسب عن طريق الاتصال الطويل والسبب هو عصيان الجذام (هانس) (Mycobacterium Le-prae) محدثاً تغييرات على الأعصاب الحسية (Peripheral Nerves) مقاوم للأحماض (Acid-Fast) يتواجد بكثرة في افرازات الجهاز التنفسي العلوي (الأنفية والغمية (Nasal and Oral Secretion)

يظهر المرض في صورتين رئيسيتين :

١- الجذام الورمي ٢- الجذام نظير الدرني

- | | |
|--|--|
| <p>- شحوب جلدي موضعي (Pallor) مع إنعدام حس الألم</p> <p>- في النهايات العصبية بسبب الإصابة المبكرة للأعصاب .</p> <p>- التغير النسيجي الأولي يكون على هيئة حبيوم يشبهه الدرنة السلية ولكن لا يوجد فيه تنخر</p> <p>- قلة عدد العصيات .</p> | <p>- يتميز بعقيدات جلدية خاصة الوجه</p> <p>سحنة الأسد (Leonine facies).</p> <p>- تصاب الأعصاب في مرحلة متأخرة .</p> <p>- تقرحات تتكون من الخلايا الليمفاوية، البلازمية والبالغة الكبيرة تحتوي على عدد من العصيات .</p> |
|--|--|

ويبدو أن الاختلاف في هذين الشكلين للمرض يعود الى التفاعل المناعي للمضيف حيث يكون أكثر تجاوباً وفعالية في الشكل الثاني .

الزهري - الافرنجي (Syphilis)

تحدث عادة العدوى عن طريق الاتصال الجنسي المباشر عند البالغين عن طريق الجلد (العضو التناسلي الذكري (Penis)) والأغشية المخاطية (الفرج والمهبل عند الأنثى (Vulva and Vagina)) والمسبب هو من نوع (Spirochaetes) ويعرف بـ (Trepanoma Pallidum) وعلى الرغم من ضعف (قوة) هذه الكائنات الحية الدقيقة خارج الجسم إلا أن لها قدرة هائلة على اختراق الأغشية المخاطية تمر بـ (٣) أطوار (مراحل Stages) أساسية :

١- الأفرنجي البدني (Primary)

يتم انتشار اللوليبات بواسطة الدم دون اعراض سريرية خلال ٣ أسابيع

من العدوى مؤدياً الى ظهور التغير النسيجي الأولي (Primary Lesion) على هيئة تقرح يشبه الزر من حيث الشكل في الموضع الأولي لدخول المسبب يعرف بـ (Hard chancere) يتميز بكثرة الخلايا الليمفاوية والبلازمية (Lymphocytes and plasma Cells) مع التهاب الطبقة البطانية للأوعية الدموية (Peri and Enderarteritis) إلا أنه من الملحوظ وجود تلف نسيجي ضئيل جداً بالإضافة الى التضخم المؤلم للعقد الليمفاوية المجاورة، وفي هذه المرحلة من العدوى يمكن ان يتم الشفاء بواسطة التندب (Scarring) وخلال ٢-٣ أشهر قادمة من المرحلة الأولى تكون تأثيرات المسبب بالإضافة الى الإصابة الأولية الموضعية قد أدت إلى ظهور :

٢- المرحلة الثانية - الافرنجي الثانوي (Secondary)

على هيئة طفح جلدي، تقرحات الأغشية المخاطية، تضخم عام للعقد الليمفاوية، تلف نسيجي في الأعضاء مع ظهور الحمى وفقر الدم كأعراض سريرية، والمرض في هذه المرحلة يكون معدياً جداً، علماً بأن الشفاء يمكن ان يتم وذلك دون تندب.

٣- الافرنجي المتأخر (Latent, Tertiarry Syphilis)

ويحدث بعد مرور سنوات عديدة من المرحلة الثانوية، ويمتاز هذا الطور بالتغيرات النسيجية الموضعية نتيجة تأثير الخلايا التائية المناعية مؤدياً الى حدوث:

١- الصمغ (Gumma) عبارة عن بؤرة تنخر (Necrosis) موضعية تشمل اجزاء كبيرة من العضو أو النسيج خاصة الكبد، العظام والخصية .

٢- التهاب بطانة الشريان الأبهرى (Syphilitic aortitis) مما يؤدي الى حدوث امهات الدم (Aneurysm) .

٣- تغيرات عصبية - دماغية (Neurological Syphilis) تؤدي الى تلف نسيجي في مادة الدماغ - شلل (Paralysis) أو في النخاع الشوكي - سهام ظهري (Tabes dorsalis) .

• الأفرنجي الخلقي (Congenital Syphilis)

من الأم الحامل الى الجنين بواسطة المشيمة . ومن مضاعفاته :
١- الاجهاض .

٢- ولادة طفل حامل للمرض مع وجود تلف عام في الأعضاء .

٣- طفل مشوه تظهر عليه التغيرات النسيجية والشكلية نخس منها بالذكر الصمم، الأنف السرجي وأسنان هتشنسون .

الفطريات (Fungi)

- داء الفطر الشعاعي (Actinomycosis)

يظهر عادة على هيئة تجمعات قيحية مزمنة (Suppuration) متوضعه (Localised) تنتشر بالتدريج تصيب الجزء السفلي من التجويف الفمي (Lower Jaw)، القناة الهضمية (Ileocecal Region) وأحياناً الرئة .

أما المسبب (Actinomycetes) والنوع الانساني يعرف بـ (Actinomycetes israeli) كثير الانتشار في الطبيعة، جرام - موجب (Gram-positive)، لا هوائي (Anaerobic) غير مقاوم للتلوين بالحمض، يوجد عادة حول الأسنان والتجويف البلعومي يؤدي الى تشكيل مستعمرات

متجمعة (Colonies) صفراء اللون تحتوي على القيح (الخراج - Pus) مرئية بالعين المجردة .

٢- المبيضات البيض (Candida Albicans)

توجد في حالة تعايش في الجهاز الهضمي والتناسلي الأنثوي والأجزاء الرطبة من الجلد، تكثر عند المصابين بالسكري، حالات نقص المناعة تسبب افرازات بيضاء مع حكة شديدة خاصة في الجهاز التناسلي الأنثوي .

الطفيليات (Protozoa)

الزحار (Dysentery)

يعتبر الزحار متلازمة (Syndrome) يتميز بالإسهال (Diarrhoea) مخلوط بالدم (Blood) والمخاط (Mucus) في البراز (Faeces) . ويكون عادة الاستخدام المرضي (Pathological use) لمصطلح الزحار مقصوراً على كائنات نوعية (Specific organisms) تسبب الزحار العصوي (Bacillary dysentery) والزحار الأميبي (Amoebic Dysentery) .

١- الزحار العصوي (Bacillary Dysentery)

المسبب جرثيم الشيغيلا السالبة الغرام (Shigella groups of gram negative) حيث تتم العدوى عن طريق الغذاء أو الماء الملوث (Contaminated food or water) وتمثل التغيرات على هيئة التهاب سطحي حاد متقيح (Acute Superficial Suppurative inflammation) يتميز بإحترقان شديد (Intense Cogestion) مع وجود تورم وذمي (Swollen, edematous) وتنخر (Necrosis) سطحي في مخاطية الأمعاء (Colonic Mucosa) مما يؤدي إلى تكوين تقرحات (Ulcerations) واسعة

وكبيرة غير عميقة ذات أطراف هشة وغير منتظمة (Regged edges) لا تمتد الى الطبقة المخاطية العضلية (Muscularis Mucosa) تنتهي غالبية الحالات المرضية بالشفاء دون تندب (Without scarring) ولكن في بعض الحالات يمكن ان تبقى هذه الكائنات الدقيقة في الجسم وبذلك يصبح المريض حاملاً مزمناً للمرض (Chronic Carrier). يعتمد التشخيص على عزل (Isolation) الشبيجلا في البراز (Faeces) بالزراعة (Culture) حيث عادة لا تصل هذه الكائنات الى الدم.

٢- الزحار الأميبي (Amoebic dysentery)

المسبب هو المتحولات الحالة للنسيج (Entamoeba histolytica) يكون عادة نشط (Active) ومتحرك - بلعمي (Mobile-phagocytic) بالشكل النباتي (Vegetative)، يصيب الأمعاء الغليظة وخاصة الأمور والمستقيم (Caecum and Rectum) تم العدوى عن طريق الغذاء الملوث (Contaminated food) وابتلاع (Ingestion) الطفيل في الطور المتكيس (Cystic Form) وبعد الدخول لجسم الإنسان تنحول الأميبا الى الطور النباتي حيث تخترق الغدد المعوية (Colonic glands) وتفرز أنزيم بروتيني (Proteolytic Ferment) يسهل هضم وتحلل (Digestion) الأنسجة تحت المخاطية (Submucosal Tissues) مما يؤدي الى تكوين تقرحات قارورية الشكل (Flask-shaped ulcers) مع فتحات ضيقة (Narrow orifices) وأطراف هشة غير منتظمة (Regged edges). أما الطبقة المخاطية تكون عادة سليمة. يتم التشخيص بواسطة فحص البراز عن الأكياس أو الأميبا في الأوردة (Veins) حيث يمكن أن تنتقل الى الكبد وتسبب ما يعرف بالتهاب الكبد الأميبي (Amoebic Hepatitis) أو خراجات أميبية (Amoebic abscess) لذا يمكن استخدام أيضاً (Flourescent Antibodies studies or serum) في تشخيص المرض.

المالاريا (Malaria)

يصيب ملايين الناس، ينتشر في جميع انحاء العالم وعلى الأخص المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية (Tropical and subtropical regions) الى الانسان نتيجة لسعته (bite) اثني بعوض الأنوفيليس (Anophiline mosquito) (tos) والمسبب من نوع (Plasmodium) يوجد منها أربعة انواع نخص بالذكر هنا (Plasmodium Malariae) يتميز بوجود دورتين للحياة احدهما في البعوض والأخرى في الإنسان :

١- دورة حياة المالاريا في البعوض :

الدورة الجنسية (Sexual Cycle 7-12 days) حيث يتم التكاثر بالأبواغ (Sporogony) تتواجد في اللعاب .

٢- في الإنسان :

الدورة اللاجنسية Asexual cycle

التكاثر الانفلاقي (Schizogony) وهذه تمر بمرحلتين :

أ- خارج كريات الدم الحمراء (Exo-erythrocytic phase) وتستمر ٧ أيام (7 days) حيث تتكاثر في الكبد ثم تنتقل الى الدم .

ب- داخل الكريات الحمراء (Erythrocytic phase)

تتراوح ما بين ٣٦-٧٢ ساعة (36-72 Hours) حيث تتحول بعد خمسة دورات في الإنسان الى أمشاج (Gametocytes) ذكورية وأنثوية ومن هنا تنتقل الى البعوض وهكذا تستمر العدوى .

ومن أهم الأعراض السريية للمالاريا إتفاع درجة الحرارة والحمى

(Pyrexia) فقر الدم (Anaemia)، تضخم الطحال -
الكبد (Hepatosplenomegaly) والعقد الليمفاوية .

عادة يكون الشفاء مصير المصابين بالمalaria إلا أن امكانية تجدد المرض على مدار السنين واردة (Exacerbation) أو التحول الى مرض مزمن (Chronic Malaria) خاصة عند الأفراد ضعيفي المناعة مما يؤدي الى الوفاة المبكرة .

أما التشخيص (Diagnosis) فيعتمد على الأعراض السريرية، فحص الدم أثناء النوبات الحادة (Blood films) بالإضافة الى الفحوصات الضدية (Antibody Studies) .

الليشمانيا (Leishmaniasis)

هناك ثلاثة أنواع معدية للإنسان وكل منها تتصف بأعراض سريرية (Clinical Symptoms) تتميز بها :

١- الليشمانيا الجلدية (Cutaneous Leishmaniasis (Oriental Sore)

المسبب الليشمانيا المدارية L.tropic حيث يبدو واضحاً أنها تصيب الجلد .-

٢- ليشمانيا الأغشية المخاطية Mucocutaneous Leishmaniasis (Espundia)

المسبب الليشمانيا البرازيلية L.braziliensis

٣- ليشمانيا الأحشاء Visceral Leishmaniasis (Kala-Azar) المسبب

ليشمانيا دونوفاني L.Donovani نخص بالذكر هنا :

الليشمانيا الجلدية :

وتعرف ايضاً بالقرحة الشرقية (حبة أريحا، بغداد، حلب) حيث تنتقل

العدوى بواسطة البعوض والبرغش وتظهر على هيئة مطاطه صغيرة - بشره في موضع اللسع وهذه تنتشر لتحتوي ظاهر الجلد (Epidermis) ، مما يؤدي الى التقرح (Ulceration) مع تجمع سائل نتحي النهائي (Exudate) مغطى بقشرة (Crust) وقد تستمر هذه الآفة (Lesion) أسابيع - أشهر قبل أن تشفى بالتندب (Scarring) . ويعتمد التشخيص على الفحص السريري والنسجي أو بأخذ مسحات من النتحة الالتهابية (Smears from the Exudate).

داء المشعرات المهبلية (Trichomoniasis Vaginalis)

تعيش المشعرة المهبلية (Trichomonas. Vaginalis) في الجهاز التناسلي الأنثوي، (Female Genital Tract) وخاصة المهبل (Vagina) وقد توجد في الجهاز التناسلي الذكري (Male genital Tract) وذلك في مقدمة الأليل حتى البربخ (Urethra, Epididymis)، وتشاهد بشكل ناشط (Active) أو إنباتي (Vegetative)، وتحدث العدوى عن طريق الإنصال الجنسي (During Sexual Intercourse) وتتمثل على هيئة افرازات مهبلية صفراء رغوية مع حكة وإحمرار شديد في مخاطية المهبل (Frothy, Wat- ery, Yellow Vaginal Discharge with Pruritis and brilliant Vaginal Mucosa) ويتم التشخيص بالفحص المخبري بأخذ مسحات مهبلية (Cervical Smears) بقشط الجدار (Scraping) بواسطة سواط (Spatula).

الديدان (helminths, Worms)

لا تزال الأمراض الناتجة عن الإصابة بالديدان أعلى اختلاف اشكالها منتشرة في أجزاء شاسعة من العالم .

التصنيف (Classification)

يتم تصنيف أنواع الديدان في ثلاثة مجموعات رئيسية :

١- الديدان المدورة (المسودات) (Nematodes) وتشمل :

أ- الإسكارس (Ascaris lumbricoides) .

ب- الخيطية (Oxyuriasis, thread worms)

ج- الصنارية (Ancylostomiasis, Hook Worms).

د - السوطية (Tichuriasis, Whip Worms) .

غالباً تتوضع في الجهاز الهضمي (الأمعاء) ولكن يمكن ان تتواجد في الرئة .

هـ- العضلية (Trichuriasis, Muscle worm) تتوضع في العضلات .

٢- الديدان التكيسية Cystadoes

وتكون عادة مفلطحة - شريطية الشكل (Taenia) ونخص منها بالذكر (taenia Echinococcus) الديدان العنبرية مسبب داء الكيسات العنبرية (Hydatid Disease)، حيث يتم نقل العدوى الى الانسان بواسطة الغذاء والماء الملوث بالبيض بعد طرحها من براز الكلاب، تتحلل القشرة الخارجية وتخرج الأجنة (Hooklets, Scolices) التي تصل من الأمعاء الى الكبد عن طريق الوريد البابي (Portal Vein) مكونة الأكياس المائية التي قد تكون وحيدة أو متعددة وتحتوي على الكثير من الأجنة البنات (Daughter Hook-lets) وقد تحتاز هذه الأجنة الكبد لتستقر في أعضاء أخرى مثل الرئتين، العظام، الدماغ وغيرها من الأنسجة ومن أكثر المضاعفات حدوثاً :-

أ- موت المسبب مع التكلس (أو ما يعرف بالتتكس المعقم-Aseptic Degen-eration).

ب- العدوى الثانوية (Secondary Infection) يموت المسبب مخلقاً ورائه تجاويف خراجية (Abscess Cavities).

ج- الإنشقاق (الإنشاق في) Repture into

الى العديد من الاعضاء مثل الجهاز الصفراوي (Biliary tract)، الأمعاء (Intestine) الرئتين (Lung)، الدماغ (Brain) وغيره من الأجهزة مما يؤدي الى ضمور النسيج المحيط بالأكياس نتيجة الضغط، بالإضافة الى التحسس، ويعتمد التشخيص على الفحوص المخبرية ومنها :

- اختبار تثبيت المتممه (Complement Fixation Test).

- اختبار كاسوني (Casoni Test).

- اختبار التراص الدموي (Haemagglutination Test).

- ارتفاع عدد الخلايا الحامضية (Eosipophils-Eosnophilia) بأخذ عينة من محتوى الأكياس من خلال العملية لإزالتها لأنها تحتوي على الأجنة .

٣- المثقوبات (Trematodes)


أهم أنواع هذه الديدان هي الديدان المشقة (Schistosoma) والتي تسبب داء المثقبات البلهارسيا (Sebistosomiasis. Bulharziasis) تعيش الديدان الناضجة (Mature) في الأوردة المسارية والبابية (Mesenteric and Portal Veins) ومن ثم تهاجر (Emigrates) الى الأوردة الصغيرة في المثانة (Urinary Bladder) الأمعاء (Intestines) والكبد (Liver) حيث تضع البيوض ومن هنا تخرج بالبول والبراز الى العالم الخارجي . ومن المعروف ان

بنهارسيا المثانة من الأمراض المستوطنة في العديد من البلدان الافريقية على وجه الخصوص جمهورية مصر العربية مؤدية الى التهاب المثانة المزمن مع التليف (Chronic Cystitis with Fibrosis) التبدل الخلوي للغشاء المخاطي (Mucosal Metaplasia) التامور (Fistula) وحدوث السرطان (Carcinoma) .

الوحدة الخامسة

الوحدة الخامسة المناعة Immunity

منذ عهود تاريخية طويلة معروف للبشرية مفهوم المناعة على أنها استجابة وردة فعل الكائن الحي لحماية ووقاية نفسه من أمراض متنوعة خاصة المعدية منها فيما لو تعرض لها مرات أخرى عديدة في المستقبل على الرغم من أن هناك أمراضاً يبقَى الجسم حساساً لها .



الصفات الأساسية Cardinal Features

• النوعية Specificity وهذه تشمل التعرف (Recognition) وتلعب الأجسام المضادة Antibodies والخلايا الليمفاوية من نوع T.B الدور الرئيسي في ذلك :

• Diversity . التنوع

• Memory . الذاكرة

• الحماية « الدفاع » Defence وهذه الآلية غير نوعية Non-specific وتأخذ خلايا متنوعة دوراً في ذلك :

- الخلايا البالعة الكبيرة Macrophogoytes .

- الخلايا الدموية متعددة الأنوية (الخلايا المعتدلة، الحامضية القاعدية).

- الخلايا البدينة Mast Cells .

- الأحماض الإلتهابية Inflammatory Amines وهذه تشمل : Histamine

Slow Reacting Substance of Anaphylaxis (SRS-A)

Complement

kinins

Lysosomal Enzymes

Lymphokines

وبالتالي فإن المناعة تقسم الى :

١- مناعة نوعيه Specific immunity

وهذه عادة مكتسبة (Acquired) اي ما يكتسبه الجسم اثناء الشفاء من

مقاومة مناعية ضد مرضٍ بعد معين أو مسبب هذا المرض وهذه تقسم الى :

- أ- مناعة فاعلة ايجابية Active immunity .
- ب- مناعة منفعة سلبية Passive immunity .

• المناعة الفاعلة الإيجابية :


الجسم بنفسه يشكل الأجسام المضادة (Antibodies) ضد مولدات ضد معينة (Antigens) ولذا تميز :

- ردة الفعل المناعية الأولية (Primary Response) وفيها الجسم يتعرض للمرة الأولى للعامل المؤذ .

- ردة فعل ثانوية Secondary Response وفيها الجسم يتعرض مرة أخرى لنفس العامل المؤذ Subsequent contact with same infecting agent .


PRIMARY RESPONSE

(i.e. first attack by infecting agent)



SECONDARY RESPONSE

(subsequent contact with same infecting agent)



• المناعة المنفعلة السلبية

- الجسم لم يصنع الأجسام المضادة بل يستقبلها جاهزة، وتقسّم الى :
- منفعلة طبيعية : مثال المناعة الطبيعية عند الأطفال حديثي الولادة .
 - منفعلة مصطنعة : إعطاء الأمصال الخاصة (مصل الكزاز والدفتيريا) .

٢- مناعة غير نوعية Non-specific

- عبارة عن مجموعة اجهزة مختلفة تشترك مع بعضها البعض وتشمل :
- اجهزة كيميائية / ما ذكر على الصفحة الأولى .
 - اجهزة فيزيائية / ما ذكر على الصفحة الأولى .
 - خلوية .
 - عرقية .

وتؤثر كل من المناعة النوعية وغير نوعية واحدة على الأخرى مما يؤدي الى الاستجابة المناعية وما يترتب عليها من نتائج .

• المستضد «مولد الضد» Antigen

تعتبر العوامل المرضية المعدية (Infections Agents) مثل البكتيريا والفيروسات من أكثر مولدات الضد شيوعاً ولكن هناك ايضاً مواد غريبة بالنسبة لجسم الانسان يمكن ان تحث العملية المناعية والغالبية عادة بروتينية الأصل ويمكن كيميائياً ان تنجزأ الى جزئين أحدهما يربط المستضد بالجسم المضاد وتعرف بالمرسعات المناعية (Haptens) وهي بحد ذاتها غير قادرة على توليد الاجسام المضادة وأهمية هذه النماثبات ثنائية : الأولى الارتباط بالجسم المضاد يشبط تفاعل مستضد-جسم مضاد Antigen/ Antibody والثانية : إذا اتحدت مع بروتين معين تصبح أكثر قوة كمستحضر،

وتثير المستضدات أقوى استجابة عندما يتم إعطاؤها عن طريق الوريد -Paren-
terally الى الانسجة لأن الجزيء البروتيني يصل الى النسيج الليمفاوي وهو
موقع الاستجابة المناعية .

• الاستجابة المناعية النوعية The Specific Immune Response

وهذه تتم بالضرورة بتنشيط وتكاثر الخلايا الليمفاوية من نوعين : البائية
B والتائية T حيث تميز بنضج Maturation الخلايا البائية تكون الخلايا الذاكرة
Memory Cells والخلايا المصورة Plasma Cells وهذه تقوم بتكوين جسم
مضاد نوعي من الغلوبولينات (Immunoglobulin Ig) في الخلية وإفرازه في
سوائل الأنسجة والدم يؤدي في المحصلة الى تشكيل ما يعرف بالأجسام
المضادة الخلطية Humoral Antibodies وبنضج الخلايا التائية تنتج خلايا
ليمفاوية نوعية متحسسة (Specifically Sensitised Lymphocytes)
بالإضافة الى الخلايا الذاكرة وبالتالي فإن المحصلة النهائية للإستجابة المناعية
التائية هي تكوين المناعة المتوسطة (الغير مباشرة) الخلوية -Cell-mediated im-
munity .

وظائف الخلايا الليمفاوية التائية :

١- التنظيم الكلي للاستجابة والتفاعلات المناعية حيث تتمثل في ضبط التوازن
بين الخلايا المساعدة التائية Helper cells والخلايا المثبطة التائية -Suppres-
sor T-cells .

٢- الآلية الفعالة Effector Function

وهذه تتضمن الخلايا القاتلة الطبيعية بوظيفتها الغير نوعية (Natural Killer
Cells) السمية الخلوية النوعي (Cytotoxic) وفرط التحسس المتأخر

(Delayed Hypersensitivity) وتتوسطها صناعة الليمفوكينات
Lymphokines التي تعمل على حث وضبط الاستجابة المناعية والتفاعل
الالتهابي .

• نشاطات الخلايا الليمفاوية التائية T cell Activities

- ١- التأثير على الخلايا البائية Influence on B Cells
ضبط توازن التفاعل المناعي الخلطي ليناسب الأوضاع In vivo .
 - ٢- ضبط التكاثر الخلوي بواسطة الليمفوكينات Lymphokines Cntrol-
ling Cell Proliferation .
 - ٣- التفاعل على الخلايا المعتدلة والبالغة الكبيرة Action on Neutrophils
and Macrophages .
- Humoral Antibodies-Immunoglobulines Ig
- الأجسام المضادة الخلطية «الغلوبولينات المناعية» في الأصل بروتينية
التركيب وتميز انواع عديدة منها أهمها :
- IgM : الرئيسي المتواجد على سطح الخلايا الليمفاوية البائية وينشط في
المرحلة المبكرة للاستجابة المناعية .
- IgG : أعلى نسبة تركيز في الدم بين جميع الغلوبولينات ويصنع بصورة
رئيسية عند الاستجابة الثانوية Secondary response .
- IgA : ترتفع نسبة التركيز في افرازات العين، الأنف، الفم، القصبات الهوائية
والأمعاء .
- IgE : ويسمى أيضاً Reagin نسبة التركيز منخفضة في الدم وترتفع عند
الإصابة بالديدان وتتوسط الخلايا البدينة والقاعدية (Mast Cells-
Basophils) نشاطه .

IgD : نسبة التركيز منخفضة جداً وغير معروف الوظيفة بالضبط .

• التفاعلات «الإرتكاس» المناعية Immune Reactions

القاعدة الأساسية للتفاعل هي التركيبية المكونة من المستضد (Antigen Ag) والجسم المضاد (Antibody Ab) - المركب Ag/Ab وعادة يكون هذا التفاعل قابل للتراجع في درجات مختلفة (Ag+Ab \rightleftharpoons Ag/Ab) ونميز نوعان من التفاعلات :

١- المباشرة (Immediate) : الأجسام المضادة الخلطية Humoral Antibodies في الدم والأنسجة تعطي تفاعل Ag/Ab سريع (تفاعل مباشر Immediate reaction .

٢- المتأخرة (Delayed) الأجسام المضادة الخلوية Cellular Antibodies وهذه تعتمد على تحول، تحرك واستئساخ الخلايا الليمفاوية Lympho-cyte transportation, mobilisation and multiplication مما يتطلب عدة أيام - الخلاصة تكون على هيئة تفاعلات متسلسلة (متتالية) يمكن دراستها في أنبوب الاختبار (In vitro) :

أ- الترسيب Precipitation .

ب- التلازن «التراص» Agglutination .

ج- التأثير ضد السمية Anti-toxic effect .

د- تعزيز الآلية الغير - نوعية الطبيعية الدفاعية Enhancement of the natural non-specific defence mechanism .

وهناك نوع آخر من التفاعل تحت ظروف معينة لا يسبب المستضد تفاعل مناعي وهذا لا يعني فشل في عمل الخلايا الليمفاوية ويسمى هذا النوع من

النشاط بالتحمل Tolerance يقسم إلى :

تحمل طبيعي Natural Tolerance - تعرف الجسم على أنسجته. وآخر
يكتسب Acquired - الأمراض التحسسية .

Natural tolerance

The classic example is the ability of each individual to recognise and tolerate its own tissues — recognition of self.

This tolerance is developed in the fetal and early neonatal periods.

In addition, 'foreign' antigen introduced to the fetus will be tolerated in later life.

SPECIFIC
RECOGNITION
OF
ANTIGEN
BY LYMPHOCYTES

SUPPRESSION
OF USUAL
IMMUNE
RESPONSES

Acquired tolerance

After the neonatal period and throughout adult life, injections of either very small doses or increasingly larger doses of antigen may induce tolerance in the adult.

This form of tolerance is the basis of desensitisation treatment in allergic disease.

واضحاً مما تقدم شرحه أن الهدف من ضبط التوازن المعقد
والتيه المناعية هو الوقاية من المستضدات Antigens وعلى الأخص
العدوى Infection، وعندما يحدث اضطراب وخلل في هذا التفاعل فإن هذه
الآلية الوقائية تصبح بحد ذاتها مصدر لحالات مرضية، نميز ثلاثة أنواع رئيسية
«إرتكاس» :

١- الإرتكاس الزائد التحسس Hypersensitivity

٢- ارتكاس نقص المناعة Immune deficiency states

٣- الأمراض المناعية الذاتية Autoimmune Diseases

• تفاعل فرط التحسس

وهذه عادة تكون نتيجة الاستجابة المناعية الفردية المبالغ بها في الرد على مستضد ما عند توالي التعرض له، ومعتمداً على النوع الرئيسي للاستجابة المناعية يتم التصنيف :

أ- التفاعلات المرتبطة بالأجسام المضادة الخلطية المباشرة نوع ٣،٢،١ (Immediate I, II, III) .

ب- المناعة المتوسطة الخلوية - المتأخرة نوع (٤) : (Delayed 24 - 72h) (IV) - .

التفاعل المناعي نوع I يُعرف أيضاً بالتأقي «التحسس» (Anaphylaxis, Atopy, Allergy) .

وسرياً يظهر على هيئة :

• الصدمة التأقية Anaphylactic shock بعد التعرض البدئي لدواء مثل البنسلين أو مطعوم معين .

• حمى القش Hay-Fever - التعرض الأولي بعد التعرض للقاح عشب .

• الربو - التعرض البدئي للغبار المنزلي أو الألياف أو الشعيرات الحيوانية .


- التفاعل المناعي نوع II - حل السمية الخلوية Cytotoxic type تقبل الخلوية كما هو الحال في فقر الدم الإنحلالي وتفاعلات نقل الدم .

- التفاعل المناعي نوع III - المركب المناعي آرثوس Arthus type يحدث نتيجة التسلسل المتتالي للتفاعل النوعي بين مركب المستضد والجسم المضاد مما يؤدي الى تنشيط المتمم والتصاق الصفائح (Complement activation and platelet aggregation) ينتج عنه تلف نسيجي (الداء المصلني Serum sickness - مرض حاد قصير الأمد مثال على هذا النوع من التفاعل) .

– النوع IV – المتأخر :

عادة موضعي نتيجة نشاطات الخلايا الليمفاوية الناتية التحسسية النوعية
مثال على ذلك : Tubercle Follicle .

رفض الغرس النسيجي Rejection of grafts، الطفح الجلدي
الفيروسي الأصل Contact Dermatitis .



— نقص المناعة المكتسب AIDS —

The Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is now distributed worldwide, but assumed epidemic status in many parts of the world — particularly CENTRAL AFRICA and WESTERN HOMOSEXUAL COMMUNITIES.


It is due to infection by a lentivirus — human immunodeficiency virus (HIV).

The disease is slowly progressive and is usually fatal.

Infection	Latent and prodromal stages [AIDS-related complex (ARC)] (months up to several years)	Stages of opportunistic infection and tumours (1–2 years)
No initial symptoms	Virus present in lymphocytes — at first, no signs, — later, may be persistent lymph node enlargement and fever.	Infection $\begin{cases} \text{opportunistic} \\ \text{others} \end{cases}$
(helper) lymphocytes $> 500/\text{mm}^3$	T_4 cells $< 200/\text{mm}^3$	Malignant $\begin{cases} \text{Kaposi's sarcoma} \\ \text{lymphomas} \end{cases}$ T_4 cells $< 200/\text{mm}^3$

The whole range of opportunistic infection, including disseminated virus infection (e.g. herpes simplex and cytomegalovirus), occurs.

The diagram shows the more common AIDS-associated diseases and sites:



Blood changes

Antibodies — after infection, up to 6 months may elapse before anti-HIV antibodies appear; in the later stages the titre may drop greatly.

Immunoglobulins are usually elevated in the early stages.

T_4 (helper) lymphocytes are severely reduced, producing a lymphopaenia.

EPIDEMIOLOGY AND TRANSMISSION

Although the virus may be present in many body fluids and secretions, transmission is by the parenteral route, usually by (1) **sexual contact** or (2) **injection of blood or blood products**.

Transmission does not occur with normal social contact and there is no risk to medical or nursing personnel using normal procedures.

1. Sexual transmission

(a) **MALE HOMOSEXUAL PRACTICE:** HIV in seminal fluid → via anorectal abrasion to passive partner.

(b) **HETEROSEXUAL TRANSMISSION** is less common except where there is a high prevalence in prostitutes.

Female to male — infectious genital secretions and blood → via penis to male (risk increased in uncircumcised).


Male to female — infectious seminal fluid and blood → to female cervix uteri and vagina.

In both sexes the risks are very considerably increased where there is genital ulceration or abrasion.

2. Transmission by blood

- The risk from blood transfusion and blood products has now been virtually eliminated by screening and sterilisation procedures.
- The communal use of contaminated syringes and needles continues to be important among drug addicts.

Cellular mechanisms



T₄ cell deficiency → During latent phase B cells may be stimulated, allowing antibody formation and lymph node enlargement.

→ Gradual failure of immune effector mechanisms.

الأمراض المناعية الذاتية

تنتج من الاستجابة المناعية ضد بعض ذات الخلايا في نفس الجسم وفي بعض الأحيان ضد نواتج الخلية، وعادة تكون الاستجابة المناعية عبارة عن مرحلة أو عرض يظهر متأخراً في الحالة المرضية وليس بدئياً، يشمل التغيرات الخلطية Humoral، المتوسطة Cell-Mediated والتحمل Tolerance .

الأسباب : Aetiology

ما زالت مجهولة ولكن آليته الحدوث قد تكون :

- عائلية Familial : بعض الأمراض يكثر ظهورها عند بعض العائلات .

- تراكم ظهور الأجسام المضادة وأنواع التلف التي تنتج عنها The over lapping of the incidence of antibodies and of the types of damage produced

- زيادة ظهور الأورام الخبيثة بين الأفراد المصابة المحصلة عادة تكون عدم توازن في التحمل المناعي، أما التغيرات المتوقعة في الآلية المناعية (Immune mechanism) فهي معقدة وتحتوي على عدة عوامل أهمها :

١- التغيرات الغير طبيعية للجسم المستضد Antigenic Abnormality .

٢- الاستجابة الفعالة الغير طبيعية - Abnormality of the effector re-sponse خاصة نشاط الخلايا الليمفاوية التائية T-Cell (Particularly T Cell activity) وتشمل :

١- النظام النوعي Specific System نذكر منها على سبيل المثال :

أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية .

- داء هاشيموتو Hashimoto's Disease.Lymphadenoid goitre
(tre)

أكثر أنواع الأمراض المناعية الذاتية الدرقية شيوعاً، والتغيرات النسيجية تكون واسعة ومنتشرة تمثل بانتشار الخلايا الليمفاوية والخلايا المصورة، يشكل أهم سبب لمجذرة الدرقية ناقصة النشاط Hypothyroidism يكثر في النساء في منتصف العمر .

– داء غريف (Grave's Disease, Exophthalmic goitre)

عادة يصيب النساء، هناك تغيرات نسيجية بؤرية تحتوي على الخلايا الليمفاوية والمصورة، سريراً تكون الأعراض غالباً على هيئة توذم مخاطي وجحوظ العينين نتيجة التلف المناعي الذاتي لعضلات العين . يمتاز بزيادة نشاط الغدة الدرقية .

٢– النظام الغير نوعي Non-specific system نذكر منها على سبيل المثال :

الحمات الراشحة (Viruses)

تعتبر الفيروسات أصغر الكائنات الحية الدقيقة في الطبيعة، غير مرئية تحت المجهر الضوئي (Light Microscope) ولكن يمكن دراستها بواسطة المجهر الإلكتروني (Electron Microscope-EM) وتتكون الوحدة الفيروسية (Virion, Elementary body) من اللب (Central core) والذي يحتوي على المادة الوراثية (الجينية - Genetic) سواء ضمن DNA أو RNA تحيط به كبسولة بروتينية الأصل (Capsid) والوحدة الفيروسية عادة لا يوجد بها جهاز بيوكيميائي (Biochemical mechanism) يساعدها على التناسخ فالآلية تعتمد بحد ذاتها على مصادر الخلية المتهبة (Infected Cell) بالسيطرة واستهلاك الحامض النووي للخلية (By taking Control and Utilizing the nucleic acid of the invaded cell) وبذلك يتم الإستنساخ (Replication) علماً بأن السبب الهام في تلف (Damage) الخلية المضيفة

(Host-cell) يكون على أساس : التأثيرات الجانبية (Side effects) المصحوبة بالتفاعل المناعي للأجسام الضدية والخلايا الوسيطة (Antibody and cell-mediated immune reactions) وتقسم الفيروسات بشكل رئيسي وفقاً لقابليتها (Afinity) لبعض انواع الأنسجة المتخصصة، مثال ذلك التي تحدث تغيرات في :

– الجلد والأغشية المخاطية (Dermatotropic)

– الجهاز الهضمي (Viscerotropic)

– الجهاز العصبي (Neurotropic)

– الجهاز التنفسي (Respiratory)

إلا إن التقسيمات الحديثة تعتمد على طبيعة الحامض النووي (Nature of Nucleic Acid والأشكال الظاهرية، لذا نميز :

١- الفيروسات التي تعتمد على حمض RNA – مجموعة Myxoviruses التي تسبب الحصبة Measles، السعار «داء الكلب» Rabies.

٢- الفيروسات التي تعتمد على حمض DNA – مجموعة الحلا Herpes (group) ونميز البسيط H.Simplex والتناسلي H. Genitalis والخلوي العرطل مسبباً داء الاندخال الخلوي العرطل (Cytomegalic inclusion Disease).

الحصبة Measles

مرض معد حاد فيروسي، ينتقل بواسطة الرذاذ وفترة الحضانة (Incubation period) تتراوح ما بين ١٠-١٤ يوم، يصيب عادة :
– الجهاز التنفسي : مسبباً التهاب الطرق التنفسية العلوية بالإضافة الى

وجود التهاب رئوي بسيط من نوع Mild Interstitial pneumonia .

- الجهاز الليمفاوي : تضخم في العقد الليمفاوية .

- الأغشية المخاطية : ظهور بقع بيضاء معروفة بإسم بقع كوبلك (Koplik's spots) على الغشاء المخاطي للفم .

- الجلد : ظهور الطفح الجلدي العام (Generalized maculopapular rash) .

ويكون الشفاء عادة مصير المرض إلا أنه قد يسبب الوفاة عند الأطفال حديثي الولادة وكبار السن خاصة أنه قد يتراكم عليه عدوى جرثومية .

- داء السعار «الكلب - Rabies»

ينتقل إلى الإنسان إثر عضه كلب أو حيوان مسعور من مجموعة الذئاب وفترة الحضانة ١-٢ شهر، يتظاهر بالصداع، الحمى، الغثيان، ألم في البلعوم وألم في مكان العضة ثم تبدأ مرحلة التهاب الدماغ والهيجان الحركي والحسي والنفسي تكون فيه المحصلة شلل غالباً ينتهي بموت المصاب .

الوحدة السادسة

الوحدة السادسة الأورام (Tumours)

- * التكاثر الخلوي الغير ورمي (اضطرابات النمو) (Non-neoplastic proliferation).
- * التكاثر الخلوي الورمي (Neoplastic proliferation).
- * أسباب الورم والعوامل المساعدة .
- * الأنواع والخصائص .
- * تسمية الأورام .

التكاثر الخلوي الغير ورمي (اضطرابات النمو)

١- الضمور (Atrophy)

- ويُعرف على أنه نقص في حجم أو عدد الخلايا مؤدياً الى صغر حجم العضو ونقص وزن النسيج المصاب وقد يكون :
- أ- طبيعي : ضمور المبيض والثدي بعد سن اليأس .
- ب- مرضي : نتيجة .

– عدم الاستعمال (Reduced Functional Activity) .

- الانضغاط (Pressure) . في حالة الأورام نتيجة الضغط على الأعضاء المجاورة .

- غدي (Endocrine Deficiency) نقص هرمون الغدة النخامية (Pituitary Dificiency) يؤدي إلى ضمور الغدة الدرقية والكظرية.

- عصبى (Interrupted nerve supply) ضمور العضلات عند شلل الأطفال .

• الضخامة (Hypertrophy)

وتُعرف على أنها زيادة في وزن النسيج وتضخم حجم العضو نتيجة كبر حجم الخلايا أو زيادة عددها ونمیز ايضاً :

أ- الطبيعية : عضلات الرياضي، رحم الحامل .

ب- المرضية : تضخم حجم الكلية عند استئصال الأخرى .

• فرط التصنع (Hyperplasia)

زيادة في حجم ووزن العضو نتيجة زيادة وتكاثر (Proliferation) في عدد الخلايا .

أ- طبيعي : الثدي عند البلوغ .

ب- مرضي : فرط تصنع نقي العظام عند فقر الدم .

• التبدل الخلوي (Metaplasia)

يُعرف بأنه تبدل خلوي لنسيج ما عالي الكفاءة والنوعية والتخصص الى نوع آخر أكثر مقاومة للعوامل الخارجية وأقل نوعية وتخصصاً وظيفياً .

مثال :

تحول الخلايا الأسطوانية المهتدة الى خلايا مسطحة رصفية في الجهاز التنفسي عند المدخنين .


• خلل التنسج (قَدَن، حَثَل نموي) (Dysplasia)

ويُعرف على أنه تفاوت في حجم، شكل وترتيب الخلايا مع زيادة في الانقسام، عادة يلزم الالتهابات والتحرشات المزمنة إلا أنه قابل للتراجع إلى الوضع الطبيعي على الرغم أن هذا التغير أيضاً في حال تقدمه يتحول إلى تغير ورمي حيث (Malignancy).

التكاثر الخلوي الورمي (الورم) (Neoplasia)

يُعرف على أنه انقسام خلوي متزايد عشوائي وغير منتظم دون هدف وعلى حساب الخلايا المجاورة متطفلاً عليها ولا يخضع لاحتياجات الجسم وقد تكون

Tumor Development
Occurs in Stages



هذه الخلايا المنقسمة مطابقة أو غير مطابقة للخلايا الأصلية . ومن هنا يتم التقسيم العام للأورام من حيث : I التركيب (Structure) و سريرياً (Clinical) وفقاً للسلوك والسرعة التشريحية داخل النسيج الى مجموعتين رئيسيتين هما :

أ- حميدة (Benign) .

ب- خبيثة (Malignant)

حيث تميز فروق واضحة وهامة بين هاتين المجموعتين :

خبيثة	حميدة	
تنتشر بواسطة الأوعية الدموية الليمفاوية- (Via blood ves-sels and lymphatics) والتجاويف والقنوات (الأسطح الداخلية Tissue places and Cavities)	تبقى متوضع في مكانها (Localised)	• الانتشار (Spread) • أهم علامات الأورام
عادة سريع (Rapid)	عادة بطيء (Slow)	• معدل النمو Rate of growth
الإرتشاح وإتلاف الأنسجة الطبيعية	الضغط المعتدل على الأنسجة الطبيعية	• العلاقة مع الأنسجة المجاورة (Relationship to surrounding tissues)
يتلف تركيب الأنسجة الطبيعية والاستئصال لن يعيد وظيفتها الأولية .	يكون عادة نتيجة الضغط على الأوعية، الأعصاب والقنوات / الاستئصال يعيدها الى طبيعتها	• التأثيرات (Effects)

II- نسيجاً (Histology) : توضع حسب أصل منشأها النسيجي في ستة مجموعات رئيسية :

أ- أورام النسيج الظهاري (Epithelia)

- شائلك (squamous)

- غددي (Glandular)

ب- النسيج الضام (Connective tissue) بما فيه العضلي (Muscular) عظمي (Osteoid) وغضروفي (Cartilaginous).

ج- النسيج الوريقي الظاهري العصبي (Neuroectoderm).

د- الخلايا الدموية - الليمفاوية (Haemopoietic tissue).

هـ- الأوعية الدموية - الليمفاوية (Blood and lymph vessels).

و- الأنسجة الغير طبيعية النمو (Originating from developmental abnormalities).

• مسببات الأورام (Carcinogenesis)

وعلى الرغم أنها ما زالت تحت البحث والدراسة إلا أن هناك مسرطنات معروفة منذ سنين طويلة تلعب دوراً في حدوث السرطانات حيث تؤثر مبدئياً على انقسام DNA النووي (Nuclear DNA) للخلية المتكاثرة مع وجود خلل في عمليات الضبط لعملية التكاثر والترابط الخلوي، تقسم الى ثلاثة مجموعات رئيسية هي :

١- مسرطنات كيميائية (Chemical Carcinogenesis)

من أقدم العوامل المسرطنة المعروفة للإنسانية وهي في ازدياد مستمر

نتيجة التطور الحضاري - التكنولوجيا وما يترتب عليها من عادات يبيية غير صحية (الغذاء - التربة - الهواء) .

٢- المواد المشعة (Radiant energy)

بما فيها أشعة الشمس .

٣- الفيروسات المسرطنة (Oncogenic viruses)

ومن أهمها Retroviruses

- Herpes group

- Epstein Barr V (EBV)

- Hepatitis B

وهناك عوامل مسرطنة عدة مساعدة عديدة نذكر أهمها :

١- عامل الوراثة (Heredity) خلل على مستوى الكروموسومات .

٢- الهرمونات (Hormones) سرطان الثدي والرحم عند الإناث .

٣- خلل مناعي (Immunologic disturbances)

مثال :

متلازمة نقص المناعة المكتسب (الايذز AIDS) حيث يؤدي الى ورم جلدي يشمل النسيج الضام يعرف (Caposi Saroma).

٤- القومية (Race) والتقسيم الجغرافي (Geography) حيث تبين أن بعض أنواع السرطانات أكثر حدوثاً عند بعض الأجناس القومية وفي ظل طبيعة جغرافية منها عند غيرها .

٥- التحريش المزمن والرضح (Chronic Irritation and Trauma)

سرطان الشفاه عند المدخنين .

• تسمية الأورام

وتتم التسمية بناءً على المنشأ الأصلي (Geneis) للنسيج ونميز :
الأورام الحميدة لكل الأنواع النسيجية السابق ذكرها بإضافة المقطع
Oma في نهاية اسم ونوع النسيج : مثال على ذلك : Lipoma ورم شحمي
Adenoma ورم غدى، Ganglioneuroma ورم عصبي عقدي ... الخ.

أما الأورام الخبيثة :

- النسيج الظهاري (Epithelia) بإضافة : Carcinoma
مثال ذلك : شائك الخلايا Squamous Carcinoma .
غدى : Adenocarcinoma .
- النسيج الضام Mesoderm Connective Tissue
إضافة Sarcoma .
مثال ذلك : Liposarcoma
Fibrosarcoma
Osteosarcoma ... الخ .

٣- أورام الوريقة الظاهرة العصبية (Neuroectoderm)

إما بإضافة المقطع Blastoma في نهاية اسم ونوعية النسيج أو الكلمة
Malignant قبل اسم النسيج المعنى .
مثال ذلك : Neuroblastoma
Malignant Meningioma

٤- الحلايا الدموية Haemopoietic Tissue

ابيضاض الدم Leukaemia

ورم ليفاوي Lymphoma

إلى آخره من أنواع السرطانات وفقاً لنوع ومنشأ النسيج علماً بأنه هناك شواذ عن القاعدة .

الوحدة السابعة

الوحدة السابعة
التوازن الحامضي - القاعدي
اضطرابات الدورة الدموية
Acid-Basic Balance
Circulatory Disturbances

- التوازن الحامضي - القاعدي Background
- الاضطرابات الاستقلابية Metabolic Disturbances
 - ١- الاحمضاض الاستقلابي Metabolic Acidosis
 - ٢- القلاء الاستقلاب Metabolic Alkalosis
 - ٣- الأحمضاض التنفسي Respiratory Acidosis
 - ٤- القلاء التنفسي Respiratory Alkalosis
- اضطرابات الدورة الدموية Circulatory Disturbances
 - الوذمة Oedema
 - الإحتقان Congestion
 - النزيف Haemorrhage

التوازن الحامضي - القاعدي Acid-Basic Balance

للحفاظ على العمل الأمثل للأنظمة الانزيمية في الجسم (Optimal working body's Enzyme Systems) لابد من وجود توازن في درجة حموضة السوائل داخل وخارج الخلية (Degree of acidity of the Intraand Extra Cellular Fluids) هناك تفاوت في أخذ ودخول الهيدروجين (The intake of hydrogen)، الأحماض الأخرى والشوارد القاعدية (Basic ions)، ولابد من طرح 50-70 mmol من الشوارد الحمضية للحفاظ على النشاط الكلي لشوارد الهيدروجين ثابت (Total hydrogen ion activity-PH) وبالتالي فإن PH يعرف ببساطة على أنه الطريقة الملائمة للتعبير عن نشاط شوارد (ion) الهيدروجين (A Convenient way of expressing Hydrogen ion activity) حيث يتراوح ما بين 7.00-7.36 والحد الأدنى الذي يستطيع ان يعيش به الإنسان هو PH7 . لذلك فإن اضطرابات التوازن الحامضي - القاعدي (Disturbances of Acid-Basic balance) قد تكون استقلابية (Metabolic) حيث ان الخلل الرئيسي يكون في نسبة تركيز البيكربونات (Bicarbonate Concentration) أو تنفسية (Respiratory) عندما يكون الخلل الاساسي في الضغط الجزئي لثاني اكسيد الكربون (Partial Pressure of Carbon Dioxide) وتعتبر هذه الاضطرابات معاوضة (Compensated) عندما يكون PH الدم الشرياني (Arterial blood) ما بين 7.44-7.36 وغير معاوض عندما يكون خارج حدود هذه الأعداد .

الاضطرابات الاستقلابية (Metabolic Disturbances)

١- الإحمضاض الإستقلابي (Metabolic acidosis)

التغير الأساسي يكون في هبوط تركيز البيكربونات (Fall in Bicarbonate)

وآلية المعاوضة (compensation) تكون بزيادة التهوية (Hyperventilation) - الأكسجة تخفض الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون (to reduce the Pa CO_2).

الأسباب متعددة نخص منها بالذكر :

- هبوط الكلى (Renal Failure)
- الاحمضاض الكيتوني السكري (Diabetic Keto-acidosis)
- نقص (فقدان في) الإفرازات المعوية (Loss of Intestinal Secretions)
- الإسهال (Diarrhoea)
- نواسير البنكرياس (Pancreatic fistulae)
- التسمم بالميثانول والإيثيلين (Poisoning e.g Methanol, Ethylene)

• المعالجة (Treatment)

- ١- علاج السبب المباشر Treatment of underlying Cause .
 - ٢- تعويض نقص البيكربونات - Replacement of deficits with bicarbonate
 - ٢- القلاء الإستقلابي (Metabolic Alkalosis)
- التغير الأساسي يكون في ارتفاع أنسجة البيكربونات (Raise in Bi-carbonate) وآلية المعاوضة تكون عادة بخفض التهوية (Hypoventilation) علماً بأن هذه الآلية قد تكون غير كثيرة الكفاءة (Not very efficient) والأسباب عديدة :

- زيادة في تناول القلوبات (Excess Ingestion of Alkali)

- Excess Loss of Acid المتزايد للحمض

Vomiting الإقياء

Pyloric Stenosis تضيق اليواب

- Hypokalaemia نقص في البوتاسيوم

المعالجة Treatment

- تنظيم العلاج بالأدوية Review of drug therapy

- تعويض Na^+ , Cl^- , K^+ Replacement of

- نادراً بحقن $NaCl$, HCl في الوريد إذا الحالة طارئة ومستعجلة
(Intravenously if urgent)

٣- الأحماض التنفسية (Respiratory Acidosis)

- ارتفاع في الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون ($Rise in PaCO_2$)

والمعاوضة تكون بطرح البيكربونات عن طريق الكلى-renal Re-
tentation of Bicarbonate والأسباب قد تكون :

- زيادة في الانتاج - الطاقة (دخول نسبة عالية من الكربوهيدرات)
. Excess Production

- انخفاض في الطرح والإفراز Reduced Excretion

الربو القصبي المتأخر Asthma -late

Chronic Obstructive Airways أمراض الرئة الانسدادية المزمنة
. Diseases

المواد التنفسية المثبطة Respiratory depressants

وهبوط التهوية (Hypoventilation) خلال التهوية الآلية
(Mechanical Ventilation) والعلاج يكون :

- بتنظيم دخول وأخذ الطاقة . Review of energy intake
- تنظيم العلاج بالأدوية . Review drug therapy
- علاج امراض الرئة الانسدادية المزمنة Treatment of Chronic
- Obstructive Airways Disease
- تنويع التهوية الآلية Alteration of Mechanical Ventilation

٤- الإستلقاء التنفسي (Respiratory alkalosis)

هبوط في الضغط الجزئي لثاني اكسيد الكربون (Fall in PaCo₂)
والمعاوضة تكون بإنتاج البول القلوي (Alkaline Urine) لخفض نسبة تركيز
بيكربونات البلازما To Reduce plasma Bicarbonate Concentration
أما الأسباب :

- زيادة التهوية (الأكسجة) Hyperventilation :
 - خلال التهوية الآلية، الربو - المبكر Asthma-early
 - المرض الدماغى Brain disease
 - الساليسيلات Salicylate تؤثر مباشرة على مراكز التنفس .
- أما العلاج :

- معالجة السبب Treatment of Underlying Cause
- تنويع التهوية الآلية Alteration of Mechanical Ventilation

اضطراب الدورة الدموية Circulatory Disturbances

Body Water Control : Oedema

الوذمة

• دوران سائل النسيج الطبيعي Normal Tissue Fluid Circulation

عادة هناك تبادل مستمر للسوائل بين الدم والأنسجة على الرغم من أن بعض السائل يمر في الأوعية الليمفاوية قبل الرجوع إلى مجرى الدم ربما جزئياً نتيجة الضغط النسيجي (tissue pressure) وجزئياً بسبب الجذب التناضحي للبروتينات داخل النظام الليمفاوي (Osmotic Attraction of Proteins in Lymphatic System) ولإبقاء هذا الدوران الطبيعي للسوائل في توازن مستمر توجد قوتان رئيسيتان تتعاملان مع الضغط المدروج (Pressure gradient) (Rate and direction of fluid movement) على معدل واتجاه حركة السائل (ent) .

١- الضغط الهيدروستاتيكي Hydrostatic Pressure

الضغط في الشعيرات الدموية (Capillary Blood Pressure -BP) يزيد من مرور السائل خلال جدران الأوعية الشعرية 35mm Mercury .

٢- الضغط البروتيني التناضحي (Protein Osmotic Pressure-OP) .

بروتينات البلازما تساعد على انحباس السائل في الأوعية الشعرية للحفاظ على التوازن النضحي (التناضحي) ويعادل هذا الضغط 25mm Mercury وبالإضافة إلى العاملين السابق ذكرهما اللذين يعملان على مستوى الشعيرات الدموية هناك قوى أخرى تحت حركة السائل خلال الجسم .

١- جلب السائل Fluid intake

أخذها بواسطة الأحشاء أو بواسطة الحقن يمكن زيادة قابلية الكلى للتخلص من الماء .

٢- تكامل الكلي Integrity of Kindney

يؤثر التلف في نسيج الكلى الى عدم التخلص من السائل .

٣- النشاط الهرموني Hormone activity

• الألدسترون (Aldosterone) يزيد من امتصاص الصوديوم وانحباس الماء .

• هرمون مضاد الإباله (Antidiuretic) يزيد من امتصاص الماء .

• هرمون القلب (Cardiac Hormone Atrial Natriuretic Peptide)

(ANA) يمنع امتصاص الصوديوم وبالتالي يزيد من طرح الماء .

الوذمة Oedema

• تعرف الوذمة على أنها تراكم متزايد في كمية السوائل ،تجمعها في الأنسجة

"Accumulation of Excess Fluid in the Extravascular Tissues" لذلك تعتبر جميع الحالات التي تتداخل مع انظمة الضغط المدروج

(Gradient Pressure) اسباباً تؤدي الى حدوث الوذمة :

- ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي للأوعية الشعرية - خاصة في نهايات

الأوعية الوريدية (Rise in Capillary hydrostatic pressure) .

- هبوط الضغط التناضحي الدموي (Fall in Blood Osmotic Pressure) .

Pressure

• تشكل نحه نسبة البروتين فيها قليلة (Transudate Formed Low Protein Content)

– ارتفاع الضغط التناضحي النسيجي
. pressure

– تناوب في نفوذية الأوعية الشعرية خاصة في الالتهاب

Alteration in Capillary Permeability Operates Especially in the
Inflammation

ونميز:

– الوذمة الموضعية (Local Oedema)

– الوذمة المعممة (General Oedema)

• الوذمة الموضعية

يمكن أن تظهر الوذمة في موضع محدد لأسباب مختلفة حيث أن الآلية الأساسية في حدوثها تناوب في نظام الضغط المدروج على مستوى الأوعية الشعرية ولا يشمل التغيرات العامة في الجسم وعادة تكون التأثيرات المصاحبة لهذه الوذمة أيضاً موضعية .

ومن هنا يتبين لنا أن هناك أنواع عديدة لهذه الوذمة :

أ– الوذمة الناتجة عن الإنسداد الوريدي Oedema of Venous Obstruction
أكثر الأنواع شيوعاً ونراها في الأطراف السفلية .

ب– الاستسقاء البطني وانسكاب (انصباب) غشاء الجنب Ascites and
pleural effusion تجمع السوائل في التجويف البطني والقفص
الصدرى .

وتعتبر هذه الأنواع من الوذمة الموضعية أنواع خاصة حيث نراها في

• تشكل نضمة نسبة البروتين فيها عالية Exudate Formed

"High Protein Content"

حالات هبوط القلب (Cardiac Failure)، التهاب (Inflammation) ونمو الأورام الخبيثة (Tumours Growth) .

على سبيل المثال : الاستسقاء البطني يعتبر مضاعفة عامة عند تشمع الكبد (Hepatic Cirrhosis) .

ج- الوذمة الانتهاية Inflammation Oedema

يوجد احتقان (Local Congestion) شديد وزيادة في إنتاج مركب من المواد الكيميائية تغير نفوذية الأوعية الشعرية - على سبيل المثال الوذمة التحسسية (Alergic Oedema) .

د- وذمة وعائية عصبية Angioneurotic Oedema

نوع نادر قليل الحدوث، مجهول السبب، يحدث فجأة لفترة زمنية قصيرة وتسبب الاختناق (Suffocation) إذا كانت متوضعة في الحنجرة .

هـ- الوذمة الليمفاوية Lymphatic Oedema

تحدث نتيجة انسداد مزمن في مجرى الليمف في ذلك الموضع .

* الوذمة الرئوية Pulmonery Oedema

تعتبر من أهم اشكال الوذمة الموضعية لأنها تكون ملازمة لأمراض القلب المتعددة جدية الاهتمام حيث تكمن أهمية هذه الوذمة في تجمع السوائل في الامنوخ الرئوية Pulmonary Oedema بالإضافة الى تجمعها في الفراغات النسيجية مما يؤدي الى اضطرابات خطيرة في تبادل الغازات .

* الوذمة المعممة General Oedema

بالإضافة الى التناوب في عملية نفوذية الأوعية الشعرية فإن العامل الآخر

المهم في حدوث الوذمة المعممة يكمن في زيادة كمية الماء الكلية في الجسم (Increase in total body water) ويلازم خاصة أمراض القلب والكلى .

• الوذمة القلبية Cardiac Oedema

ثلاثة عوامل مساعدة لحدوثها :

- ١- هبوط في التناج القلبي الأيسر Reduced left heart output .
- ٢- الاحتقان الوريدي Venous Congestion .
- ٣- انحباس الامتقلاب النسيجي Retention of tissue metabolites .

• الوذمة الكلوية Renal Oedema

تصاحب التهاب الكلية الحاد (Acute Nephritis) بسبب انحباس السائل (Retention of fluid) ومتلازمة الكلاء (Nephrosis Syndrome) نتيجة هبوط بلازما الضغط التناضحي (Fall in plasma Osmotic Pressure) .

• وذمة المجاعة Famine Oedema

في حالات الجوع الشديد (Starvation) يكون عادة نقص في بناء المواد البروتينية خاصة الأحماض الأمينية (Amino-acids) مما يؤدي الى هبوط في نسبة بروتينات البلازما تحت المعدل للحفاظ على توازن الضغط التناضحي للدم (Osmotic Pressure Blood) .

الإحتقان (Congestion, Hyperaemia)

يُعرف الإحتقان على أنه زيادة في كمية الدم في الأنسجة (Increase in tissue blood)

(the amount of blood in the tissues) هناك نوعان :

١- الاحتقان النشط (Active Congestion)

نتيجة توسع الشرايين والأوعية الشعرية (Arterioles and Capillaries) أثناء الالتهاب والتمارين الرياضية .

٢- الاحتقان الوريدي السلبي (Passive venous Congestion)

توسع جميع الأوردة في الجسم نتيجة ركود الدم فيهما (All the veins of the body are distended with blood) ويكون عادة ملازماً لأمراض القلب والرئة نتيجة دوران الدم فيهما . وتعتبر أمراض الرئة وهبوط القلب المزمن (Lung diseases and Cardiac failure) من الأسباب الرئيسية التي تقلل من حجم الدورة الدموية في الرئة (Reduces Pulmonary vascularity) ونمميز :

أ- الاحتقان السلبي الموضعي (Local Venous Congestion) .

ب- الاحتقان السلبي المعمم (General Venous Congestion) .
ويمكن أن يكون حاداً أو مزمناً .

٢- الاحتقان الموضعي الحاد : نتيجة انسداد مفاجيء في الدم الوريدي (Sudden obstruction of the venous return) .

٣- الاحتقان المعمم الحاد : هبوط القلب الحاد (Acute heart failure) .

٤- أما الاحتقان المزمن الموضعي : يكون عادة نتيجة الانسداد التدريجي المستمر مع أو بدون تكوين خثرة (With or without thrombosis) .

الاحتقان المزمن المعمم : هبوط القلب المزمن .

التأثيرات الجانبية العامة : General effects

- كبر حجم الأعضاء نتيجة تخثر الدم فيهما - (Enlargement to en-gorgement).

- نقص الأكسجة الركودي (Stagnent anoxia) مما يؤدي الى تنكس الخلايا وزيادة نسبة التليف .

- الإزرقاق Cyanosis بطء جريان الدم .

- الوذمة Oedema .

نتيجة ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي - (Increased hydrostatic pressure) وانبجاس الماء والكهرله (Retention of water and electrolites) وتعتبر كل من الرئة، الكبد، الطحال والكلى أكثر الأعضاء تعرضاً لهذه التغيرات المرضية .

الصدمة Schock

عبارة عن حالة (Condition) تكون فيها الوظائف الحيوية للجسم مضطربة نتيجة النقص الحاد والشديد في النتاج القلبي وحجم الدم الدوراني الفعلي (reduction in cardiac output and effective circulating blood volume) مؤدياً الى تلف خلوي (Cell damage) ومنشطاً تغيرات دموية على مستوى الدوران الدماغى والتاجى - (Central and Coronary circulation) ينتج عنها ما يعرف بمتلازمة الصدمة (Schock Syndrome) تمتاز بالوهط القلبي الوعائى (Cardiovascular Collapse) يظهر على هيئة :

- انخفاض ضغط الدم (Hypotension).

- زيادة التهوية والأكسجة (Hyperventilation) .

- فقدان الوعي المتكرر (Clouding of Consciousness) وتكون المحصلة : قلة البول (Oliguria) .

تقسم أسباب الصدمة الى ثلاثة مجموعات رئيسية :

١- نقص حجم الدم (Hypovolaemia) وأسبابه :

أ- الرضخ Trauma .

• النزيف الشديد (Severe Haemorrhage) سواء كان خارجياً أو

داخلياً (External or Internal haemorrhage) .

• إصابة عنيفه (Severe Injury) .

• الحرق (Burning) .

• العمليات الجراحية (Surgical Procedures) .

ب- الجفاف (Dehydration) .

الإقياء أو الإسهال الحاد (Severe Vomiting or Diarrhoea) .

٢- قلبي (Cardiogenic) أمراض القلب الحادة خاصة احتشاء عضلة القلب

(Myocardial infarction) يحدث هبوط مفاجيء في النتاج القلبي .

٣- جرثومي (Bacterial)

ومن الواضح من خلال الشرح السابق أنه في حال الصدمة القلبية يكون
المسبب هبوط القلب الحاد، بينما في حالة الصدمة الجرثومية والصدمة
الناجمة عن نقص الحجم فإن هبوط القلب يكون عبارة عن مضاعفة ثانوية .

وتقسم الصدمة الى :

١- الصدمة البدئية (Primary shock) أو ما تُعرف بنوبة الغيبوبة (Fainting

"Vasovagal" Attack) وعائي - بهمي .

عبارة عن نوبة فقدان الوعي العادي تحدث عند الأفراد نتيجة
الانفعالات النفسية الشديدة او الرضوخ Trauma حتى البسيطة منها
حيث يكون الجهاز العصبي وسيط بها ومن أعراضه التعرق البارد قد

يكون مصحوباً بالإقياء (Cold Sweat and may Vomit) انخفاض
ضغط الدم والنهض (The blood pressure falls and the pulse
.slows)

٢- الصدمة القلبية (Cardiogenic Schock)

وتعرف أيضاً بالصدمة المركزية (Control schock) ونراها عند
هبوط القلب الحاد نتيجة احتشاء عضلة القلب (Myocardial
Infarction Pump Failure) بسبب هبوط في وظيفة عضلة القلب
كمضخة.

٣- صدمة نقص السوائل والبلازما (Fluid and plasma loss)

نتيجة فقدان السوائل الحاد والموضعي في حالات الحروق الشديدة
والإصابات الأخرى المصحوبة بزيادة نفوذية جدران الأوعية الشعرية
ونرى ذلك في حالة فرط التحسس (التأقي) (Anaphylaxis) وحالات
العدوى الحادة العامة (Severe Systemic Acute Infection).

مصير الصدمة (Outcome of schock)

١- الشفاء Recovery

بعد فترة نقاهة (Convalescence) قد تكون طويلة .

٢- البقاء على الحياة Survival

مع وجود تلف دائم في أعضاء مختلفة .

٣- الموت Death .

التخثر Thrombosis

تُعرف الخثرة على أنها كتلة مكونة من محتويات الدم داخل وعاء دموي

أو القلب خلال الحياة (A thrombus is a mass Formed of the Blood
 . Constituents within a vessel or the heart during life)

العوامل المساعدة في تكوين الخثرة (Factors Leading to Thrombosis)

١- تغيرات في مجرى الدم (Alteration of Blood Flow)

بطء جريان الدم يؤدي الى ترسب الصفائح (Platelets) وكريات الدم
 البيضاء (White cells) على السطح الداخلي لجدار الوعاء الدموي .

٢- تلف في البطانة الداخلية للوعاء الدموي (Damage to Endothelium
 . of Vessel)

وهذا عادة يؤدي الى التصاق الصفائح وتراكمها (Platelet adhesion
 and aggregation) والأسباب قد تكون :

- مرض في جدار الوعاء - على سبيل المثال تكوين الأثروما .

- سموم (Toxins) ناتجة من مصادر التهابية بالجوار .

- ضغط موضعي (Local compression) على الوعاء الدموي .

٣- تغيرات في مركب الدم (Change in the Composition of the blood
 وتشمل :

زيادة في - الصفائح (Platelets)

- الفيبرينوجين (Fibrinogen)

- بروثرمين (Prothrombin)

- تغير في تلاحق الصفائح (Change in Platelet adhesiveness)

٤- عوامل مساعدة أخرى :

وهذه تشمل التدخين، موانع الحمل الاستروجينية، السمنة، زيادة تجلط الدم المصحوب ببعض الأمراض مثل السرطانات (Cancers) والذئبة الحمامية المعممة Systemic Lupus erytomatosus .

وتقسم الخثرة من حيث اللون الى :

١- البيضاء White

عادة تتكون من الصفيحات .

٢- الحمراء Red

وهذه تبدأ بتجمع الصفيحات، تنتج الفيبرين وتلتصق عليها خلايا الدم.

٣- المخلوطة او الصفائحية (Mixed or Laminated)

ويمتاز هذا النوع بتناوب الطبقات الحمراء والبيضاء وعادة تراه في أمهات الدم (Aneurysm) .

وتعتبر الخثرة الحمراء الأكثر ظهوراً ولذلك لابد من التمييز بين هذه الخثرة والجلطة التي تتكون بعد الوفاة (Postmortem Clot) عادة تكون الخثرة الحمراء : جافة، حبيبية، متماسكة، سهلة التفتت (Dry, granular, Firm and friable) وتكون ملتصقة في نقطة تكونها بالسطح الداخلي لجدار الوعاء الدموي ويمكن رؤية شبكة من الخطوط البيضاء الفيبرينية على السطح تعرف بخيوط زان (Striae of Zahn) بينما تكون الجلطة جيلاتينية الكثافة، لامعة المظهر (Jelly-like in Consistency and shiny in appearance) وقد تكون الخثرة :

- شريانية (Arterial)

عادة في الأبهر نتيجة الأمراض مثل الأثيروما والتصلب (Atheroma)

and atherosclerosis) وبسبب سرعة جريان الدم وارتفاع الضغط .

- وريدية (Venous)

نتيجة بطء جريان الدم وانخفاض الضغط مما يؤدي الى سهولة الضغط على الصمامات الداخلية كما هو الحال عند الدوالي، العمليات الجراحية، الولادة، أمراض القلب .

- شعرية (Capillary)

مصير الخثرة (Sequels of thrombosis)

١- التعضي Organization ثم التليف او تشكيل قنوات دموية جديدة.

٢- التكلس Calcification

مما قد يؤدي الى تكوين حصاة وريدية (Phlebolith) .

٣- الاندماج (Incorporating)

نراه في الأوعية الدموية الكبيرة حيث يتم تغطية الخثرة بواسطة البطانة الداخلية للوعاء ومن ثم ضمها ودمجها مع الجدار .

٤- الإنصمام (Embolism)

انفصال جزء من الخثرة وانتقالها بواسطة مجرى الدم الى وعاء دموي آخر .

٥- العدوى (Infection)

تتراكم العدوى لتشمل الخثرة وهذه قد تتحلل بواسطة الانزيمات البروتينية مما يؤدي الى :

• الاحتشاء الحمجي (الانتاني) Septic infection .

• الخراجات التقيحية (Pyæmic abscesses) .

الإنصمام Embolism

ويعرف على أنه نقل وغرس كتلة مواد طبيعية بواسطة الدم الى وعاء دموي آخر مما يؤدي الى انسدادده .

(Embolism is the impaction of any abonormal mass. of matter carried in the blood stream and large enough to occlude . some vessel)

والصمامة انواع :

١- تخثرية - شريانية/وريدية (Thrombus - arterial / venous)
تفتت الخثرة « الأكثر شيوعاً » أو من صفائح الأثيروما .

٢- دهنية (Fatty embolism) .

٣- سائلة / السائل الأمنيوي (Amniotic fluid) .

٤- غازية - الهواء (Gaseous/Air) .

٥- صلبة Solid embolism .

نتيجة تراكم خلايا سرطانية Cancer cells، جراثيم Bacteria، طفيليات Parasites، أجسام غريبة Foreign bodies .

١- الصمامة التخثرية

وهذه قد تكون :

• وريدية (Venous) :

عادة يكون مصدرها الأوعية الوريدية للأطراف السفلية والحوض ومن ثم الترحال نحو القلب الأيمن مما يؤدي الى انسداد الجذع الرئوي الرئيسي

(Main Pulmonary Trunks) الأوعية الدموية وتكون ما يُعرف بالصمام السرجي (Saddle Embolism) مغلقاً. بذلك مفرق الفرع (Bifurcation).

* شريانية (Arterial)

مصدرها القلب الأيسر من تخثرات مغروسة على شرفات الصمام الأكليلي والأبهرى (Mitral and Aortic valve Cups) أو أمراض الشرايين على سبيل المثال الأثيروما والنتيجة عادة تكون تنقل الصمام في الشرايين الجهازية (Systemic Arteries) نحو الدماغ، الطحال، الكلى أو انسداد مفرق الشريان الأبهرى بالصمام السرجي وقد تتوضع في الأوعية الدموية للأطراف .

٢- الصمام الدهنية

تجمع كريات دهنية الأصل (Globules of fat) ودورانها مع مجرى الدم مما يؤدي إلى غرسها في وعاء دموي حيوي، وتعتبر الكسور (Fractures) من أكثر الأسباب المؤدية إلى تحرر الدهون من النقي العظمي وكذلك الحروق (Burns) بحيث تشمل الطبقة الدهنية تحت الجلد (Subcutaneous fat) ويُعد الدماغ أكثر أعضاء الجسم إصابة بالصمام الدهنية حيث تؤدي عادة للغيبوبة (Coma) وبالتالي الوفاة . وتميز الأعضاء المصابة بهذا النوع من الصمامات بالنزف النمشي (Petechial Haemorrhage) مثل الدماغ، الرئة والكلى .

٣- الصمام الغازية (Gaseous Embolism)

وقد يكون السبب :

- الهواء Air

- النفقاعات الهوائية في الدم تكون كتلة فيزيائية غير ضاغطة (Non-Compressible Physical masses) لكنها قد تلتصق ببعضها وتسبب اغلاق « انسداد - Obstruction » أو تسبب كتلة رغوية في حجرات القلب .
ويبدو أنه لا بد من دخول ما لا يقل عن 100 ml من الهواء في الدم لظهور أعراض الإصابة بهذه الصمامة على سبيل المثال :
- الإصابات النفوذية في الصدر .
 - جروح الأوردة الرقية في حالات الانتحار .
 - العلاج الوريدي بالحقن .
 - انفصال المشيمة أثناء الولادة والعمليات الجراحية الدماغية .

النيتروجين (Nitrogen)

داء تنفقع الدم - إزالة الضغط (Decompression sickness) أو مرض كيسون (Caisson Disease) يظهر عند العاملين تحت ضغط عالي مثل « الغواصين والمدربين » مؤدياً الى ازدياد كمية الغازات في الدم وعند العودة الى الضغط المنخفض بسرعة مفاجئة فإن ذوبان الأكسجين O_2 ، ثاني اكسيد الكربون CO_2 ، والنيتروجين N_2 ، يظهر على هيئة فقاعات غازية في السائل .
الأكسجين وثاني اكسيد الكربون يمتصان بسرعة وكلما بينما النيتروجين يحتاج لفترة زمنية طويلة حيث ان الجزء المتبقي يمتاز بقابلية عالية للأنسجة الدهنية والدماغية .

ومن مضاعفاتها :

- انحناء والتواء العظام والمفاصل (The Bends) .

- الأوعية الدموية الرئوية - الفصص « الإختناق The chokes » .
- الدماغ - اضطرابات عقلية (Mental Disturbances) قد تؤدي الى الغيبوبة ويكون العلاج عن طريق وضع مثل هؤلاء الأفراد في حجر لتخفيف الضغط تدريجياً حتى تتم عملية امتصاص النيتروجين بالكامل .

- ٤- صمامة السائل الأميوني (Ammiotic Embolism)
- اثناء الولادة (المخاض Labour) نتيجة دخول السائل الأميوني في الدورة الدموية والوصول الى الرئة تظهر على هيئة ثلاثة اعراض مختلفة :
- ١- ظهور متلازمة الضيق التنفسي المفاجيء (Sudden Respiratory distress) اثناء المرحلة الأولى من المخاض :- أ- الموت مباشرة أو البقاء على الحياة لساعات معدودة .
- ب- الصدمة الشديدة التي قد يتم الشفاء منها إذا عولجت بنجاح .
- ٢- التخثرات المتعددة في الأوعية الشعرية (Multiple intravascular Capillary Thrombosis) نتيجة تحرر السائل الأميوني المفاجيء الذي يحتوي على كمية كبيرة من الثرومبوبلاستين (Thromboplastin) .
- ٣- استنفاد الفيبرينوجين المتزايد مؤدياً الى امكانيات النزف - الوفاة .

التأثيرات (Effects)

- وتعتمد على عدة عوامل :
- موقع المنشأ (Site of origin) - الشرايين أو الأوردة .
- موقع الغرس (Site of implantation) .

• العدوى (Infection) تنته أو غير تنته Septic or Aseptic.

١- الموت المفاجيء (Sudden Death) وقد يظهر نتيجة :

أ- الصمامة الرئوية .

ب- الصمامة الدماغية .

ج- الصمامة التاجية .

٢- الاحتشاء (Infarction) .

٣- الغرغرينا Garngrene في الأطراف نتيجة عدم توفر دورة دموية

مرادفه (Collateral Circulation) .

انسداد الأوعية الدموية (Blood-vessel Obstruction)

تتفاوت نتائج الانسداد الوعائي حسب نوع الوعاء والتركيب التشريحي

للجزء المغلق (Vary with type of vessel and anatomy of the part)

وعلى مستوى :

١- الشرايين التي تمتاز بدورة مراونه (Arteries with good Collateral

anaestomosis) ويمر في هذه الحالة بثلاثة مراحل :

أ - الإنسداد (Obstruction)

النسيج شاحب وبارد .

ب- توسع الأوعية الطرفية (Dilatation of Collateral vessels)

النسيج يعود الى الوضع الطبيعي .

ج- التوسع الدائم (Permanent Dilatation)

ارتفاع الضغط في الأوعية المرادفة - تضخم النسيج العضلي والمرن

في جدار الوعاء . مما يؤدي الى التعضي (Organisation) ويمتليء
تجويف الوعاء بالنسيج الليفي الدموي (Vascular fibrous tissue).
٢- نهاية الشرايين (End arteries)

- لا يوجد شبكة مرادفة (No Collateral anastomosis-Splenic artery)
أو شبكة من الأوعية الشعرية (Capillary anastomoses-Renal artery)
(Arterial anastomoses-Coronary arteries) أو شبكة شريانية
es) صغيرة جداً لتحتوي الدورة - الشريان المساريقي العلوي (Superior
mesenteric artery).

النتيجة :

- انسداد نهاية الشريان (Obstruction of end artery).
- توسع في الأوعية المرادفة (Dilatation of Collateral vessels).
- ركود الدم (Stagnation of blood).
- نقص أكسجة النسيج Anoxia of tissues.
- منطقة متنخرة ومحتقنة «احتشاء» Congested necrotic area.

الإلتام Healing

تأخذ وقتاً طويلاً وعادة الأوعية الشعرية والخلايا الفيبروبلاستية
(Capillaries and fibroblasts) تحل محل النسيج المتنخر ومن ثم يتكون
الكولاجين (Collagen) وينتهي بتكوين ندبة (Scar).
- الإنسداد الشرياني الجزئي أو البطيء

Partial or slow arterial occlusion

هذه الحالة عادة أكثر حدوثاً في كبار السن الذين يعانون من أمراض شريانية مزمنة مثل العصيدة (Atheroma) .

تضييق شرايين الأطراف السفلية	الشريان التاجي	تضييق الشريان الكلوي
Narrowing of Lower	Atheroma عصيدة	Renal artery stenosis
limbs artery	↓	↓
نقص أكسجين العضلات	تليف قلبي	فقر الدورة الدموية (نقص
Anoxia of muscles	Myocardial Fibrosis	الأكسجين)
↓	↓	↓
العرج المتقطع	هبوط القلب	ارتفاع ضغط الدم
Intermittent claudication	Cardiac Failure	Hypertension

– الإنسداد الوريدي Venous Obstrucion

يكون الإنسداد الحاد عادة نتيجة خثرة ولكن في كثير من المواقع يكون بسبب ضغط خارجي – ميكانيكي (Mechanical Pressure) على سبيل المثال :

اختناق الأمعاء Strangulation of bowel على مستوى تخثر الوريد .

الأوعية المرادفة Collateral vessels = توسع Dilatation = الدواليه Varicosities

الوريدات الصغيرة Small Venules = توسع Dilatation = إزرقاق Cyanosis

التورم و احتمالية النزف increased trausudation ازدياد النتحة

Swelling and Possible hemorrhage



. Trophic change تغيرات اغذائية



. Varicose ulcers تقرحات دواليه

Strangulation of Bowel إختناق الأمعاء

* تتوالى الأحداث كما يلي :

Mechanical obstruction of veins انسداد وريدي من الخارج (ميكانيكي)



. Congestion and Oedema احتقان ووذمة



الانسداد المتزايد نتيجة تورم الأنسجة - انسداد مجرى الدم الشرياني

Obstruction of arterial blood _ Further obstruction by swelling of tissues



.Bacteria تراكم البكتيريا + Necrosis تنخر النسيج



Gargrene غرغرينا

Infarction الإحتشاء

منطقة متوضعة من التنخر التخثري بسبب نقص الترويه الدمويه الفجائية

(في الدماغ تنخر تميعي) عادة تنتج من خثرة أو صمامة .

(An area) of ischaemic necrosis produced by deprivation

of the blood supply . This usually induced by Thrombosis or
. Emboli

أنواع الاحتشاء :

١- غير نتن (متخمج) Aseptic

٢- نتن (متخمج) Septic .

وكل منهما يكون من حيث اللون :

أ- شاحب - قليل الدم (Pale, Anaemic)

نراه عند احتشاء الكلى، الطحال، القلب والدماغ .

ب- احمر أو نزفي (Red, Haemorrhagic) احتشاء الرئة والأمعاء .

ومن حيث المظهر العيان نلاحظ ان المنطقة المحتشية في الأعضاء الصلبة
مثلية أو هرمية الشكل، القاعدة متجهة نحو كبسولة العضو والقمة باتجاه منطقة
الانسداد الوعائي الدموي .

مصير الاحتشاء

* امتصاص (Absorption) الاحتشاءات الصغيرة جداً .

* تعضي (Organization) المنطقة المحتشية مع تكوين ندبة (Scar)
بالنسبة للاحتشاء النتن .

الأسباب :

- صمامة نتنة Septic emboli .

– عدوى ثانوية في منطقة احتشاء أولي حيث تؤدي العدوى الى تميع (Liquefaction) تميع المنطقة المتخرقة وتكوين خراج (Abscess formation)

الغرغرينا Gangrene

موت نسيجي كبير الحجم مصحوب بالتفسخ غالباً Death of tissue
in bulk, often with putrefaction ونميز :

١- الغرغرينا الجافة Dry Gangrene

يصيب الأطراف بالعادة نتيجة انسداد شريان تدريجياً مما يؤدي الى فقر التروية الدموية (ischaemia) في غياب الودمه والعدوى فتكون مومية الشكل جافة .

٢- الغرغرينا الرطبة Moist Gangrene

عادة يصاب الجزء المتموت بالتفسخ نتيجة العدوى المترتبة على ذلك من النوع الجرثومي – الرمي Saprophytic organisms .

الأسباب متعددة :

- موية (Vascular) – الأثيروما، أم الدم، تخثر شرياني – وريدي، الانصمام، انقباض دموي، ضغط من الخارج .
- رضحي Traumatic .
- فيزيائية – كيميائية Physio-Chemical .
- معدية Infective .
- أمراض عصبية Nervous diseases .

التأثيرات Effects

موضعية (Local) عامة (General)

• الموضعية

- تنخر الأنسجة المصحوبة بالألم - Necrosis accompanied by ulceration .
- التقرح Ulceration .
- العدوى والتقيح Infection and Suppuration .
- فقدان وظيفي Functional loss .
- انثقاب في أعضاء الأحشاء Rupture into viscera .

• العامة

- امتصاص ناتج الانسجة الممتوتة مع العدوى قد يؤدي الى نتائج خطيرة معممه يترتب عليها الموت .
- وهنا نوع آخر وخاص من الفرغرينا يعرف :
- الفرغرينا الغازية Gaseous Gangrene
- والمسبب هو المطثيات (Clostridia) - الأبواغ اللاهوائية .

العوامل المساعدة Predisposing Factors

الكسور المركبة Compound Fractures

المجروح النافذة Penetrating injuries

المصير Prognosis

إذا لم يعطى العلاج بسرعة فائقة - تنتشر العدوى مما يؤدي الى تعميم انتاج الغاز في الأحشاء بما في ذلك الكبد والطحال مصحوب بالانتشار الدموي (Vascular dissemination) نتيجة امتصاص انزيم الهيموزليزين (Haemolysin) مؤدياً الى هبوط مستوى الهيموغلوبين (Hb) - التسمم (Toxaemia) والموت السريع (Rapid Death) .

النزف Haemorrhage

ويعرف على أنه خروج الدم من مجراه في الأوعية الدموية نتيجة الإصابة .

تميز :

- النزف البدئي Primary haemorrhage

ينتج مباشرة خلال الإصابة او اثناء عملية جراحية ويسيطر عليه بانقباض الجزء الإلتهابي للوعاء الدموي بواسطة تكوين خثرة دموية (Clot) .

- النزف الثانوي Secondary haemorrhage

يظهر خلال الاسبوع الثاني بعد الإصابة او العملية الجراحية وعادة يكون بسبب عدوى الخثرة الدموية في نهاية الوعاء الدموي الرئيسي .

أماكن وأنواع النزف :

١- النزف الخارجي : خروج الدم خارج الجسم .

• الرعاف Epistaxis من الأنف .

- نفث الدم Haemoptysis النزف من الجهاز التنفسي عن طريق الفم .
- قيء الدم Haemataemesis النزف من الجهاز الهضمي عن طريق الفم.
- النزف عن طريق فتحة الشرج Maelena .
- الدم في البول Haematuria .
- النزف من الرحم Metrorrhagia .
- النزف الجلدي .
- ٢- النزف الداخلي : يتجمع فيه الدم ضمن أجواف الجسم .
- أ- الصدر المدمى Haemothorax يتجمع الدم في جوف الجنب .
- انصباب دموي تاموري - في جوف التامور Haemopericardium .
- في جوف البريتوان Haemoperitoneum .
- حول الحصى داخل الغشاء الغلالي - القيلة الدموية Haematocoele .
- انصباب دموي ومفصلي Haemarthrosis .

تأثير النزيف :

- كمية دم كبيرة تسبب صدمة نزفية - الموت .
- كمية قليلة متكررة ومستمرة - فقر الدم .
- كمية متوسطة تمثل باضطرابات دموية قلبية مختلفة تتراوح ما بين زيادة ضربات القلب - فقر الدم - انخفاض الضغط الهيدوستاتيكي وسحب السوائل من الأنسجة (الجفاف) .
- كمية قليلة لا تأثير يذكر .

الوحدة الخامسة

الوحدة الثامنة القلب والأوعية الدموية

وتشمل :

- أمراض الشرايين
- أسباب الآلية
- أنواع الأمراض
- الدوالي
- التعريف
- الآلية
- العوامل المساعدة في النشوء
- الآثار
- أم الدم
- التعريف
- الأنواع
- الآلية
- التأثيرات
- ارتفاع ضغط الدم
- الأنواع
- الآلية
- التأثيرات
- المصير
- مرض الشريان التاجي
- الأسباب
- الذبحة الصدرية
- الاحتشاء
- اعتلال عضلة القلب
- الأنواع
- التهاب عضلة القلب
- الأسباب
- الحمى الرثوية
- التهاب غشاء التامور
- الأسباب
- الأنواع
- أمراض الصمامات القلبية المكتسبة والخلقية
- الأنواع
- الآثار
- النتائج
- أمراض القلب الخلقية
- الأسباب
- التصنيف

الوحدة الثامنة أمراض القلب والدورة الدموية Cardiovascular Diseases

Arterial Diseases الشرايين

تعتبر أمراض الشرايين من أكثر وأهم أمراض الجهاز الدوراني نتيجة الآثار الجانبية على الأعضاء الحيوية خاصة الدماغ، القلب والكلى وتعد التغيرات (الأمراض) التنكسية الأصل (Degenerative diseases) للشرايين أكثر سببين شيوعاً بين هذه الأمراض :

١- العصيدة والتصلب العصيدي (Atheroma and Atherosclerosis)

تتمثل بترسب المواد الدهنية الصفراء اللون على هيئة صفائح (Plaques) عميقاً في باطنية الوعاء الدموي (intima) مع تليف السطح حيث يكون التكاثر الليفي ظاهرة اعتيادية (هذه الظاهرة عادة تعرف بأمراض البطانية (Intimal diseases) .

٢- التصلب الشرياني Arteriosclerosis

في هذه الحالة يكون التغير الأساسي هو تنكس النسيج العضلي والمرن (Muscular and Elastic tissue) في الطبقة الوسطى للوعاء الدموي (Lamina Media) تعرف أيضاً بأمراض الطبقة الوسطى (Medial diseases) وتبدلها بطبقة غير مرنة من النسيج الليفي (Inelastic Fibrous Tissue) حيث تكثر فيها التغيرات التنكسية والالتهاب .

- المضاعفات Complications

• التخثر Thrombosis

• النزف Haemorrhage

• أم الدم Aneurysm

آلية تكون العصيدة

• نشوء المرض Evolution of Disease

– المرحلة التكاثرية المبكرة Early proliferative phase

– ترسب المواد الدهنية ببطء في محيط بطانية الوعاء الدموي / تكاثر في الخلايا العضلية الملساء التي تحتوي على فقاعات دهنية / الطبقة الوسطى طبيعية .

– المرحلة المتقدمة Progressing Phase

ازدياد في ترسب الصفائح الدهنية – زيادة التليف وظهور كريستالات الكوليسترول / اختزال في قطر الوعاء الدموي .
ضمور في الطبقة الوسطى .

– المرحلة المتقرحة المتأخرة Late Ulcerative phase

عدم انتظام وتقرح الصفائح الدهنية وقد تتكلس جزئياً مما يؤدي الى تكون خثرة على السطح .
زيادة في تصنيف قطر الوعاء الدموي مع صخر واعوجاج الفوهة .
زيادة صخور الطبقة الوسطى وعدم سماكتها .

• وتقسم أسباب العصيدة الى :

١- عوامل على مستوى الوعاء الدموي

• تلف في بطانة الوعاء (تخشن او اعوجاج - Roughing and Distortion) يؤدي الى دوران جانبي للدم .

• سهولة تمزق البطانة ورقتها .

• تمزق الأوعية الشعرية في الصفائح والنزف داخل هذه الصفائح .

٢- عوامل عامة مساعدة \ Ganeral leading Factors

وهذه تقسم الى قسمين :

أ- داخلية Endogenous

• الجنس Sex (ذكر أو انثى)

• الوراثة Heredity

وتلاحظ في حالات اضطراب الاستقلاب الدهني

ب- بيئية Environmental

• التغذية «الغير صحية» Diet

• الامراض الاستقلابية Metabolic Diseases

• ارتفاع ضغط الدم Hypertension

• التدخين Smoking

• قلة التمارين الرياضية Physical Lack of Exercises

• المناخ البارد Cold climate

وتقسم أمراض الشرايين الى ثلاثة مجموعات :

١- تنكسية Degenerative

٢- التهابية Inflammatory

٣- متنوعه Miscellaneous

« الأمراض الالتهابية (Arteritis)

السبب عادة مجهول وهناك افراضات بأن ردات الفعل التحسسية (Hypersensitivity reactions) على مستوى ضد (جسم مضاد) Autibody / مستضد (مولد الضد) Antigen تؤدي الى تلف جدار الوعاء الدموي .

« مرض بورجر Burger's Disease

حالة مرضية جداً مؤلمة، يصيب فيها الالتهاب الشرايين الصغيرة المحيطية للأطراف السفلية وغالباً العلوية أيضاً (Small Peripheral Arteteries of the Legs Often the Arms) وللمدخنين من الفئة العمرية (٢٠-٤٠ سنة) من الذكور أكثر الفئات العمرية اصابة لهذا المرض وتعد الفرغرينا (Gangrene) من أهم المضاعفات ظهوراً في حالة إصابة أكثر من وعاء دموي.

« أمراض متنوعة Miscellaneous

حالة ومرض رينو Raynaud's Phenomenon and Disease ونمير :

١- الشكل البدئي Primary Form

حيث تتمثل هذه الظاهرة بالضرورة على هيئة نوبات تشنجية (تقلصات) (Essentially Spasmodic Attacks) من شحوب الأصابع (Pallor of)

fingers) يمكن ان تشمل ابهام القدمين، الأذن والأنف نتيجة انقباض (Constriction) الشرايين الصغيرة والشريينات (Small Arteries and Arterioles) التي تتعرض وتتفاعل مع البرد . عادة تصاب النساء اليافعات وهي ظاهرة غير نادرة ويكون الشحوب مصحوباً بالإزرقاق (Cyanosis) وعدم انتظام السيطرة العضلية - العصبية للأوردة الصغيرة . قد تستمر سنين عديدة ولكن لا تترك آثار تلف دائمة . ويمكن ان يترتب على هذه الحالة تغيرات عضوية في الأوعية الدموية، تضيق-انسداد (Stenosis or Occlusion) تخلف تغيرات تنكسية في جلد واعصاب الاصابع وقد تظهر الفرغرينا .

٢- الشكل الثانوي Secondary form

قد يظهر على هيئة عرض (Symptom) لحالات أو أمراض أخرى على سبيل المثال أمراض النسيج الضام عامة (Connective Tissue Diseases) في ظل هذه الأمراض تكون هذه الحالة خطيرة ومحدودة الحركة بالإضافة الى التلف الذي يسببه المرض الأساسي في أجزاء أخرى من الجسم .

• الدوالي Varicose Veins

ظاهرة شائعة الحدوث، تزداد مع تقدم العمر خاصة في الاناث عادة نتيجة الحمل، تصبح فيها الأوردة متعرجة، ظاهرة، منبثقة للخارج باتجاه الجلد، تصيب الأطراف السفلية خاصة .

ويمكن تعريف الدوالي على أنها انبثاق موضعي في الوريد يشبه أم الدم الكيسية (Saccular Aneurysm) في الشريان .
ويعتبر الإرتفاع المتزايد للضغط / التوتر على جدار الوريد لفترات زمنية طويلة من الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الحالة .

حيث تتمثل آلية الحدوث بتوسع تجويف الوعاء الدموي بسبب ازدياد الضغط ومن ثم ضموه غير منتظم جزئي في الأنسجة المتخصصة لتكوين الجدار تحل محلها مما يؤدي الي تمددها وتعرجها (Stretching and tortousity) وبالتالي انبثاقها موضعياً (Localised Bulging).

العوامل المساعدة في تقدم آلية النشوء الأساسي

Factors which Influence the Basic Mechanism

– على مستوى الجدار الوريدي Acting on the Vein Wall

• الوراثة Heredity

• البدانة Obesity

• العمر Age

• فترات الوقوف الطويلة تحرم الأوردة من الاستفادة من حركة العضلات .

– ارتفاع الضغط المضطرب داخل اللمعة (التجويف) Increasing the intraluminal pressure .

• انسداد في مجرى الدم الوريدي (الحمل ، الورم، خثرة) .

– اعتبارات تركيبية تشريحية خاصة وجود الأوردة المتصلة ما بين الأوردة

العميقة والسطحية – Special Anatomical Considerations Co-

municating Veins Between Deep and Superficial Systems)

ويبدو واضحاً أن هناك نوعان من الدوالي :

• سطحية Superficial .

• عميقة Deep .

الآثار Effects

- اعراض الألم والإرهاق Pain and Fatigue .
- تغيرات اغذائية Trophic Changes .
- اكزيما الدوالي مع التلون نتيجة ترسب الهيموسيدرين مما يترتب على ذلك تقرحات جلدية صعبة الالتئام Varicose Eczema with pigmentation Hemosiderin .
- النزف - نادرة الحدوث Haemorrhage .
- التخثر (Thrombosis) كثيرة الحدوث وخطرة خاصة في حالة الدوالي العميقة - الانصمام .
- ومن الأعضاء التي يمكن اصابتها بهذه الحالة:**
- المريء Oesophagus / دوالي المريء نتيجة انسداد الوريد الباب مما قد يؤدي الى النزف مسبباً أحياناً الوفاة .
- فتحة الشرج Anus / البواسير Haemorrhoids عادة تكون مصحوبة بنوبات الإمساك (Constipation) ومن المضاعفات جدية الاهتمام : فقر الدم (Anaemia) نتيجة النزف المزمن أو / و التخثر الحاد مع الألم .
- الصفن Scrotum - القيلة الدوالية Varicocele ويعزى لها العقم أحياناً .

أم الدم Aneurysm

توسع غير طبيعي وموضعي للشريان .

الأنواع

١- حقيقية True

الجدار يكون من طبقة أو عدة طبقات من الجدار المصاب .

٢- غير حقيقية False

الجدار يتكون من النسيج الضام (Connective tissue) عادة ليس جزءاً من تركيبة جدار الوعاء الدموي بالأصل - تحدث نتيجة الرضوح أو فتحات النهاية محددة من النسيج المحيط .

ونميز ثلاثة اشكال لأم الدم الحقيقية :

١- المخروطية «المغزلية» Fusiform .

٢- كيسية Saccular .

٣- مسلخه Dissecting .

تتميز بوجود تجويف كاذب خلال جدران الشريان .

- التأثيرات Effects

• التمزق Rupture مما يؤدي الى النزف - الموت .

• التخثر Thrombosis .

• الضغط الموضعي على الأعضاء المجاورة Local Pressure .

آلية تكون أم الدم

هناك عاملان اساسيان في حدوث التوسع :

١- ضغط الدم Blood Pressure .

٢- مقاومة تمدد جدار الوعاء (ضعف الجدار) Resistance to

. distension of the Vessel Wall

أسباب ضعف جدار الوعاء الدموي

- خلقية Congenital

- ضعف في الطبقة الوسطى والمرنة في منطقة التفرع (Deficiency of Media and Elastic Sites of Branching)

- تشوه في الشرايين والأوردة (Acquired Disease of Arterial Wall)

الأنواع الأخرى من أم الدم

- خلقية (Congenital / Berry Aneurysm)

وهي من أكثر أسباب حدوث نزيف تحت العنكبوتية Subarach-noidal Haemorrhage وعادة تكتشف بالصدفة عندما يحدث الموت لسبب غير مباشر وتتوضع خاصة حول حلقة ويليس في قاعدة الدماغ (Willis Circle).

- أثروميه (Atheromatous Aneurysm)

خاصة عند كبار السن .

- افرنجية (Syphilitic Aneurysm).

- فطرية Mycotic .

- الشريانية - الوريدية (Arterio-Venous Aneurysm / Cirroid)

أم الدم الدواليانية Aneurysm .

وتكون خلقية او مكتسبة نتيجة الرضخ Trauma .

الأوعية الدموية متعرجة مثل الدوالي .

ارتفاع ضغط الدم Hyperternsion

يعرف على أنه ارتفاع ضغط الدم المعمم فوق 140 mmHg انقباضي و 90 mmHg انبساطي .

"Sustained Rise of the Sysyemic Blood Pressure Above the 140 mmHg Systolic and 90 mmHg Diastolic "

أنواع الضغط

١- بدئي أو اساسي Primary or Essential

ونميز :

أ- ارتفاع ضغط الدم الحميد Benign Hypertension .

ب- ارتفاع ضغط الدم الخبيث Malignant Hypertension .

٢- ثانوي Secondary

ينتج عن الكثير من الأمراض العديد منها كلوي ولكن قد تكون دموية Polycythaemia، غدية Endocrine، قلبية، دماغية (إصابات- سرطانات) أدوية (ادرينالين وما يشابه ذلك) .

تأثيرات ارتفاع ضغط الدم الحميد

- مرض تصلب الشرايين (العصيدة الشريانية) .
- تلف نسيجي كلوي بسيط .
- تضخم عضلة القلي الأيسر (البطين) .
- إصابة الدماغ خاصة النزف .

المصير :

- هبوط القلب الاحتقاني - عدم كفاءة الأوعية التاجية (Congestive Heart Failure-Coronary Insuficiency)
- الاحتشاء (Infarction)
- الإصابة الدماغية الدموية (Cerebral Vascular Accident)
- هبوط كلوي (Renal Failure)

ضغط الدم الحثيث :

يظهر عادة بلا مقدمة مع أن بعض الحالات تترتب على ضغط الدم الحميد ويصيب الأفراد دون ٤٥ سنة .

النتائج :

- الجهاز الدوري - القلبي ..
- تعتمد على مدة الإصابة - قد تصاب الأوعية الدموية الصغيرة بالعصيدة مع التنخر الفيبريني .
- الكلى - تصلب الشرايين الحثيث .
- الدماغ - تقريباً قليلة الحدوث .

- المصير

- إذا لم يقدم العلاج - يموت المريض نتيجة :
- الهبوط الكلوي .

- الهبوط القلبي .
- نوبات اصابات وعائية دماغية .

- الأسباب

وتقسم الى مجموعتين أساسية :

١- عصبية Nervous .

٢- خلطية - هرمونية Humoral-Hormonal

وهذه تشمل : أ- الغدة النخامية Pituitary Gland

ب- تنظيم الملح والماء Salt and Water Regulation .

ازدياد نشاط اي من هذه الآلية Increased Activity of any Mechanisms

↓
ازدياد التضيق الوعائي Increased Vasoconstriction

↓
ارتفاع الضغط Hypertension

مرض الشريان التاجي Coronary Artery Disease

تعتبر العصيدة (Atheroma) هي الأساس لإصابة الشريان التاجي مثله مثل الشرايين في انحاء الجسم الأخرى . ويعتبر مرض القلب الخطير هو من أهم المضاعفات الرئيسية :

حيث ان التغيرات العصيدية للشريان قد تكون :

- ١- انسداد حاد بسبب التخثرات الدموية مما يؤدي الى فقر تروية دموي حاد
Acute ischaemia بسبب احتشاء القلب Myocardial infarct

٢- تضيق في قطر الوعاء الدموي (٧٠٪) مما يؤدي الى فقر تروية مزمن

.Chronic Ischemia

مسياً : أ- الذبحة الصدرية Angina Pectoris .

ب- هبوط القلب الاحتقاني Congestive Heart Failure .

ويُعد فقر التروية الدموي مفاجئاً او تدريجياً معتمداً على طبيعة مرض الشريان التاجي وموقع الجزء المصاب .

- تُعرف الذبحة الصدرية (Angina Pectoris) على أنها نوبات ألم قلبية بسبب فترات مؤقتة من فقر التروية الدموي لا ينتج عنها تنخر نسيجي تتمثل سريراً على هيئة ألم عاصر في الصدر، ينتشر الى الكتف والذراع الأيسر او الرقبة والفك السفلي ويستمر لعدة دقائق ويزول مع الراحة وتناول الأدوية الموسعة (Dilation Drugs) أما بالنسبة لاحتشاء القلب فهو يتمثل على هيئة نوبات ألم صدرية حادة لا تزول بالراحة وقد تكون المضاعفات :

١- الموت المفاجيء غالباً نتيجة الرجفان البطيني (Ventricular Fibrillation).

٢- الموت نتيجة الصدمة أو هبوط القلب خلال الأيام الأولى من حدوثه.

٣- الالتئام مع تكوين ندبة ليفية .

٤- التهاب غشاء التامور فوق المنطقة المصابة بالاحتشاء .

٥- تمزق جدار القلب مع نزف الدم في غشاء التامور .

٦- خثرات جدارية - انصمام .

٧- ألم الدم نتيجة ضعف الجزء المصاب .

٨- عدم انتظام دقات القلب Arrhythmias .

٩- توسع منطقة الاحتشاء وتكراره .

اعتلال عضلة القلب Cardiomyopathy

عبارة عن مجموعة من الأمراض المتنوعة بحيث تمثل كل منها على هيئة متلازمة إلا أن كل هذه الأمراض تشترك عادة بالتركيب أو/ و الوظيفة الغير طبيعيين لعضلة القلب تستثنى منها فقر الترويه الدموي، امراض الصمامات والالتهاب .

الأنواع

١- بدئي Primary

السبب مجهول ولكن هناك دائماً تغيران اساسيان :

أ- تضخم العضلة Muscle Hypertrophy .

ب- التليف Fibrosis .

٢- ثانوي Secondary

حيث ان سبب عضلة القلب الغير الطبيعي يكون مصحوباً بأمراض وحالات مرضية متنوعة :

— غذائية Chronic Alcoholism e.g-Nutritional .

— استقلابية — بيوكيميائية E.g Metabolic-Biochemical In-

. filtration of Heart Muscle-Amyloid

— غديه Endocrine Disease

عادة التغيرات كثيرة ومتنوعة تتراوح بين الشخوات الموضعية والتليف إلا أن الآلية مجهولة .

التهاب عضلة القلب Myocarditis

مرض نادر الحدوث بسبب عوامل مختلفة . عادة يكون حاداً معمماً، بؤرياً (Focal) أو يصيب ناحية معينة (Regional) ويعتبر هبوط القلب من التأثيرات الخطيرة الناجمة عنه علماً بأن الشفاء التام وارد في هذه الحالة .

الأسباب

١- الجرثائم (فيحيه) Bacteria-Pyogenic - تقيح بؤري Focal Suppuration .

٢- السموم بما فيها الكيميائية - الدفتيريا Toxins تلف عضلي معمم (Generalised Muscle Damage) .

٣- الفيروسات Viruses التهاب النسيج الخلالي - Generalised Interstitial Inflammation .

٤- مناعية Immunological

الحمى الرثوية Rheumatic Fever

مرض الأطفال والياقنين، يصيب التهاب النسيج الضام في أعضاء متعددة ولكن القلب أهمها :

الأسباب :

التهاب الحنجرة بالمكورات العقدية (Strepococcal Sore Throat) مما يؤدي الى تفاعل مناعي (Immunological Cross Reaction) يسبب حدوث تلف في عضلة القلب على هيئة حمى رثوية والتخلص من المكورات العقدية وتصاب أعضاء اخرى بالإضافة الى القلب :

- المفاصل والأغشية المخاطية بما فيها غشاء التامور .
- الجلد - طفح .
- الجهاز العصبي .

الأعراض العامة

- حمى .
- تعرق وإرهاق .
- ارتفاع ESR .
- مؤشرات التهابية موضعية .

المصير

- الشفاء في كثير من الحالات قد يترتب عليه تندب .
- الإزمان .

التهاب غشاء التامور Pericarditis

عادة يكون ثانوياً نتيجة امراضاً قلبية اخرى او الاعضاء المجاورة اما النوع البدئي - مجهول السبب نادر الحدوث .

الأسباب :

- معدية - جرثومية Infective

غير متخمجة Aseptic

التهاب شغاف القلب، الذئبة الرئوية، الحمى الرئوية وقد يكون :

* حاداً Acute Pericarditis

ويعتاز بالنتحه الالتهابية الفيبرينية Fibrin Exudate أو النتحه المصلية Serous Exudate احياناً مخلوطة بالدم .

* مزمناً Chronic Pericarditis

نتيجة النوبات المتكررة للحمى الرئوية والتغيرات الاساسية تتمثل في التكلس والتعفن مؤدياً لتكوين التصاقات فيبرينية .

النزف في غشاء التامور

بسبب تمزق عضلة القلب نتيجة الاحتشاء الحاد او تمزق أم الدم الأبهري مما يؤدي الى تجمع الدم بين القلب والغشاء (Tamponade) وتحدث الوفاة السريعة بسبب الضغط على القلب .

امراض الصمامات القلبية Valvular Heart Disease

تعتبر الصمامات الاكليلية والأبهري Mitral and Aortic valves عرضة لضغوطات عالية وبالتالي أكثر تعرضاً وحساسية للتلف .

أمراض الصمام الاكليلي Mitral Disease

على هيئة ١- تضيق stenosis . ٢- قصور Incompetence .

الأسباب :

- الحمى الرثوية .
- التهاب شغاف القلب Endocarditis
- بالإضافة الى التنكس المخاطي Myxomatous degeneration - ارتخاء صمامي Floppy valve عند القصور الصمامي .

التأثيرات :

- توسع وتضخم بسيط للأذين الأيسر وعادة تتكون خثرة دموية على حواف الأذين .
- تضخم البطين الأيمن .
- احتقان سلبي مزمن رئوي Chronic Passive congestion of the Lungs.
- ارتفاع الضغط الرئوي Pulmonary hypertension .
- قصور وظيفي في الصمام ثلاثي الشرف Functional tricuspid incompetence .
- احتقان الكبد، الطحال والكلية .

النتائج Results :

- هبوط القلب الاحتقاني الموت
- أو
- الإنصمام نتيجة تخثر الأذين الأيسر .

الصمام الأبهرى

التضييق والقصور Stenosis and Incompetence

الأسباب

- خلقية - نادرة .
- حمى رئوية - غالباً .
- التضييق الكلسي للصمام Calcified Aortic Stenosis
- التهاب شغاف القلب المعدية Infective Endocarditis .
- افرنجي الأبهر Syphilitic Aortitis .

التأثيرات :

- توسع البطين الأيسر Left ventricular Dilatation .
- تضخم عضلة البطين الأيسر مؤخرأ - Later Left Ventricular Hypertrophy .

النتائج Result

الموت بسبب هبوط القلب الحاد مع الوذمة الرئوية .

الصمام ثلاثي الشرفات Tricuspid Valve

ايضاً :

Incompetence القصور

الأسباب :

وظيفية : اعوجاج في حلقة الصمام
الأكليلي عند التضيق .

تركيبية : الحمى الرئوية

Stenosis التضيق

الأسباب :

- توسع الأذنين الأيمن

- هبوط القلب الأيمن

التهاب شغاف القلب

التأثيرات :

- توسع الأذنين الأيمن .

- هبوط القلب الأيمن .

- احتقان وريدي مزمن لأعضاء الأحشاء .

النتائج :

الموت بسبب هبوط القلب الأيمن .

Pulmonary Valve الصمام الرئوي

Incompetence القصور

الأسباب :

• وظيفية : اعوجاج في حالة تضيق الصمام
الأكليلي

• تركيبية : نادراً مصحوبة مع التهاب شغاف القلب

Stenosis التضيق

الأسباب :

- وراثية

- الحمى الرئوية - نادراً

- متلازمة الكارسينويد Carcinoid Syndrome

التأثيرات :

- توسع وتضخم في البطين الأيسر .
- احتقان وارتفاع الضغط الرئوي .

النتائج : هبوط القلب الأيمن .

امراض القلب الخلقية Congenital Heart Disease

الأسباب :

- داخلية Intrinsic .
- وراثية Heredity .
- خارجية Extrinsic :
- فيروسية - الحصبة الألمانية Rubella .
- نقص فيتاميني اثناء الحمل in pregnancy Vitamin Dificency .
- امراض النهائية للجنين أثناء الحمل .
- الافرنجي .
- المعادن الثقيلة - الرصاص .

التصنيف Classification

يعتمد على التركيب التشريحي الأساسي وما يترتب عليه من أعراض :

١- أمراض تسبب الإزرقاق المبكر من اليمين إلى اليسار .

أ- رباعي فاللو Fallots Tetralogy ويتكون من :

- فتحة بين البطينين .

- تضيق الصمام الرئوي .

- الأبهر يعلو الإصابة باتجاه اليمين .

- تضخم البطين الأيمن .

ب- انسداد الصمام ثلاث الشرف Tricuspid Atresia .

ج- فشل انفصال الأبهر عن الشريان الرئوي Truncus Arteriosus .

٢- أمراض تحدث لزرقاقاً متأخراً من اليسار الى اليمين

أ- فتحة بين الأذنين Interatrial Septal Defect (A.S.D) .

ب- فتحة بين البطينين Interventricular Septal Defect (V.S.D) .

ج- بقاء القناة الشريانية مفتوحة Patent ductus arteriosus .

٣- أمراض لا تسبب إزرقاقاً :

أ- تضيق برزخ الأبهر Coartation of Aorta .

ب- تضيق الصمام الرئوي .

ج- تضيق الصمام الأبهر .

الوحدة التاسعة

الوحدة التاسعة
الدم والعقد الليمفاوية
Blood And Lymph Nodes

- * فقر الدم
 - بسبب نقص الحديد .
 - بسبب نقص B₁₂ .
 - بسبب نقص حامض الفوليك .
- * فقر الدم اللانموي .
- * فقر الدم الإنحلالي .
- * امراض نخاع العظم .
- * الاضطرابات العددية لخلايا الدم .
- * التهاب العقد الليمفاوية .
- * ابيضاض الدم - سرطان الدم .
- * الأمراض الليمفاوية

فقر الدم بسبب نقص B₁₂ Pernicious Anemia

نتيجة التغذية الغير صحية أو سوء الامتصاص بسبب ضمور مخاطية المعدة مؤدياً الى فقدان العامل الداخلى (Intrinsic Factor) إما نتيجة الوراثة أو عيوب ذات آلية مناعية بسبب تكون أجساماً مضادة وتشمل الأعراض :

- فقر الدم العام بما في ذلك الضعف والوهن، الشحوب وصعوبة التنفس، تضخم الطحال والكبد نسبياً، اعراض دفاعية على مستوى الاضطرابات النفسية، اضطرابات عصبية من ضعف عضلي مصحوب بالخزخز والخلل هنا بالإضافة الى احمرار وألم اللسان وأعراض هضمية من تناوب الإمساك والإسهال وفقدان الشهية ويكون العلاج بإعطاء فيتامين B₁₂.

فقر الدم نتيجة نقص حامض الفوليك

Anaemia due to Folate Drificiency

السبب عادة التغذية الغير صحية (كبار السن، الأطفال الذين يتغذون فقط على الحليب ومرضى تشمع الكبد).

ونقص الامتصاص (تعاطي أدوية الصرع، متلازمة سوء الامتصاص) بالإضافة الى ازدياد حاجة الجسم (Increased Demand) أثناء الحمل، فقر الدم الإنحلالي المزمن.

الأعراض تشابه أعراض فقر الدم بسبب نقص فيتامين B₁₂ إلا أنه لا يوجد اصابات عصبية.

والعلاج يتم بإعطاء حامض الفوليك 15mg يومياً.

• فقر الدم اللاتَمَوِي Plastic Anaemia

يتميز بنقص خلوية النقي مؤدياً في الغالب الى نقص الخلايا الشامل معتمداً على معدل ونوع الخلايا الجذعية المصابة (Level of stem cell affected).

الأسباب :

– عائلية مكتسبه (التهابات عابرة، أدوية ومواد كيميائية، اشعة، فقر دم ثانوي، سرطانات).

فقر الدم

توجد انواع متعددة ومتنوعة عن فقر الدم تصنف وفقاً لنوعية السبب الرئيسي نخس منها بالذكر الأنواع التي تنتج بسبب نقص العامل الضروري اللازم لتركيب الهيموغلوبين او نضج وتقدم أرومه الحمراء (Haemoglobin Synthesis or Erythroblast maturation and development) وهي :

أ– نقص الحديد .

ب– فيتامين B12 .

ج– حامض الفوليك .

فقر الدم بسبب نقص الحديد (Iron Deficiency Anaemia)

وهو أكثر الأنواع شيوعاً والأسباب قد تكون :

١– استهلاك واستنفاد كمية الحديد المخزنة Utilization of Iron stores .

٢- قلة الهيموغلوبين الدوراني Reduction of Circulating Haemoglobin .

العوامل المساعدة Precipitating Factors

- أ- الإصابات الفيزيولوجية المتزايدة .
- ب- سوء امتصاص الحديد .
- ج- النزف (اعتلالات الجهاز التناسلي الأنثوي، الجهاز الهضمي) .

الأعراض العامة

الوهن والضعف، الشحوب، الصداع والدوار، التهاب اللسان وضمور حليماته، تشقق زوايا الفم، أظافر ملعقيه، صعبية البلع، جفاف وتقصف الشعر.

العلاج : يكون بمعرفة السبب وإعطاء مركبات الحديد .

أما العلاج فيكون أساساً بمعرفة السبب المباشر وقد يشمل العلاج الوقائي من زيادة كمية الحديد، نقل الدم «الصفائح»، أدوية Corticosteroid، مضادات حيوية في حالة الالتهابات، استئصال الطحال بعد عدة مرات نقل الدم وزرع النقي .

• فقر الدم الإنحلالي Haemolytic Anaemia

ينتج بسبب كثرة تحطم وقصر مدة حياة كريات الدم الحمراء .
الأسباب :

- داخلية (Intrinsic) وقد تكون وراثية او مكتسبة ويشمل تشوه ضمن نفس كريات الدم الحمراء .
- خارجية (Extrinsic) .
- وغالباً مكتسبة وقد تكون :
 - أ- مناعية .
 - ب- إصابات فيزيو- كيميائية (الملاريا)
- أي أن التشوه لا يكون في نفس الكرية الحمراء .

الأعراض العامة :

- انخفاض معدل الهيموغلوبين (ظهور البرقان، ارتفاع نسبة البيليروبين في البول والبراز، بيله دموي) .
- فرض نشاط الحمله المولده لكريات الدم الحمراء (ازدياد نسبة الشبكيات في الدم المحيط) .
- فرط نشاط الحمله المولده للكريات الحمراء في نقي العظم .

امراض نخاع العظم Chronic Myeloproliferative Syndromes

عادة تكون مزمنه بطبيعتها، متعددة ونخص بالذكر :

- إحمراء الدم Polycythaemia

ويعرف على أنه ازدياد مضطرد في حجم كريات الدم الحمراء

An absolute increase in red cell volume

التصنيف :

١- بدئي Primary

Polycythaemia vera

٢- ثانوي Secondary

يتوافق مع أمراض أخرى :

- نقص تشبع الدم بالأكسجين .

- أمراض الكلى .

- اعتلال الهيموغلوبين الوراثي .

يصيب الذكور أكثر من النساء خاصة كبار السن (٥٠ سنة) .

الأعراض العامة

احمرار واحتقان الوجه، حكة جلدية تزداد مع الحمام والنوم، صداع
تضخم الطحال والكبد، خثرات دموية، إصابات قلبية، وعائية، احتشاء القلب،
أو غرغرينا الأطراف .

العلاج :

يعتمد على خفض الدم ومعرفة السبب .

كثرة الكريات البيضاء Leucocytoses

زيادة في عدد الكريات البيضاء عادة الخلايا المعتدلة في الدم المحيط

(An Increase in Leucocytes, usually Neutrophils in the Peripheral Blood) والأسباب قد تكون :

- التهاب جرثومي حاد .
- سرطانات .
- حالات النزف وتحلل الدم .
- إحصار الدم وتكاثر نقي العظم .
- إبيضاض الدم المزمن .
- أمراض جلدية معمم .
- متنوعه : زيادة عدد الكريات الحامضية (Eosinophils)، العائلية والرتوية .

نقص كريات الدم البيضاء Leucopenia

في حالات التهابية عديدة، سرطانات الدم واستخدام بعض الأدوية والعلاج يكون بمعرفة وعلاج السبب وكثرة كريات الدم الحمراء-Erythrocytosis .

التهاب العقد الليمفاوية Lymphadenitis ويقسم الى :

١- التهاب العقد الليمفاوية الحاد Acute Lymphadenitis

عادة يكون المسبب جرثومي مؤدياً الى كثرة الخلايا المعتدلة

(Neutrophils) في الجيوب الليمفية، التضخم مع الألم . أما النتائج تكون غالباً الشفاء او تكوين الخراج او الندب الرقعيه . لا يوجد تزايد في عدد الخلايا المعتدلة في حالة الالتهاب الفيروسي .

٢- التهاب العقد الليمفاوية المزمن Chronic lymphadenitis

- أ- نوعي : التدرن، الساركويد، داء المقوسات Toxoplasmosis.
- ب- غير نوعي : أثناء الالتهابات المزمنة المعممة او الموضعية مسبباً تضخم وصلابة العقد الليمفاوية نتيجة التنكس الزائد التصنع (Reactive Hyperplasia) ومن الملحوظ ايضاً تضخم العقد الليمفاوية لأسباب اخرى غير النهائية كما هو الحال في السرطانات نتيجة ترحال الخلايا السرطانية اليها، امراض الجلد المزمنة .

ايضاض الدم (سرطان الدم Leukaemia)

عبارة عن حالات مرضية تنشأ نتيجة التكاثر الورمي للخلايا الجذعية في نقي العظم . وقد يكون التكاثر بطيء التقدم بحيث تكثر (Acute Leukaemia) الخلايا الناضجة مما يؤدي الى ظهور ايضاض الدم المزمن (Chronic Leukaemia) .

الأعراض العامة

- ١- فقر الدم Anaemia .
- ٢- قلة الخلايا المعتدلة (Neutrophils-Neutropenia) مسبباً الكثير من الالتهابات .

٣- قلة الصفيحات الدموية (Thrombocytes-Thrombocytopenia) مسبباً النزف التلقائي .

المحصلة - هبوط تام في وظيفة نقي العظم .

السبب مجهول ولكن يفترض ان هناك عوامل مساعدة :

١- امراض وراثية .

٢- المواد المشعة .

٣- الالتهابات الفيروسية .

٤- التسمم بالبنزين .

٥- عامل السن .

التصنيف :

تميز انواع متعددة بناء على معدل الخلايا السائد التكاثرية الخبيث .

أما العلاج يكون :

بالأشعة والأدوية الكيماوية بالإضافة الى العلاج الوقائي من الالتهاب والنزف .

الأمراض الليمفاوية (Lymphoma)

عبارة عن مجموعة من الأورام البدئية الخبيثة التي تصيب الجهاز الليمفاوي الشبكي (Lymphoreticulosis) وتقسم الى :

١- هودجكين ليمفوما Hodgkin Lymphoma

كل الفئات العمرية معرضة للإصابة .

٢- لاهودجكن ليمفوما Non- Hodgkin Lymphoma

وكل منهما قد يكون معممًا أو موضعياً .

الأمراض العامة

- تضخم العقد الليمفاوية، الطحال والكبد - الضغط على الأعضاء المجاورة والألم .
- كثرة الخلايا البيضاء في المرحلة المبكرة وقلة العدد في المراحل المتأخرة.
- حمى - تعرق، قلة الشهية ونقص الوزن، الوهن العام، طفح وحكة جلدية .
- دموية - فقر الدم .
- مناعية - قابلية التعرض للإلتهابات .

العلاج :

الأشعة والأدوية الكيماوية .

والتشخيص يتم بواسطة الفحوصات المخبرية، الأشعة والعينات النسيجية.

الوحدة الحاشية

الوحدة العاشرة

الجهاز التنفسي

Respiratory System

ينقسم الى :

- الجهاز التنفسي العلوي ويشمل :
الأنف، الحنجرة، البلعوم، اللوزتين والجيوب الأنفية .

- الرئتين والقصبات

وهذه تشمل :

- التهاب القصبات الحاد والمزمن .
- التهاب ذات الرئة .
- التهاب غشاء الجنب .
- الربو .
- انتفاخ الرئة .
- أمراض الرئة التغيرية .

امراض الجهاز التنفسي العلوي

هناك التهابات عديدة متعارف عليها تشمل الأنف Nose، الجيوب الأنفية Sinuses، البلعوم Pharynx، الحنجرة Larynx، الرغام Trachea والقصبات Bronchi. عادة تكون هذه الالتهابات بسيطة ومحدودة ولكن يمكن ان تتحول الى مزمنة وفي الغالب تظهر في صورتين معتمدة على العوامل المسببة Causal agents :

١- التهابات فيروسية Viral infections

وهذه تتصف بالالتهاب الحاد مع نقص للغشاء السطحي دون وجود نتحه خلوية مما يزيد من احتقان، تورم وزيادة افراز في المخاط يعرض المخاطية للالتهابات الثانوية وتراكم المرحلة الثانية «الجرثومية».

٢- التهابات جرثومية Bacterial infections

وهذه ايضاً تأخذ الاتجاه الحاد مع وجود نتحه خلوية ومن أكثر أنواع الجراثيم السببية هي :

المكورات العقدية Streptococcus بأنواعها القيحية والرئوية .

- Haemophilus Influenza

- Neisseria Catarrhalis

ومنذ كانت الالتهابات الفيروسية تولد نوعاً من المناعة الموقته فإن تكرار المرض متعارف عليه مما قد يؤدي الى الإزمان هذا بالإضافة الى ان زيادة استخدام المضادات الحيوية في العلاج قد تصبح بعض انواع الجراثيم مقاومة للعلاج تؤدي الى التهابات تنفسية خطيرة جدية بالإهتمام .

الزكام (Acute coryza, Common cold)

ومن مضاعفاته ان الالتهاب الجرثومي قد يصبح من مخاطي قيحي

وتكرار المرض يؤدي الى الإلزام وتكون المراحل (Nasal polyp) وتضخم النسيج الليمفاوي (Lymphoid tissue, Adenoids) مما يؤدي الى تضيق المجرى التنفسي .

التحسس Allergy

قد تكون موسمية (seasonal) بسبب اللقاح (Pollens) من الأشجار والأعشاب وتغير موسمية (Non-seasonal) والسبب عادة الغبار المنزلي (House Dust) سواء كان حيواني أو انساني أو نباتي .

التهاب الحنجرة والبلعوم الحاد Acute Laryngitis and Pharyngitis

بالإضافة الى الشكل الحاد المتعارف عليه هناك اشكالاً خاصة نذكر منها على سبيل المثال :

الحنانق (Croup) عند الأطفال .

الالتهاب الغشائي الكاذب Pseudomembranous Inflammation خاصة في غشوى القصبة .

أه ثانياً كما هو الحال عند مرضى العناية المركزة أو التنبيب الرغامي (Endotracheal Intubation) وتمتاز كل هذه الاشكال الالتهابية بحدة الوذمة التي قد تؤدي الى الموت Death نتيجة الاختناق (Suffocation) .

أما الالتهاب المزمن فإنه يتميز :

- بتغير في الغشاء السطحي المبطن (Change in Lining Epithelium) زيادة الإفراز المخاطي (Increase in Mucous Secretion) ويعتبر التدخين من العوامل المعرضة الرئيسية التي تساعد على ظهور هذه الحالة وتزداد سوءاً بسبب تأثير اللقاحات الجوية وتكرار الالتهابات التنفسية الحادة وهناك

اشكالاً النهائية نوعية مثل السل، الزهري وكلاهما يتميز بالتقرحات الشديدة (Severe Ulcerations) التي قد تؤدي الى تكون الندب والتضييق (Stenosis).

الأورام Tumours

- البسيطة (Simple) وهذه حميدة عادة تكون ظهارية المنشأ حليمية الشكل في الغالب (Epithelial Papiloma) أو من النسيج الضام (Connective tissue) قد يظهر على شكل ما يُعرف بعقدة المغنين (Singer's nodule) تتكون من تكاثر الغشاء والنسيج الضام أو عادة على هيئة ورم وعائي دموي (Haemangioma) مما يسبب النزف المتكرر من الأنف (Nose-bleeding) أما الخبيثة وهذه نادرة الحدوث تكون ظهارية حرشفية المنشأ (Squamous cell carcinoma).

أمراض الرئة

التهاب القصبات الحاد Acute Bronchitis

السبب في الغالب جرثومي وفيروسي بعد الإصابة بالحصبة أو الزكام، المواد المحرشة Irritants وتحسسي Allergic ويأخذ اشكالاً مختلفة منها النزلية Catarrhal، غشائية Membranous، ليفيني Fibrinous، مدمى Haemor-rhagic أو قيحي Purulent.

مصير هذا المرض قد يكون :

١- الشفاء Recovery .

٢- الإزمان Chronic Bronchitis .

٣- التهاب ذات الرئة والقصبات Branchopneumonia

التهاب القصبات المزمن Chronic Bronchitis

عالمياً متفق على التعريف بأنه سعال ينتج قشع مخاطي لمدة ٣ أشهر متوالية أو أكثر كل سنة .

Productive Cough with mucoid sputum for 3 months or more in each year would seem preferable. يستخدم في الوقت الحالي بكثرة مرض المجاري التنفسية الانسدادي المزمن - Chronic obstructive airway disease بسبب الارتباط الوطيد بانتفاخ الرئة Emphysema ونقص في التوافق بين الأعراض المرضية والسريية Lack of correlation between pathological and clinical manifestations عادة يصيب الذكور في سن يافعة منذ البداية وعلى الرغم من ان طبيعة المرض النهائية إلا أن هناك الكثير من العوامل المؤهبة لحدوثه قد تكون غير النهائية مثل :

– التدخين Tobacco Smoking .

– التحريش المزمن Chronic irritation بواسطة استنشاق المواد الكيميائية، الهواء الملوث .

– الفشل في تنقية وتنظيف المسالك القصبية Failure of maintenance of adequate bronchial toilet كما هو الحال في وجود أمراض مصاحبة مثل توسع الشعبات القصبية الالتهاهي Bronchiectasis .

– عدم كفاءة الأجهزة الوقائية Inefficiency of protective mechanisms نتيجة استمرارية وجود التهاب ذو درجة خفيفة Low-grade infection مما يساعد دائماً على تجدد حدوث الالتهابات الحادة .

– التهابات الأجزاء السفلية من الجهاز التنفسي المزمنة Maintenance of chronic infection in the lower respiratory tract .

مصابر المرض :

- قنص مخطط قنص - توسع القصباء (Emphysema) نئبئة الانسداد Obstruction .
- التهاب ذات الرئة Pneumonia .
- هبوط القلب الرئوي Cor-Pulmonale .
- قصر العمر والوفاة المبكرة .

التهاب ذات الرئة Pneumonia

يعتبر النسيج الحويصلي الوحدة الأساسية في الالتهاب الرئوي ونمبز ثلاث أنواع رئبسية :

- ١- التهاب ذات الرئة والقصباء Bronchopneumonia-Lobular Pneumonia .
- ٢- التهاب الرئة الفصبي Lobular Pneumonia .
- ٣- التهاب الرئة الخلالي Interstitial Pneumonia .

ونخص بالشرح هنا :

١- التهاب ذات الرئة والقصباء

ويعرف علي أنه التهاب القصباء النهائي المنتشر والحويصلات المخططة بها وأساساً بؤري التوضع . المسبب جرثومي أولياً وقد يكون ثانوياً بعد إصابة فيروسية ويمتاز هذا النوع من الالتهاب باختلاف المراحل التي يمر بها كونه بورياً يشمل فصيص واحد أو أكثر يكون في البداية محتقن اللون داكن ثم رمادي نئبئة تحلل كريات الدم الحمراء وظهور النتحة التليفية والخراج في القصباء المركزية .

- ١- الشفاء .
- ٢- التندب الحبيبي .
- ٣- انتشار الخراج (تغيرات قيحية) Suppurative changes .
- ٤- الموت .

٢- التهاب الرئة الفصلي Lobular Pneumonia

وكما يوحي الاسم يكون مصاب بالالتهاب فص او اثنين بالكامل والوحدة الأساسية للالتهاب هي الحويصلات حيث ينتشر الالتهاب بواسطة القنوات يصيب الذكور بنسبة اعلى من النساء .
ويمر بأربعة مراحل اساسية :

- ١- الاحتقان Congestion (1-2 day).
- ٢- التكبد الأحمر Red hepatisation (2-4th day) يكون الفص جاف، صلب ومتحجب وتبدأ التتحه الفيبرينية بالتكون .
- ٣- التكبد الرمادي Grey hepatisation (4th - 8th day) يزداد النسيج تصلياً، غشاء الجنب مغطى بالتصاقات الليفية وتزداد التتحه بالألياف داخل الحويصلات والخلايا القاعدية (Neutrophils) .
- ٤- الشفاء Resolution (8th-9th day) يتنحى الالتهاب جانباً في الغالب نتيجة الانزيمات المحللة التي تفرزها الخلايا القاعدية ودور الخلايا البالعة في ذلك .

التهاب غشاء الجنب (Pleurisy)

عادة يكون الإلتهاب ثانوياً نتيجة التهابات رئوية، يتصف بتشكيل نتحه ليفيه دائمه . ومن المضاعفات الجديرة بالذكر :

١- التهاب غشاء الجنب القيحي Empyema .

٢- التهاب غشاء التامور .

٣- انصبامات دماغية قيحية .

الربو القصبي Bronchial Astma

يعتبر في طبيعته حالة تحسسية تتصف بنوبات انقباضية ينتج عنه ضيق تنفسي على هيئة أزيز أثناء الرفير الطويل خلال النوبة نتيجة تراكم المخاط اللزج
An allergic condition, in nature, manifest by spasmodic attacks of severe dyspnoea producing expiratory wheezing with prolongation of expiration due to the plugging of bronchioles with viscid mucus.

- انخماص «فشل» الرئة Pulmonary Collapse نتيجة الانسداد القصبي بالمخاط .

- القلب الرئوي Cor-pulmonale .

- قابلية الإصابة بالإلتهاب القصبي .

انتفاخ الرئة Emphysema

يوجد في هذه الحالة زيادة توسع دائم في حجم الفراغات الهوائية التالية للقصبيات الانتهاية مع تغيرات تحطيمية في جدرانها مما يؤدي الى صعوبة تنفس مصحوب بسعال مزمن .

In this Condition there is a permanent increase in the size of air spaces distal to the terminal bronchiole with obstructive changes in their walls . It Causes dyspnoea and is associated with chronic coughing.

قد يكون موضعي أو معمّم وله أنواع متعددة وفقاً لآلية الأجزاء المصابة من الرئة لا داعي لذكرها إلا أن الرئة في هذه الحالة تكون كبيرة الحجم شاحبة اللون مع تكون فقاعات هوائية في الأجزاء المصابة .

المضاعفات

- فشل في التهوية Inadequate Ventilation .
- ارتفاع الضغط الرئوي وتضخم القلب الأيمن - القلب الرئوي Cor-pulmonale .
- استرواح الصدر الغازي Pneumothorax نتيجة انفجار الفقاعات الهوائية Rupture of bulae .

أمراض الرئة التغيرية (Dust-diseases-Pneumoconiosis)

تقسم الغبار من حيث النوعية الى :

١- غبار غير عضوية Inorganic Dusts .

التغيرات النسيجية مكونة من ردة فعل تحسسي وتضخم عضلي نتيجة الانقباض الطويل .

وهناك نوعين من الربو القصبي :

١- خارجي Extrinsic الربو القصبي نوع ١ زائد التحسس «ردة

فعل مناعية» "Immune reaction type I Hypersensitivity" .

الأسباب :

- عائلية - وراثية .
 - يبدأ في الطفولة .
 - تحسس زائد .
 - من اعراضه اكزيما جلدية، تحسس على بعض انواع الأطعمة .
 - قابلية تكوين اجسام مضادة من نوع IgE .
 - المواد التحسسية عادة تكون لقاحية Pollen، القشرة Dandruff،
الغبار المنزلية mite House dust .
 - تختفي النوبات مع تقدم العمر .
 - لا يوجد تحسس على الأدوية .
 - لا ينتج عنه التهاب القصبات المزمن او انتفاخ الرئة .
- ٢- داخلي Intrinsic

تنظيم ذاتي غير طبيعي للمجاري التنفسية

Abnormal autonomic regulation of airways

- لا توجد قصه عائلية .
- لا يوجد فرط تحسسي .
- يبدأ متأخراً .
- المواد التحسسية غير متعارف عليها .
- تزداد النوبات في الشدة مع الوقت .

- يوجد تحسس على بعض انواع الأدوية .
- قد يكون مصحوباً بأمراض تنفسية أخرى .

المضاعفات

- حالة ربو مستمر Status Asthmaticus


تفاوت بشكل ملحوظ ردة فعل النسيج على نوعية الغبار المستنشق مثل: الكربون Carbon، السيليكا Silica، الاسبست Asbestos، الهيماتيت Hae-matite والبيريليوم Beryllium، بعضها عديم الأذى والأخرى قد تسبب ضرراً بليغاً في نسيج الرئة .

٢- غبار عضوية Organic Dusts

مثل القطن، الكتان، الألياف وغيرها من الأنواع النباتية الأصل التي تدخل في الصناعة مما يزيد من أمراض الرئة المهنية (Occupational pulmonary diseases) .

التغير المرضي الأساسي Basic Pathology

معظم هذه النوعية من الغبار تطرح للخارج والبعض الذي يتوغل عميقاً ويصل الى الحويصلات الهوائية تبتلعها الخلايا البالعة (Macrophages) وبذلك تعاق حركتها وبعض هذه الخلايا البالعة يصل الى العقد الليمفاوية المجاورة مخلقة تجمعات غبارية داكنة اللون تحيط بها تليفات نسيجية وهذه قد تكون ملحوظة الى درجة عالية مما يؤدي الى انسداد الحويصلات حيث تعتمد درجة وموضع التليف على نوع الغبار هذا بالإضافة الى ان بعض الأنواع قد تصل الى سطح غشاء الجنب (Pleural Surface) .



١- داء الفحم Anthracosis

تجمع ذرات الكربون في النسيج الرئوي نتيجة تعرض عمال مناجم الفحم المستمر لهذا المعدن الخام ينتج عنه :


- تغيرات غالباً متوضعه في الأجزاء العلوية من الرئة يتم ابتلاع هذه الذرات بواسطة الخلايا اليالعة تلتصق بجدار الحويصلات، وتتلف مما يؤدي مع الوقت الى انسداد الحويصلات أو/أو توسع القصبيات النهائية نتيجة ارتفاع الضغط الهوائي وظهور انتفاخ بؤري Focal Emphysema ليس له تأثيرات جانبية تذكر على الوظيفة التنفسية .

- تغيرات تليفية واسعة المدى ومتزايدة تؤدي الى تأثيرات وظيفية شديدة

. Severe Functional Effects

The functional effects are severe:

التأثيرات الجانبية عادة شديدة



٢- داء السيليكا Silicosis

نراه عند العاملين في مناجم النحاس، الذهب، الرصاص والمهاجر بالإضافة الى التليف الملحوظ عادة يوجد عقيدات تتكون من صفائح هياالينية بجوار القصبات والأوعية الدموية (Concentric laminae of hyaline, ac-cellular Collagen) حيث تكمن خطورة هذا المرض بأن التخریب النسيجي للقصبات، الحويصلات وانسداد الأوعية الدموية يؤدي الى صعوبة في التنفس وعادة تكون الوفاة نتيجة نقص الأكسجة وارتفاع الضغط الرئوي الذي يسبب هبوط القلب الأيمن .

٣- داء الاسبيست Asbestosis

يسبب هذا الداء ٣ انواع من الأمراض :

أ- التليف وخاصة في الأجزاء السفلية من الرئة -> تخريب النسيج التنفسي المتزايد Progressive destruction of respiratory tissue .

ب- الالتصاقات التليفية لغشاء الجنب تستمر سنين طويلة -> فشل تنفسي Respiratory Failure وإمكانية ظهور ورم القصبيات الخبيث ظهاري المنشأ غدى الشكل (Adenocarcinoma) .

ج- ورم غشاء الجنب الخبيث -> ورم الظهارة المتوسط Mesothelioma

الآلية المرضية

تعتمد على :

١- الذرات التغيرية بحد ذاتها تؤدي الى سعال مزمن، ضيق تنفس -> التهاب القصبات المزمن وعدوى متداخلة وهذه بدورها تؤدي الى زيادة تكاثر الغدد المخاطية -> انسداد القصبات -> نقص التهوية (Hypoventilation) -> فشل تنفسي .

٢- العدد الكبير منها يؤدي الى امراض متنوعة تكون نتيجة الفطريات والعفن الملوثة بها الذرات التغيرية، ومن الملحوظ في هذه الحالة فرط التحسس Hypersensitivity وردة الفعل المناعية Immunological reaction مما يؤدي الى نوع خاص من التهاب الرئة الخلالي المزمن بأنواعه المختلفة (Chronic interstitial pneumonia) وبالتالي هبوط القلب الأيمن والفشل التنفسي .

أورام الرئة

١- الحميدة :

- الحليمي Papilloma .
- غدي قصبي Bronchial Adenoma .

٢- الخبيثة : الأكثر شيوعاً

قصيية الأصل (Bronchogenic) ظهارية المنشأ شائكة الخلايا
Squamous cell Carcinoma أو غدية Adenocarcinoma وهناك صغير
الكريات Oat cell Carcinoma .

الأسباب

نسبة إصابة الذكور / الإناث ١:٦ ويعتبر التدخين من العوامل المؤهبة
الرئيسية لحدوث الأورام الخبيثة بالإضافة الى عوامل البيئة الملوثة وتقدم الصناعة
والتكنولوجيا مما يزيد من استخدام الموارد الكيماوية والمشعة ... الخ .

الوحدة الحادية عشرة

الوحدة الحادية عشرة

الجهاز الهضمي
Gastrointestinal Tract

* المريء

- الانسداد والتشنجات الخلقية .
- الارتداد .
- الدوالي .
- الأورام .

* المعدة

- التهاب .
- القرحة .
- الأورام .

* الأمعاء

- امراض الأمعاء

الخلقية

المكتسبة

- التهاب .
- الانسداد .
- سوء الامتصاص .
- امراض الزائدة الدودية .
- الأورام .

الجهاز الهضمي

ويعتمد من الفم حتى فتحة الشرج وفي هذه الوحدة نخص بالذكر :

أمراض المريء :

وهذه قد تكون خلقية او مكتسبة :

Congenital : الخلقية

• الارتق والنواسير Atersia and Fistulas

تشوهات نادرة الحدوث وترافق عادة تشوهات عضوية أخرى، والرتقي (عدم انثقاب) المريء هو عبارة عن تضيق شديد لجزء من المريء يكون غالباً بسبب نمو رتوج مخاطية . أما النواسير فهي عبارة عن عدم انفصال المريء عن الرغامى أثناء نموهما ووجود قناة تربطهما ببعض مما يؤدي الى استنشاق الأغذية مثل الحليب او ارتداده من المعدة خلال القصبات والرئة .

اللا إرتخاء فؤاد المعدة (Achalasia of the Cardia, Cardiospasm)

يبدأ في مرحلة مبكرة من العمر . يتميز بفشل صمام الفؤاد بالإرتخاء وبالتالي فإن الجزء النهائي من المريء لا ينقبض بحركة تمعجية (Peristaltic) مع قلة عدد العقيدات العصبية مما يؤدي الى توسع، تعرج وتضخم في هذا الجزء من المريء بالإضافة الى التقرحات المخاطية ومن مضاعفاته أنه يؤهب لحدوث الخراجات الرئوية، التهاب الرئة الاستنشاقية وسرطان المريء .

العلاج : جراحي .

دوالي المريء (Varices)

توسع وترجع أوردة المريء خاصة عند ملتقى المريء والمعدة بسبب ارتفاع الضغط الوريدي البائي عند تشمع الكبد مما ينتج عنه ارتداد الدم من الوريد البائي الى الدورة الدموية العامة وبالتالي توسع هذه الأوردة . ومن مضاعفات هذه الظاهرة تفرح المخاطية والنزف في الجهاز الهضمي .

التهاب المريء Oesophagitis

- قد يكون رضحي Traumatic

نتيجة بلع أجزاء حادة بغير قصد أو عند التنبيب .

- تناول المخرشات Corrosives

عادة بطريقة الخطأ أو بقصد الانتحار (السموم، المواد القلوية والحامضية ... الخ) ينتج عنها تقرحات شديدة قد تؤدي الى الموت او تضيق تليفي شديد في حالة البقاء على الحياة .

- ارتداد محتوى المعدة Reflux of gastric juice

مسبباً التهاب مخاطية الجزء النهائي من المريء وبالتالي تقرحها .

- أمراض معدية Infections

نخص منها بالذكر السل .

- مريء باريت Barret's Oesophagus-Peptic Ulceration

نتيجة تحول مخاطية الجزء السفلي للمريء الى اسطوانيه معوية بدلاً من المسطحة البطنية الطبيعية للمريء مما يؤدي الى تقرحات النهايه مؤلمه قد تسبب النزف الهضمي، الانتقاب او التضيق التليفي في حالة الشفاء .

أورام المريء :

١- حميدة : مرجليه، عضلية، ليفية، وعائية .

٢- خبيثة والأكثر خطورة .

ظهارية المنشأ مسطحة متراصه (Squamous cell Carcinoma) الأكثر حدوثاً مسبباً عسر البلع نتيجة تضيق أو انسداد قطر المريء يصيب الذكور أكثر من الإناث غالباً بعد سن الخمسين ويأخذ اشكالاً مختلفة منها العقدية المتقرحة أو تشبه زهرة القرنبيط أو المرجليه .
الإنذار عامة سيء .

أمراض المعدة

- تضيق بواب المعدة Pyloric stenosis

- خلقي Congenital .

نتيجة تضخم عضلة الصمام وخلل في العقيدات العصبية .

- مكتسب Acquired

نتيجة الالتهابات، القرحة والأورام الخبيثة .

المضاعفات : سوء التغذية .

العلاج : جراحي .

• التهاب المعدة Gastritis

حاد .

مزمن .

التهاب المعدة الحاد Acute gastritis

عادة يكون مؤقتاً إلا في حالات التسمم بقصد الانتحار والأسباب متعددة ومتنوعة منها استخدام الأدوية مثل الإمبرين، المخدرات مثل المواد القلوية والحامضية، إساءة تناول الكحول والصدمات النفسية ومن الملحوظ تضخم، احتقان وتوذم المخاطية مع تقرحات سطحية . عادة لا يشكو المريض من أعراض معينة إلا إذا كانت عديدة وقيحية (Phlegmonous gastritis) .

التهاب المعدة المزمن Chronic gastritis ونمیز منها :

- السطحية Superficial .
- الضمورية Atrophic .
- التضخامية Hypertrophic .

أما الأسباب فهي أيضاً متنوعة نخص بالذكر :

- أمراض مؤهبة مساعدة مثل فقر الدم بسبب نقص فيتامين B12 .
- جراثيم عصبية تعرف بإسم Helicobacter pylori .
- التدخين والكحول .
- أدوية .
- وقد تكون مناعية .

قرحة المعدة Peptic Ulcer

قد تكون حادة متعددة أو مزمنة غالباً وحيدة تكثر في المعدة أو/و الأثنى

عشر Duodenum، تصيب الذكور بنسبة أعلى من الإناث الحادة عادة تشفى تماماً دون مضاعفات تذكر إلا إذا كانت نزفيه فقد تسبب الوفاة وتحدث فجأة نتيجة صدمة نفسية، الحروق الشديدة، الفشل الكلوي . أما القرحة المزمنة فيمكن تعريفها على أنها تآكل وتموت نسيجي حاد لمخاطية المعدة مع وجود التهاب حبيبي غير نوعي ضمن منطقة محددة محاطة بجدران واضحة المعالم . الآلية المرضية تعود الى خلل في العوامل المحافظة على الغشاء المخاطي وحموضته ويعتقد ان للورثة دوراً في ذلك بالإضافة الى اسباب اخرى متنوعه مساعدة للحدوث تم ذكرها سابقاً .

المضاعفات

- الشفاء بالتندب .
- المعاودة «انتكاس» Recurrence .
- الانتقاب Perforation مسبباً البطن الحاد Acute Abdomen .
- النفاذ Penetration الى اعضاء حشوية اخرى مثل البنكرياس، الكبد بحيث تمثل هذه الأعضاء قاعدة القرحة .
- النزف Haemorrhage .
- من القم أو فتحة الشرج (Haematemesis or Melaena) .
- تضيق البواب Pyloric stenosis
- نتيجة التندب التليفى الشائع .
- التحول السرطاني .

أورام المعدة

- حميدة :

ظهارية Epithelial :حليمية Papilloma أو غديه Adenoma أو من
النسيج الضام Connective tissue .

- خبيثة :

١- ظهارية مسطحة (Carcinoma) يكثر عند الذكور في سن متقدمة ومن
العوامل المساعدة على حدوثه :

- التهاب المعدة نتيجة الإصابة بـ Helicobacter pylori

- التغذية الغير صحية والملوثة بالمبيدات الحشرية خاصة D.D.T،
التقرحات الضمورية . وغالباً يأخذ الشكل التقرحي او على هيئة
كتله مبرعمه أو الشكل المرتشح الصلب ويتشبع عن طريق الدم،
بواسطة الليمف، مباشرة الى الأعضاء الحشوية الأخرى او عن طريق
التجاويف Transcoelomic . الانذار عامة سيء حيث ان اكثر من
النصف لا يمكن عمل إجراء جراحي لهم في حالة الاكتشاف .

٢- الليمفوما بنوعيه Hodgkin's and Non-Hodgkin's lymphoma .

٣- أورام النسيج الضام Sarcomas

أمراض الأمعاء الدقيقة والغليظة

- خلقية Congenital -

- مكتسبة Acquired -

الحلقية :

ونخص بالذكر :

- مرض هيرشسبرونغ Hirschsprung's Disease

نتيجة انعدام ضفائر عصبية معينة في جزء محدد تعرف باسم (Auerbach's and Meissner's plexuses) الاسباب مجهولة ويعتقد انها قد تكون جينية مما يؤدي الى انعدام الحركة التمعجية المعوية ومن ثم تضيق هذا الجزء من الأمعاء وتوسع وانتفاخ الجزء العلوي منه مما يسبب انتفاخ البطن والإمساك وتكون الريح الغازية والألم . العلاج جراحي باستئصال الجزء المصاب .

التهاب الأمعاء Colitis

قد يكون :

- نوعي Specific : انظر وحدة العدوى .

- غير نوعي Non-specific

حالة شائعة في كل الأعمار تتراوح التغيرات المرضية من بسيطة - شديدة عادة خطيرة جداً عند الأطفال قد تسبب الوفاة إذا لم يتم اعطاء العلاج المناسب وبالسرعة الممكنة .

الأعراض السريرية :

- الإسهال والقيء Diarrhoea and vomiting -> نقص كمية السوائل Loss of fluid مما يسبب الصدمة Schock .
- نقص المواد الكهولة Electrolyte loss -> عدم انتظام دقات القلب
- Cardiac Irregularities -> تقلصات تشنجية في الحالات الشديدة Tetany .

- فقدان وظيفي وضمور مؤقت Loss of function and temporary
atrophy في مرحلة الشفاء - سوء امتصاص خفيف مؤقت Mild
.tempoary malapsorption

الأسباب : متعددة ومتنوعة :-

- التغذية الغير صحية والملوثة .
- المواد السمية مثل الآرسن والرصاص .
- جرثوميه مثل E.coli أو فيروسية تأخذ عادة الشكل البائي خاصة عند الأطفال .

١- مرض كرون Crohn's Disease

حالة مرضية مزمنة تصيب اليافعين تشمل اي جزء في الجهاز الهضمي من الفم حتى فتحة الشرج ولكن عادة المعى اللغائفي (Ileum) هو أكثر الأجزاء إصابة وتمتاز بتغيرات مرضية نسيجية على هيئة تقرحات متفرقة طولية وضيقة تشمل كافة طبقات الجدار المصاب -ul (Patchy linear and narrowing cers) مع تشكل التهاب حبيبي غير نوعي يسبب التشقق والنواسير (Fissuring) النافذة (Penetration) الى الأعضاء المجاورة مؤدية الى تكوين الإلتصاقات التليفية .

الأسباب :

ما زالت مجهولة قد تكون التهابية معدية، مناعية ولكن غير مؤكدة.

المضاعفات

- ١- انسداد الأمعاء Intestinal obstruction .
- ٢- النواسير Fistulae .
- ٣- فقر الدم نتيجة النزف وسوء الامتصاص .
- ٤- أمراض مناعية الأصل (مثل التهاب المفاصل، التهاب العنينة Uveitis أو جلدية Dermatitis .

٢- التهاب القولون التقرحي Ulcerative Colitis

حالة التهابية تقرحية حبيبية تشمل فقط مخاطية وتحت مخاطية الجدار في الغالب مزمنة تتصف بتكرار الاشتداد الحاد (Exacerbation) تأخذ اشكالاً خراجية في الخيايا «الجريبات» المعوية (Abscesses Form in Crypts) وتسبب مؤخراً تقرحات (Ulcers) تتصل مع بعضها البعض ولكنها لا تؤدي الى تكون التشققات والنواسير .

يصيب المستقيم والسجمي (Rectum and Sigmoid) .

المضاعفات :

- إسهال مخاطي مدمى Diarrhoea with blood and mucus in the stool .
- فقر الدم نتيجة نقص البروتينات والنزف .
- اعراض فرط التحسس (Hypersensitivity) مثل التهاب المفاصل، العين والحمامي العقيدة Erythema nodosum والتحسس الدوائي .
- التحول السرطاني غير نادر الحدوث ما زالت مجهولة ايضاً ولكن هناك توجه بأنها مناعية ذاتية (Autoimmune origin) .

سوء الامتصاص :

نميز :

- البدئي Primary .
- الثانوي Secondary .

البدئي :

يعرف على أنه مجموعة تناذرات بدئية (Primary Syndromes) تتمثل بتفاوت درجة ضمور ونقص عدد الزغابات المعوية (Atrophy and reduction in the number of villi) خاصة الصائم (Jejunum) حيث تصبح المخاطية رقيقة ومسطحة تتمثل سريرياً بنقص امتصاص المواد الغذائية خاصة الدهون، الفيتامينات والبروتينات، المعادن والأملاح .

الأسباب :

- الداء الزلاقي Coeliac Disease, Idiopathic steatorrhea .
- يصيب الأطفال والبالغين .
- يوجد تحسس مناعي الأصل على مادة بروتينية تعرف بإسم غلوتين (Glutean) خاصة في القمح .
- الحمية الغذائية تؤدي الى الوقاية منه .

السبرو الاستوائي Tropical sprue

- يصيب المناطق الاستوائية ما عدا افريقيا .

- الأسباب مجهولة ولكن ربما يكون بسبب تناثر مستعمرات جرثومية في الأمعاء .
- فقر الدم نتيجة نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك شائع عند مثل هؤلاء المرضى .
- الانتقال من المناطق الاستوائية وتعاطي المضادات الحيوية عن طريق الفم قد يساعد كثيراً على الشفاء .

مرض ويل Whipple's Disease

- حالة مرضية نادرة تصيب الذكور في منتصف العمر .
- يتظاهر بتضخم العقد الليمفاوية وألم المفاصل المجهول السبب وتلون الجلد بالإضافة الى سوء الامتصاص .
- يمتاز بتراكم المواد البروتينية - السكرية (Glucoproteins) والدهنية في جدار الأمعاء .
- حالياً يعتبر عدوى بأنواع ما زالت غير معروفة .

الثانوي

نتيجة حالات مرضية متنوعة تؤثر على :

١- الامتصاص

مثل مرض كرون، الداء النشواني، التأثير الشعاعي والدوائي، الاستئصال الجراحي .

٢- الهضم Digestion .

امراض الكبد والبنكرياس، استئصال المعدة .

٣- التفاوت في نقل المواد الغذائية Altered transport of Nutrients
الانسداد الليمفاوي بسبب الأورام والتدرن .

٤- اضطرابات بيو كيميائية Biochemical Abnormalities

وعادة عرض سوء الامتصاص لا يكون ظاهراً نتيجة هيمنة الأعراض
للأمراض الأساسية .

الاعراض السريرية :

الاسهال نتيجة البراز الدهني وفير الكمية العرض الاساسي أما الأعراض
الأخرى فتتوقف على كمية نقص النوع الغذائي ومكان توضع الآفة في الأمعاء
مثل نقص الوزن، الجفاف وفقر الدم، هشاشة العظام والكساح عند الأطفال .

انسداد الأمعاء Intestinal Obstruction

قد يكون حاد ومزمن أو كاذب (احتشاء الأمعاء، مرض هيروشسبرونغ،
شلل الأمعاء) .

- الإنسداد الحاد : عادة يصيب الأمعاء الرقيقة نتيجة قابليتها للتحرك
(Mobility) وبالتالي إمكانية حدوث الإنسداد الميكانيكي (Mechanical
Obstruction) مثل الفتق Hernia، الأنغداد المعوي Intussusception،
الانفتال Volvulus والالتصاقات التليفية Fibrous Adhesions يترافق
عليها تكاثر البكتيريا ومن الأعراض الرئيسية القيء نتيجة ارتداد السائل
الى المعدة وزيادة حركة الأمعاء التمعجية .

الانسداد المزمن

في الغالب غير كامل بسبب تغير في جدارية الأمعاء نتيجة الالتهاب مثل مرض كرون، الأورام الخبيثة الارتشاحية الصلبة، المراحل أو بسبب الضغط الخارجي يصيب الأمعاء الغليظة .

المضاعفات :

- ١- في بداية الانسداد تضخم عضلي Muscle hypertrophy .
 - ٢- في المراحل المتقدمة تمدد وتوسع البطن في الجزء العلوي من الانسداد تجمع السوائل والغازات .
- وهذه المضاعفات تؤدي الى تأثيرات جانبية خطيرة منها .
- الجفاف Dehydration .
 - الاحمضاض Acidosis .
 - تكاثر البكتيريا -> الانتفاخ -> التهاب الصفاق (peritonitis) .
 - تسمم الدم Toxaemia

امراض الزائدة الدودية

تتمثل غالباً على هيئة : ١- التهاب حاد Acute Appenditis

تظهر على هيئة التهاب حاد بسيط Simple Acute

قيحي Suppurative

موات (غنغريني) Gangrenous

يتصف سريراً بألم شديد في البطن، تحسس للألم باللمس، تصلب جدار البطن .
العلاج : جراحي .

المضاعفات :

- انتقاب الزائدة - التهاب الصفاق الموضعي أو المعمم - الموت .
- التصاقات تليفية .
- خراج قيحي حول الزائدة .

الآلية المرضية :

في الغالب يوجد انسداد أو ركود في المحتوى يتراكم عليه تكاثر البكتيريا والتغذية الخالية من الألياف .

٢- الكارسينويد Carcinoid Tumour

الزائدة الدودية أكثر الأماكن توضعاً له . عبارة عن ورم ينشأ على حساب الخلايا الغدية العصبية تظهر على هيئة كتل صغيرة الحجم مائلة للون الأصفر الهلامي الشفاف في الطبقة العضلية غالباً وتكتشف بطريق الصدفة بينما تسبب اعراضاً في أعضاء أخرى حسب المواد التي تفرزها .

أورام الأمعاء

الأمعاء الدقيقة - الحميدة منها غالباً المراحل قد تكون على هيئة تجمعات

متناثرة عائلية وراثية الحدوث بالإضافة الى العضلية والليفية أما الخبيثة منها
ظهاري المنشأ (Carcinoma) نادر الحدوث ويشاهد الليمفوما والكارسنويد.

أورام الأمعاء الغليظة تقسم الى مرجلات (١) غير ورمية وهذه قد تكون
ليمفاوية، التهابية، متبدلة الخلوية (Metaplastic) أو مشوييه
(Hamartomatous) و (٢) مرجلات ورمية حميدة زغاييه Villous، انبوييه
Tubular وزغاييه انبوييه Tubulovillous.

وقد تكون خبيثة : الورم الظهاري المنشأ غدي الشكل بأنواعه العيانية
المتنبته، المتقرحه والمرتشحه ويكثر في كبار السن أما العوامل المؤهبة لحدوثه
منها التغذية الغير صحية والتي خاصة تفتقر الى الألياف، الأمراض الالتهابية
المزمنة.

الوحدة
الثانية عشرة

الوحدة الثانية عشرة

الكبد، المرارة والبنكرياس
Liver, Gallbaldder And Pancreas

• الكبد

- اليرقان .
- الإلتهاب .
- التشمع .
- الأورام .

• المرارة

- الإلتهاب .
- الحصى .
- الأورام .

• البنكرياس

- الإلتهاب .
- الداء السكري .
- الأورام .

الكبد، المرارة والبنكرياس

يُعد الكبد أكبر غدة افرازية في جسم الانسان تزن ما بين ١٢٠٠-١٦٠٠ غم .

يتميز بثلاثة وظائف رئيسية :

الأولى افرازية Secretory Function حيث تحتوي على الكوليسترول Cholesterol، ليسيتين Lecithin والأملاح الصفراوية Bile Salts والأصبغ الصفراوية Bile Pigments **والثانية اقترانية** Conjugating Function تثبيط وافراغ المواد الدوائية، السموم والستيرويد Steroids **والثالثة استقلابية** Metabolic Function ومع تلف الخلية الكبدية فإن ذلك يتقارن مع هذه الوظائف التي تنعكس على كيميائية الدم فيزيد افراز بعض المواد والآخر قد يقل، نعني بالشرح هنا :

اليرقان Jaundice

ويمكن تعريف اليرقان على أنه عرض سريري تتلون فيه انسجة الجسم باللون الأصفر وخاصة صلب العين والجلد نتيجة ارتفاع قيمة البيليروبين في الدم عن المعدل الطبيعي 5-17mol/l .

انواع اليرقان Types of Jaudice

١- انحلالي Haemolytic Jaundice

نتيجة ازدياد انحلال الهيموغلوبين كما في حالات فقر الدم عند الكبار وغير الطبيعي عند حديثي الولادة حيث ترتفع قيمة البيليروبين الغير مرتبط في الدم .

٢- خلوي - كبدي Hepatocellular Jaundice

نتيجة إصابة نسيج الكبد بالالتهابات والأورام مما يؤدي الى عجز في افراز البيليروبين الغير مرتبط (Unconjugated Bilirubin) بالإضافة الى الركودة الصفراوية للأملاح والأصبغ مما يزيد من امتصاصها في الدم، البول يكون لونه عادة داكن كلون الشاي الهندي أما البراز فلوّنه باهت يميل الى الالبيضاض الرمادي .

٣- انسدادى Obstructive Jaundice

يكون الانسداد على مستويين :

أ- خارج الكبد : الانسداد قد يكون جزئي أو كلي على مستوى القناة الصفراوية الرئيسية - زيادة امتصاص البيليروبين المرتبط
Conjugated Bilirubin .

ب- داخل الكبد : خلل وتلف على مستوى نسيج الكبد .

أمراض الكبد

١- التهابية .

حادة .

مزمنة .

٢- التشمع .

٣- الأورام .

١- التهاب الكبد Hepatitis

عادة يكون بطبيعته فيروسياً ولكن هناك الكحولي Alcoholic hepatitis

التهاب الكبد الفيروسي Viral Hepatitis

يُعد أهم أنواع التهابات الكبد ونمیز :

- التهاب الكبد الفيروسي نوع (أ) Hepatitis A

السبب فيروس A من مجموعة RNA، يكثر عند الأطفال، فترة الحضانة تتراوح ما بين ١٤-٤٥ يوم، ينتقل عن طريق البراز والأطعمة والمياه الملوثة، لا يوجد فيه حامل للمرض ولا يتحول إلى التهاب مزمن .

- التهاب الكبد الفيروسي (ب) Hepatitis B

السبب فيروس B من مجموعة DNA، يُعرف أيضا بالتهاب الكبد المصلي، تتراوح فترة الحضانة ما بين ٥٠-١٨٠ يوم، ينتقل عن طريق الدم ومشتقاته أو الاتصال الجنسي سوائل الجسم الأخرى مباشرة يتميز بظهور Antigen-Antibody في الدم وخلايا الكبد .

المضاعفات :

- حامل للمرض دون أعراض .

- التهاب كبد مزمن .

- التهاب كبد صاعق Fulminant Hepatitis - < قصور في الكبد نتيجة فشل وظيفي - < الوفاة .

- تشمع الكبد .

- أحداث سرطان الكبد .

وهناك نوعان إضافيان يعرف أحدهما بالتهاب الكبد C، والآخر D يصيب عادة فئة متضررة من الأفراد مثل مرض الهيموفيليا، المخدرات، في حالة الاتصال الجنسي الغير صحي ... ولا داعي للشرح المفصل عنهما .

الأعراض السريرية Clinical Symptoms

- أعراض عامة قبل مرحلة اليرقان وتتصف بالذهن والضعف، القيء، فقدان الشهية، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات وقد يكون هناك حكة جلدية، تضخم الكبد ملحوظ .

وهناك أعراض تتوافق مع ظهور اليرقان نتيجة التغيرات المرضية في نسيج الكبد خلال ١-٢ اسبوع، البول يصبح داكناً، البراز باهت اللون، نقص في عدد كريات الدم البيضاء، وزيادة في عدد الخلايا الليمفاوية، قد تتضخم الطحال .

التهاب الكبد المزمن

مرض كبدي أولى بطبيعته غالباً بحيث يوجد التهاب مستمر لمدة تزيد عن ٦ أشهر قد يكون نتيجة التهاب فيروسي، كحولي أو تسمم دوائي وقد يكون مجهول السبب . يقسم الى :

- ١- مزمن فعّال Chronic Active Hepatitis عادة ينتهي بتشمع الكبد .
- ٢- مستمر Chronic Persistant Hepatitis غالباً لا يسبب تشمع الكبد .
- ٣- فصبي مزمن Chronic Lobular Hepatitis عادة يُمثل فشل الشفاء التام للإلتهاب الفيروسي ولا يؤدي الى تشمع الكبد .

تشمع الكبد Cirrhosis

يمكن التعريف على أنه حالة يفشل فيه الكبد العودة الى وضعه الطبيعي ويغض النظر عن السبب فلا بد من توفر (٤) شروط آلية لحدوثه :

- ١- تنخر خلوي كبدي Hepatocellular Necrosis من نوع Piece meal

- ٢- التهاب وتليف على هيئة أربطة تمتد ما بين مركزي فصين، تصل بواب مع بواب (portal) أو بواب مع مركز فصي . . .
- ٣- عقيدات تجديديه من بقايا الخلايا الكبدية Nodular Hyperplasia of Surviving liver tissue وهذه العقيدات قد تكون حجماً أكبر من 0.3cm ظاهرة للعين المجردة يعرف بها التشمع Macronodular cirrhosis أو غير مرئية حيث يكون حجمها أصغر من 0.3cm وتُعرف حينذاك بـ Micronodular Cirrhosis .
- ٤- اضطراب دموي Vascular Derangement يؤدي الى تفاوت في جريان الدم نتيجة ارتفاع الضغط في الوريد البابي Portal Vein .

الأسباب :

- التهاب فيروسي .
- بعض انواع التهاب الكبد المزمن .
- التهاب الكبد الكحولي .
- امراض الجهاز الصفراوي Biliary Diseases .
- مرض ويلسون Wilson's Disease .

الأعراض العامة :

- استسقاء البطن المائي Ascites .
- اليرقان Jaundice .
- تضخم الكبد والطحال Hepatosplenomegaly .

- قابلية النزف بسبب دوالي المريء .
- اعراض ثانوية نتيجة الالتهابات .
- اضطرابات عقلية Encephalopathy .

المضاعفات :

- ١- انسداد مجرى الوريد البابي -> ارتفاع الضغط البابي .
- ٢- فشل خلوي -> كبدي -> قصور وظيفي .
- ٣- حدوث السرطان .

سرطان الكبد Carcinoma

يظهر في صورتين :

من خلايا الكبد (75%) Hepatocellular يصيب الذكور بنسبة أعلى من الاناث ويشاهد جغرافياً بكثرة في افريقيا وجنوب شرق آسيا قد يظهر على هيئة كتلة وحيدة Solitary Mass، عقد متعددة Multinodular form أو منتشر diffuse form وهناك الصفراوي المنشأ من القنوات الصفراوية (25%) Cholangiocarcinoma .

الأسباب المؤهبة لحدوثه :

- التهابات فيروسية .
- التهابات مزمنة .
- تشمع الكبد .

– الأغذية المتعفنة (Aflatoxin) .

– أمراض الكبد الدودية (Liver Flukes) نتيجة كثرة استخدام اللحوم والأسماك الغير مطبوخة .

المراة Gallbladder

أمراض المرارة

– التهاب Cholecystitis .

– الحصيات Cholelithiasis .

– الأورام Tumors .

– التهاب المرارة :

حاد .

مزمن .

– التهاب الحاد Acute cholecystitis .

الأسباب :

– عادة مجهولة .

– تكاثر البكتيريا خاصة Streptococci, staphylococci .

– انسداد القناة جزئياً أو كلياً نتيجة حصوه في القناة الكيسية .

التغيرات المرضية تتمثل في الاحتقان والوذمة وانتشار كريات الدم البيضاء وهناك :

١- النوع البسيط Mild Cholecystitis

وهذا ينتهي إما :

- بالشفاء .
- الإزمان .
- تشكل الحصى .

٢- النوع الشديد Severe Cholecystitis

- الانتشار الى مصليه الجدار (Serosa) .

- التنخر المواتي Gangrenous

← التهاب الصفاق Peritonitis

- الانتقاب Perforation

وهذا قد يكون معمم Generalized أو يسبب خراج موضعي

. Localised Abscess

التهاب المرارة المزمن Chronic Cholecystitis

ونميز نوعان :

١- الضخامي Hypertrophic

ويمتاز بسماكه المخاطيه والجدار .

٢- ضموري Atrphic

عادة يصيب النساء البدينات بعد سن ٤٠ خاصة وكثرة الحصى .

العلاج : جراحي .

حصى المرارة :

آلية تكون الحصى لا زالت غير مفهومة تماماً ولكنها تتكون من الكوليسترول، الأحماض والأصبغ الصفراوية، الأحماض الدهنية والفوسفوليبيدات .

وتقسم الى :

١- حصيات الكوليسترول - صفراء باهته لا تظهر بالأشعة، مفردة أو متعددة.

٢- مختلطة تحتوي على الكوليسترول وكربونات الكالسيوم والفوسفات والبيليروبين - تظهر بالأشعة، متعددة .

٣- صباغية - صغيرة سوداء .

المضاعفات

- التهاب المرارة .
- التقيح .
- النواسير .
- الركوده الصفراوية الانسدادية - اليرقان .
- التهاب البنكرياس .
- انسداد الأمعاء .
- امكانية حدوث السرطان .

أورام المرارة

عادة خبيثة نادرة الحدوث ظهارية المنشأ غدية الشكل -Adenocarcino-
ma ينتشر الى الكبد غالباً .

البنكرياس Pancreas

يتكون من قسمين رئيسيين :

١- خارجي الإفراز Exocrine

تتألف من مجموعة فصيصيه غديه (Acini) تصب إفرازاتها الانزيمية في
القناة البنكرياسية وهذه في الأثنى عشر وتتميز (٣) أنواع منها تعمل على هضم:
أ- البروتينات - تريسين و كيموتريسين -Trepisin and Chemotris-
sin .

ب- الدهون - ليباز Lipase .

ج- الكربوهيدرات - أميلاز (Amilase (Diastase .

٢- داخلي الإفراز Endocrine

ويتألف من جزر لانجرهانس Islets of Langerhans وهذه تتكون من
ثلاثة أنواع من الخلايا الإفرازية A,B,C تغلب عليها البائية ونخص بالحديث
عن هذه الخلايا إفرازها الانسولين Insulin .

أمراض البنكرياس

- الانتهاب .

- الأورام .

- الداء السكري .

التهاب البنكرياس Pancreatitis

ويكون :

حاداً

أو مزمناً .

التهاب البنكرياس الحاد Acute Pancreatitis

يعتبر من الحالات الغير نادرة الحدوث ومن أحد أهم الأسباب التي تثير الألم البطني والصدمة، قد يكون خفيف الحدة تزداد شدته مؤدياً للموت .
تتصف التغيرات المرضية الأساسية بالتموت النسيجي الذي غالباً يأخذ الشكل
النزفي نتيجة تحرر الأنزيمات بدرجات مختلفة .

(Tissue Necrosis, Haemorrhagic type, Because of Liberated Enzymes on the Pancreatic Disease)

وتنتشر هذه الأنزيمات :

١- موضعياً في البنكرياس في جزر لانجرهانس مسببه التلف وبالتالي ارتفاع
نسبة الجلوكوجين (Hyperglycaemia) وقد تظهر الغيبوبة .

٢- بواسطة الأوعية الليمفاوية الى الانسجة الحشوية الأخرى خاصة الثرب
Via Lymphatics to Abdominal Tissue Especially Omentum

٣- بواسطة الدم
Via blood stream

مما يسبب الصدمة نتيجة الوذمة الرئوية ونقص الأكسجة وقابلية النزف
الهضمي .

الأسباب :

هناك عاملين أساسيين لحدوثه :

- الحصيات المرارية Gall stones يتراكم عليها التأثير الجرثومي .
- الكحول Alcohol .
- يصيب الاناث البدينات بنسبة أعلى منها في الذكور .

المضاعفات :

- ١- الشفاء اذا كان بسيط وخفيف الحدة .
- ٢- الالتهاب المزمن .
- ٣- التقيح Suppuration .
- ٤- الموت في حوالي ٥٠٪ من الحالات نتيجة الصدمة .

التهاب البنكرياس المزمن Chronic Pancreatitis

الأسباب :

- ١- تكرار نوبات التهاب البنكرياس الحاد .
 - ٢- الكحول خاصة في الغرب .
 - ٣- امراض الجهاز الصفراوي خاصة الحصيات .
- ويظهر الالتهاب على شكل :
- متكلس Calcificated مسبباً تكون الحصى .
 - انسدادى Obstructive يؤدي الى تشكل الأميباس Cysts .

ومن أهم الأعراض السريرية :

الاسهال الدهني Steatorrhoea

ونقص الوزن .

أورام البنكرياس :

- الحميدة نادرة جداً .

- الخبيثة

ونميز :

١- لا إفرازية من نوع Adenocarcinoma and Squamous Carcinoma .

٢- إفرازية وهذه تنشأ من خلايا الجزر Islet Cell Tumour

وتفرز (Insulin, Gastrin, Glucagon) وتُعرف :

أ- Insulinoma .

ب- Gastrin-Ellison Syndrome .

ج- Glucagonoma .

الداء السكري Diabetes Mellitus

ويُعرف ببساطة على أنه اضطرابات استقلابية غذائية نتيجة نقص جزئي


أو كلي للإنسولين A Disease of Disordered Metabolism due to
relative or Obsolute Deficiency of Insulin

يعتبر من الأمراض الشائعة والمضاعفات قد تكون خطيرة تؤدي إلى
الموت . يصيب الاناث بنسبة أعلى من الذكور وللوراثية - العائلية دوراً حساساً

في حدوثه عند الأطفال كما تلعب الصدمة النفسية وأمراض البنكرياس أهمية ملحوظة في ظهوره في سن متأخرة .

* التغيرات البيوكيميائية والتأثيرات السريرية :

١- عدم القدرة على تنظيم والسيطرة على استقلاب الكربوهيدرات مسبباً ارتفاع نسبة الجلوكوجين في الدم Hyperglycaemia والمحصلة زيادة افراز الجلوكوجين Glycosuria .



٢- زيادة الأيض الهدمي للدهون Increased fat Catabolism وفي النهاية يؤدي إلى احمضاض استقلابي مع استمرار نفاذ المواد المكهربة (Further electrolyte depelation) .

٣- زيادة الأيض الهدمي للأحماض الأمينية يمنع بناء البروتينات اللازمة وبالتعاون مع ٢+١ يؤدي إلى نقص الوزن على الرغم من كثرة تناول الغذاء (Polyphagia) .

أنواع السكري

- أولي Primary

ويقسم الى :

أ- الداء السكري المعتمد على الأنسولين

Type 1 Insulin-dependent Diabetes

أو الداء السكري عند الاحداث لأنه يظهر في سن مبكرة .

(Juvenile or Early Onset Diabetes)

وتلعب الوراثة دوراً هاماً في ظهوره مضافاً اليها الأجسام المضادة الذاتية (Auto-Antibodies) لخلايا جزر لانجرهانس .

ب- الداء السكري الغير معتمد على الأنسولين

Type 2 Non- Insulin Dependent Diabetes

هذا النوع الأكثر شيوعاً تزداد الاصابة به مع تقدم العمر وفي الاناث بنسبة اعلى منها في الذكور وتلعب عدة عوامل خارجية في حدوثه حيث تسارع التغذية الغير صحية (البداة Obesity) بالإضافة الى عوامل مؤهبة حبينيه الى مقاومة الانسولين في الأنسجة خاصة الكبد والعضلات (Increased Insulin Resistance in Tissue, Particularly in liver and Muscles)

↓
Increased β Cell Activity - Blood Glucose Raised

↓ ↑
Gradual β Cell Inadequacy (Diabetic State)

العلاج : الحمية الغذائية والأدوية التي تنظم قيمة السكر في الدم أما الأعراض السريرية في الغالب فنتيجة المضاعفات .

- ثانوي Secondary

نتيجة امراض اخرى او اضطرابات الغدد الصماء الأخرى (البنكرياس)
الامراض الاستقلابية او العلاج ببعض الأدوية (Steroids) .

المضاعفات :

١- آفات وعائية - قلبية Cardio-vascular lesions


» العصبدة الشريانية والأثيروما، الخثرات التاجية Coronary
thromboses، هبوط القلب، غرغرينا الأطراف السفلية، والكلية
(Kimmelstiel-wilson lesions) .

٢- الفشل الكلوي Renal Failure .

٣- العدوى Infections .

٤- شبكية العين Retinopathy (التزف، الساد Cataracta والعمى
(Blindness) .

٥- الأعصاب Neuropathy :



Peripheral

Autonomic

٦- الجلد - حكة وتأخر التئام الجروح .

٧- السبات السكري Diabetic Coma .

الوحدة الثالثة عشرة

الوحدة الثالثة عشر

الجهاز البولي التناسلي
Genito-Urinary Tract

- التهاب المسالك البولية .
- التهاب حوض الكلية .
- التهاب الكبد الكلوي التكاثري .
- الغشائي .
- التناذر النفروزي .
- ارتفاع الضغط والكلبي
- حميد .
- خبيث .
- القصور الكلوي .
- أورام الكلى .
- المثانة
- الأورام .
- البروستات
- الالتهاب
- التضخم البسيط .
- - الأورام .
- الخصيه
- التجمع المائي
- الفتق .
- الأورام .

الجهاز البولي التناسلي Genitourinary System

التهاب المسالك البولية Urethritis

يُعد أكثر أنواع العدوى حدوثاً، يصيب الأطفال وكبار السن وخاصة الإناث والحوامل وذلك لقصر الإحليل والتعرض للرضوح أثناء فترة الجماع وضعف الخواص الدفاعية وعند الذكور يكون عادة نتيجة الإنسداد الثانوي (تضخم البروستات أو تضيق الإحليل) والمسبب ينتمي إلى مجموعة العصيات الجرثومية السالبة الغرام خاصة E-Coli بالإضافة إلى المكورات العنقودية علاوة على العوامل المساعدة لحدوثه مثل انسداد المسالك البولية، التشوهات الخلقية عند الأطفال وارتداد البول .

التهاب حوض الكلية Pyelonephritis

قد يكون

حاداً Acute Pyelonephritis

التهاب حاد قحي يتميز بأعراض عامة مثل ارتفاع درجة الحرارة، غثيان وإقياء، صداع، زيادة عدد مرات التبول مصحوب بألم أثناء التبول وأحياناً مخلوط بالدم، ألم في الخصرة، وتعتبر مجموعة الغرام سالبة (E.Col) من أكثر مسببات الجرثومية بالإضافة إلى المكورات العقدية . الإناث أكثر إصابة نتيجة توسع وقصر الإحليل والوسط الرطب أما الإنسداد فهو غالباً السبب الرئيسي لتطوره .

المضاعفات :

- ١- الشفاء .
 - ٢- تكرار العدوى Recurrence .
 - ٣- الإزمان Chronic Pyelonephritis .
 - ٤- خراج كلوي Perinephric Abscess .
 - ٥- تنخر حليمي Papillary Necrosis .
- العلاج يكون بإعطاء المضادات الحيوية النوعية وفقاً لنوع المسبب الجرثومي .
- مزمناً Chronic Pyelonephritis
- نتيجة نوبات الإلتهاب المتكررة بسبب انسداد المسالك البولية أو/و تكون الندب والتليف إثر الشفاء مما يؤدي الى تلف النفرونات والأنابيب (Nephrones and tnbulas) .
- ونميز نوعان : الأول انسدادى (Obstructive) .
- والثاني غير انسدادى Non-Obstructive .
- محدثاً ارتفاع في ضغط الكلية -> قصور كلوي Renal Hypertension<Uraemia (تبولن الدم) .
- التهاب الكبد - الكلوي التكاثري الحاد Acute proliferative glomerulonephritis
- أ- معم (Diffuse) : ٢-٣ أسابيع بعد العدوى خاصة التهاب الحنجرة بسبب المكورات العقدية نوع أ Group A Haemolytic streptococci
- يكثر عند الأطفال واليافعين .

الكبد هي الوحدة الأساسية للالتهاب، تتميز الإصابة بوذمة الوجه الصباحية (Facial Oedema)، نقص التبول (Oliguria) ارتفاع ضغط الدم، ويلزم الشفاء الأطفال في ٩٥٪ من الحالات يمكن أن تتوالى المضاعفات :

١- الإزمان والموت بعد سنوات عديدة .

٢- هبوط القلب أو اليوريميا (Uraemia) - الموت في المرحلة الحادة.

ب- بؤري (Local glomerulonephritis) عادة يشمل جميع الكبد في منطقة معينة أو جزء منها .

والسبب لهذه النوعية من الالتهاب يعزى الى التفاوت في حجم المركبات المناعية (Variation in the size of the immune complexes) أما الأعراض فتظهر على هيئة بيلة دموية (Haematuria) وبروتينية (Proteinuria) .

الأسباب :

- ١- بدئية (Primary) مناعية .
- ٢- ثانوية (Secondary) نتيجة امراض عديدة منها التهاب شغاف القلب، روماتيزم المفاصل، دموية (Henoch-schönlein purpura).

• التهاب الكبد - الكلوي الغشائي Membranous glomerulonephritis

الوحدة الأساسية تظهر على هيئة تغيرات معممة في الأغشية القاعدية (Basement membranes) للشعيرات الدموية للكبد، تكثر الإصابة في الذكور البالغين وتتميز بالوذمة والبيلة البروتينية وتجمع السوائل في التجاويف المصلية. الاسباب مجهولة ولكن يمكن ان تكون مصاحبة للإلتهابات، استخدام

الأدوية والسرطانات ومناعياً، قد تتراجع الإصابة ولكن في حوالي ٥٠٪ من الحالات تنتهي بالقصور الكلوي (Renal failure) - Uraemia .

التأثر النفروزي Nephrotic Syndrome

عبارة عن مجموعة تغيرات قد تشمل التهاب الكبد الكلوي الغشائي سبق شرحه عند الذكور البالغين أو على هيئة تغيرات ضئيلة كبيبة - قنوية في التهاب الكبد الكلوي والاسباب مجهولة قد تحدث بسبب عدوى الجهاز التنفسي عند الأطفال ويبدو أنها تتفاعل مع العلاج بأدوية Steroid مما يوضح جزئياً دور المناعة في ذلك أو التغير الهيليئي الكبيبي مؤدياً الى التليف الكلوي للكبد المصابة . ومن الملحوظ في جميع هذه الحالات زيادة الدهون، البروتين على هيئة فقاعات في الخلايا الظهارية للقنوات، والأعراض العامة تتميز بالوذمة، البيلة البروتينية وزيادة دهون الدم (Hyperlipidaemia) .

ارتفاع الضغط الكلي

نميز نوعان :

الحميد والحبيث .

- ١- الحميد : عادة يكون مزمناً، قد يستمر ٢٠-٣٠ سنة والتغيرات الكلوية تكون نتيجة الانسداد الرقعي (Patchy occlusion) المتزايد للشرايين والشريينات الواردة (Afferent arterioles) ومع تقدم التغيرات الوعائية نلاحظ تقلص الكلى وضمور الكبد وغالباً تحدث الوفاة نتيجة :
 - ١- إصابة دماغية - وعائية Cerebro-vascular accident .
 - ٢- هبوط القلب الإحتقاني Congestive Cardiac failure .
 - ٣- فشل الأوعية التاجية Coronary insufficiency .

٢- الخبيث : حالة حادة تنتهي بالموت (Uraemia) خلال عدة أشهر إذا لم يعالج بسبب ارتفاع الضغط الى اعلى الدرجات وعادة تكون التغيرات المرضية سريعة التقدم على مستوى الكبد والأوعية الدموية الواردة . يصيب الذكور في العقدين الثالث والرابع وفي أغلب الحالات يكون ثانوياً نتيجة وجود آفة كلوية مرضية وتتميز الأعراض بارتفاع الضغط المتواصل، تناوب البيلة الدموية والبروتينية، ازدياد نقص البول، صداع، نزيف في الشبكية وتغيرات دماغية ومن ثم ظهور اعراض تبولن الدم (Uraemia) .

القصور الكلوي Renal Failure

عبارة عن مجموعة من الأعراض السريرية والبيوكيميائية بسبب انحباس الفضلات (Retention of waste products) والفشل في تنظيم السوائل وموازنة الكهرلة (Control fluid and Electrolyte balance) مما يسبب زيادة في عدد مرات التبول والجفاف مسبباً تدهور شديد في الوظيفة النسيجية للكلية تنتج عنه آليه المعاوضة بحيث تكون الحياة مهددة بالخطر في المرحلة النهائية (End-stage) عند التهاب الكلى المزمن (Chronic pyelonephritis) والتهاب الكبد الكلوي المزمن (Chronic glomerulonephritis) من أكثر الأسباب المؤدية للتزايد المستمر في تدهور الوظيفة الكلوية وما يترتب عليه من تبولن الدم ومضاعفاته (Uraemia and its complications) :

١- ارتفاع الضغط (Hypertension) .

٢- التثح الفيريني (Fibrinous exudate)

- التهاب غشاء التامور الفيبريني .

- التهاب الرئة اليوريمي Uraemic Pneumonitis .

- ١- Uraemic Colitis التهاب الأمعاء اليوريمي
- ٢- التقرحات النزفية (Haemorrhagic ulcers)
- ٣- فقر الدم Anaemia
- ٤- Depression of immunological reaction تثبيط المناعة

المصير Prognosis

التحسن الملحوظ مع المعالجة بطريقة :

١- الديليزة Dialysis

Haemodialysis

Peritoneal dialysis

٢- زراعة الكلى Renal transplantation

أورام الكلى

حميدة وخبيثة :

١- الحميدة Benign

- الورم الليفي Fibroma : يكون من النسيج الخلالي (Interstitial tissue) ويكتشف بالصدفة اثناء التشريح .
- الغدي Adenoma : تكون من تجمع قنوى حجمه عادة لا يزيد عن ٣ سم.

٢- الخبيثة Malignant

ونخص بالذكر :

- الورم الظهاري الأصل «عند الكبار»

Renal cell carcinoma Hypernephroma

يكون على هيئة كتلة صلبة متراصة او قنوية تكثر فيه التغيرات التنكسية الثانوية مثل النزف والتنخر، تحيط به كبسولة واضحة الحدود ومن أعراضه الضغط على النسيج المجاور، الانتشار الموضعي في الحوض (Pelvis) ومن خلال كبسولة الكلى والانتشار الوريدي الأكثر حدوثاً الى الرئة والعظام .

- ورم ويلمز «عند الصغار» Wilm's tumour Nephroblastoma

يُعد من أكثر الأورام الخبيثة حدوثاً عند الأطفال . جنيني النوع (Embryonic type) ينتج من الانسجة الكلوية البدئية - (kidney Rudiments) واضح الحدود والنمو، سريع الانتقال بواسطة الدم خاصة الى الرئة .
العلاج : جراحي وفعال في المراحل المبكرة الى ٩٠٪ من الحالات .

المثانة Urinary Bladder

الأورام : Toumours

عادة تكون ظهارية الأصل (Epithelial in origin) حليمية الشكل (Papillary) تقسم إلى ٤ درجات (4 degrees) الدرجة الأولى يعتبر فيها الورم حميداً نسيجياً وسلوكياً ثم يبدأ بالتوجه نحو الانقسام والسلوك البيولوجي الخبيث (Papillary carcinoma) مع زيادة الدرجة، يمتاز بالقرح، الالتهاب، اعراض انسداد الإحليل والبيله الدموية، ينتشر موضعياً باختراق عضلة جدار المثانة والانتقال بواسطة الليمف (Lymphatic invasion) .

ومن أكثر العوامل المؤهبة لحدوثه :

- ١- التهابات المثانة المتنوعة وعلى وجه الخصوص البلهارسيا .
- ٢- التعرض المديد للأصباغ والمواد الكيماوية الصناعية نتيجة التعامل الوظيفي .
- ٣- التدخين وسوء استخدام المسكنات .
- العلاج : جراحي وتكون الوفاة بسبب القصور الكلوي .

الموثة « البروستات » Prostate

تحيط بعنق المثانة وتقسم الى فصين رئيسيين جانبيين وآخر صغير في الوسط، وتعرض للكثير من التغيرات المرضية منها الالتهابية الأصل او غير الالتهابية تزداد مع تقدم العمر بعد الأربعين سنة ونميز :

التهاب الغير نوعي Non-specific prostatitis

قد يكون حاداً أو مزمناً والمسبب عادة من مجموعة المكورات العقدية أو

العنقودية أو البنية (Gonococci) مؤدياً الى تكون الخراج، التليف، الإزمان وتشكيل الحصى البروستاتيه أحياناً .

التهاب النوعي Specific Prostatitis

من أكثر العوامل المؤهيه لحدوثه التدرن مسبباً التهاب حبيبي (Granulomatous inflammation) .

– تضخم البروستات البسيط/ (Benign Prostatic Enlargement. Hypertrophy- Nodular Hyperplasia)

يكثر حدوثه بعد سن الخمسين يفترض نتيجة الاضطراب الهرموني مؤدياً الي تكاثر غدي ونسيجي خلالي إلا ان آلية الحدوث ما زالت مجهولة، مسبباً الأعراض التالي :

– التبول المتكرر والمتقطع المصحوب بالألم نتيجة انسداد واعوجاج الإحليل وانحباس البول .

– التهاب المثانة (حاد أو مزمن) .

– تشكل الحصى .

– امراض الكلى (التهاب، استسقاء Hydronephrosis، خراج قهحي Pyonephrosis وفي النهاية قصور كلوي .

• أورام البروستات

عادة ظاهرية المنشأ (Epithehial in origin) غدي الشكل غالباً (Adenocarcinoma) شائع الظهور عند الذكور كبار السن ويبدو الإضطراب الهرموني على مستوى Oestrogen-Androgen مع زيادة في

نسبة Androgen من الأسباب الرئيسية لحدوثه علماً بأن وجود الإنتهاب المتكرر والتضخم الغدي المصاحب للورم من العوامل السببية قليلة الأهمية . ينتشر مباشرة وبواسطة الدم والليمف الى الاعضاء المجاورة، العقد الليمفاوية، العظام، الكبد والرئة والتشخيص يتم بواسطة الفحوصات المخبرية (Acid phosphotase) المسحات البروستاتية (Prostatic smears) والعينات النسيجية .

العلاج :

يعتمد على المرحلة التي يكتشف بها الورم وبالتالي مصير المريض .

الخصية Testis

التجمع المائي Hydrocele

ويعرف على أنه تجمع للسائل المصلي (Serous Fluid) في الغلالة الغمدية للخصية (Tunica Vaginalis) شائع الحدوث والاسباب قد تكون أولية خلقية تكثر عند الأطفال نتيجة عدم الانسداد الكلي للثاني الغمدي (Processus vaginalis) وقد تكون ثانوية نتيجة الالتهابات والأورام والرضوح ومن مضاعفاته الالتهاب والضمور في الحالات الغير معالجة - والعلاج جراحي .

الفتق Hernia

عبارة عن بروز حشائي جزئي أو كلي من خلال فتحة غير طبيعية في جدار البطن .

العلاج : جراحي .

أورام الخصية Testicular tumours

متنوعة وتصنف وفقاً لنوع العنصر الأساسي النسيجي التركيبي وتعتبر الظهارية الأصل (Carcinoma) هي الأكثر شيوعاً وغالباً منوية المنشأ (Seminoma) وهناك المسخى (Teratoma) يصيب جميع الفئات العمرية ولكن يكثر حدوثه بين ٢٠-٤٠ سنة وينتشر مباشرة وبواسطة الدم والليمف إلى الأعضاء المجاورة والعقد الليمفاوية الاحشائية، الكبد والرئة .
والعلاج : جراحي وبواسطة الأشعة والأدوية الكيماوية .

الوحدة الرابعة عشرة

الوحدة الرابعة عشر
الجهاز التناسلي الأنثوي
Female genital tract

يعد هذا الجهاز وحدة وظيفية متكاملة تستمر فترة النشاط التناسلي خلالها ما يناهز الأربعين عاماً منذ سن البلوغ (المراهقة Puberty) الى سن اليأس (Menopause) ويتكون من :

الرحم Uterus

المهبل Vagina

الفرج Vulva

المبيض وقناة فالوب على جانبي جسم الرحم (Ovary and Fallopian tube) ويخضع هذا الجهاز من حيث العمل الوظيفي لتوعين من النظام الهرموني :

الأول : افراز Steroids من المبايض (Ovaries) وبالتالي يهيئ الرحم للحمل أو ظهور الدورة الشهرية (الطمث) .

والثاني : تنظيم افرازات المبيض بواسطة الغدة النخامية الأمامية - (Anterior pituitary gland) والغدة تحت السريية (Hypothalamus).

الرحم (Uterus)

ونميز :

١- الجزء الخارجي (الجدار Myometrium) ويتكون من الخلايا العضلية الملساء (Smooth muscle cells) .

٢- الجزء الداخلي (بطانة الرحم Endometrium) يخضع لتأثيرات هرمونية تسبب الدورة الشهرية في حالة عدم حدوث الحمل .

وتقسم الدورة الشهرية الى ثلاثة مراحل اساسية :

أ- المرحلة التكاثرية Proliferative phase

يزداد معدل الاستروجين (Oestrogen) مع تقدم نضج جريبات المبيض (Ovarian follicles) وتراوح من ١٢-١٤ يوم .

ب- المرحلة الإفرازية (Secretory phase)

يزداد تأثير هرمون البروجيستيرون (Progesterone)، ببطانة الرحم متوذمه وعالية الدموية (Avascularity) وتتفاوت ما بين ١٢/١٤ - ١٦ يوم من مدة الدورة .

ج- المرحلة الثالث :

ما قبل النزف (Premenstrual regressive phase) حيث تبلغ ذروة تأثير بطانة الرحم ٥-٦ أيام قبل ظهور النزف (Menstruation) .

أمراض الرحم

- التهاب Endometritis

١- حاد : عادة يلزم الولادة أو الاجهاض الغير قانوني مما قد يؤدي ايضاً الى

التهاب الجدار (Myometritis) وملحقات الرحم (Salpingitis) .

٢- مزمن «غير نوعي» : نتيجة استمرارية الالتهاب الحاد .

تدخلات طبية لعلاج العقم .

«نوعي» : التدرن .

العضال الغدي (Adenomyosis)

وجود بؤرة أو أكثر من غدد بطانة الرحم متناثرة ضمن الطبقة العضلية الجدارية تسبب النزف الغير منتظم خارج أوقات الطمث وزيادة فترة الطمث .

داء الرحم البطاني Endometriosis

وجود عدد من بطانة الرحم أو لحمتها (جزء من بطانة الرحم) على هيئة بؤره / أو أكثر متفرقة خارج الرحم عادة في الملحققات الرحمية (Adnexae) تسبب النزف الغير المنتظم خارج أوقات الطمث مع زيادة في مدة الطمث .

فرط نشاط بطانة الرحم Endometrial Hyperplasia

الأسباب عامة مجهولة ونميز البسيط المتكيس (Simple Cystic Hy-perplasia) يظهر أثناء مرحلة النضج الرحمي (Reproductive life) أو سن اليأس (Postmenopausal period) .

والغدي الغير طبيعي (Atypical Adenomatous Hyperplasia) وتكمن اهمية هذا النوع في أنه يعتبر مرحلة قبل سرطانية .

• أورام الرحم

وله انواع تشمل :

جدار الرحم :

قد تكون حميدة او خبيثة .

الورم العضلي الأملس (Leiomyoma).

ورم حميد يتكون من الخلايا العضلية الملساء، قد يكون وحيداً أو متعدداً، عادة تظهر عليه تغيرات ثانوية متعددة مثل التنكس، النزف، التكلس . يسبب نزف غير طبيعي، اعراض ثانوية نتيجة الضغط يكثر عند الإناث فترة النشاط التناسلي .

وهناك الورم العضلي الأملس الحبيث (Leiomyosarcoma)

بطانة الرحم :

- المرجل (Polyp) : ورم حميد ناتج عن تكاثر موضعي لبطانة الرحم تظهر عليه عادة التغيرات التنكسية مثل التمثوت والنزف قد يكون متدياً بعنق أو بدونه .

- الورم ظهاري المنشأ (Carcinoma) عادة غدي الشكل (Adenocarcinoma)

وهو أكثر انواع الأورام الحبيثة ظهوراً، أما الإنذار يعتمد على درجة الحبيث ومدى انتشاره . العلاج جراحياً بالإضافة الى الأشعة والأدوية الكيماوية غالباً .

وهناك السرطان المشيمي (Choriocarcinoma)

نادر الحدوث يتكون من الخلايا المشيمية الغير طبيعية، من اعراضه النزيف الرحمي وارتفاع HCG . يتفاعل بدرجة عالية مع العلاج الكيماوي .

أمراض عنق الرحم Cervix

- التهاب Cervicitis

وقد يكون حاد أو مزمن عادة يكثر في الحمل، أثناء الدورة الشهرية أو أثناء الجماع . المسبب جرثومي .

- الأورام :

١- حميدة : المرجل (Polyp) أكثر الأنواع شيوعاً قد يكون مصدره الجزء الخارجي لعنق الرحم (Exo-cervix) وفي هذه الحالة يكون مغطى المرجل من الخارج بنفس نوعية النسيج الظهاري شائك الخلايا لعنق الرحم أو يكون المصدر من الجزء الداخلي للعنق (Endo-cervix) حيث يكون السطح الخارجي من النوع الأسطوانى العالى . العلاج يتم بالإستئصال الجراحي دون مضاعفات .

٢- خبيثة : ظاهرية المنشأ حشرقية (Squamous cell Carcinoma) أو غدية (Adenocarcinoma) وينتشر مباشرة الى الأعضاء المجاورة، وبواسطة الليمف . العلاج جراحي وبالأشعة والأدوية الكيماوية ويكون فعال إذا تم اكتشاف المرض في المرحلة المبكرة أو الوفاة نتيجة النزف أو القصور الكلوي وتخمج الدم (Sepsis).

أمراض المهبل والفرج (Vagina and Vulva)

أمراض المهبل الالتهابية نخص منها بالذكر الإصابة بداء المشعرات (Trichomonas Vaginalis) والمبيضات (Candida Albicans) ويمتاز كل منهما بإفرازات مهبلية مع حكة واحمرار وتنقل عن طريق الجماع أما الأورام فهي نادرة وعادة حشرقية أو غدية .

بالنسبة لأمراض الفرج فهي في الغالب عبارة عن تغيرات حميدة في مخاطية الفرج تختلف عن الأورام في طبيعتها تكون على هيئة سماكة وثخانة في الغشاء المخاطي ويطلق عليها الطلاوة (Leukoplakia) أو حطاطات زرقاء مائلة الى اللون الأصفر تشبه ورق Parchment وتعرف بالتصلب البسيط (Lichen planus)، كيسية بارثولين (Barthollin's Cyst) تنشأ بسبب

انسداد القنوات الرئيسية لغدد بارثولين في الفرج أو المهبل وقد يؤدي الانسداد الى التهاب وتشكل الخراج احياناً .

الأورام :

١- حميدة : على هيئة آفات ثولوليه (Condyloma Acuminatum) وتنتقل بالإتصال الجنسي والمسبب فيروسي من نوع حليمي يعرف بـ Human Papilloma virus .

٢- خبيثة : غالباً ظاهرية حرشفية المنشأ (Squamous cell carcinoma) ويحدث في سن متأخرة بعد الستين عادة .

المبيض (Ovary)

ومن أهم التغيرات المرضية التي تصيب المبيض :

- أكياس المبيض البسيطة «الغيرورمية» منها الكيسات الجريبية واللوطينية وقد تعطي أعراضاً ثانوية نتيجة النزف أو الانفجار مما يسبب آلام بطنية شديدة.

أو على هيئة تناذر متعدد الكيسات Polycystic Ovarian syndrome يصيب الإناث في سن مبكرة ويكون المبيض كبير الحجم متكيس وليفى بسبب العقم والشعرانية مع دورة طمثية لا إباضيه .

- الأورام :

قد تكون حميدة أو خبيثة تصنف تبعاً لنوع النسيج المكون لها لسنا بصدها في هذا المجال .

أمراض الحمل والمشيمة

- الحمل الهاجر (Ectopic Pregnancy)

عملية التلقيح لا تتم في الرحم بل خارجة عادة في انبوب فالوب ولكن قد تحدث في المبيض أو التجويف البطني ويعتبر من الحالات المرضية الحادة شديدة الألم في البطن خاصة في حالة النزف وانثقاب الأنبوب والعلاج جراحي .

الانسمام الحُملي Toxaemia of Pregnancy-Eclampsia

من علاماته ارتفاع الضغط الدموي، الوذمة، البيلة البروتينية ويظهر في المرحلة الأخيرة من الحمل وفي بعض الحالات الشديدة مع تقلصات وتشنجات (Convulsions) ولا زالت الآلية المرضية مجهولة وغير واضحة ويزداد تطوره مع ولادة الجنين وخروج المشيمة لذا يفترض أن يكون السبب إما مرتبطاً بالجنين نفسه أو المشيمة حيث يلاحظ تشكل خثرات متعددة في أعضاء مختلفة من الجسم مسببة احتشاءات متفرقة بما فيها المشيمة، وخطورة هذه الحالة تكمن إما في وفاة الجنين أو الأم عادة نتيجة القصور الوظيفي في عمل الكبد أو الكلوي .

الحمل العنقودي والرحى العذارية "Hydatidiform Mole"

عبارة عن خلل في تركيب الزغابات المشيمية (Disorder of Chorionic Tissue) يمتاز بتكاثر الغشاء التروفوبلاستي جزئياً أو كلياً ويتوسع كيسي لهذه الزغابات مع نقص في التروية الدموية وتنكس سائلي بحيث تظهر على شكل عنقود من حبات العنب (Bunch of grapes) للعين المجردة وارتفاع معدل هرمون الغونادوتروپين مخبرياً (HCG) .

وللكشف المبكر عن الأمراض السرطانية في الجهاز التناسلي الأنثوي
فإننا نصح السيدات المتزوجات خاصة اللواتي بلغن سن الأربعين فما فوق
إجراء فحص دوري بأخذ مسحة من داخل المهبل وعنق الرحم (Papa
Smaer) كل ٦ أشهر - سنة دورياً .

الوحدة
الخامسة عشرة

الوحدة الخامسة عشر
أمراض الثدي Breast

- اضطرابات النمو .
- التهاب الثدي :
- الحاد .
- المزمن - الخلايا المصورة .
- التنخر الدهني .
- أورام الثدي :
- حميدة .
- خبيثة .
- الأسباب .
- الأعراض .

الثدي Breast

• اضطرابات النمو Disorders of Breast Growth

- غالباً نادرة الحدوث ولكن يمكن ان تحدث بسبب زيادة - نقص افراز الهرمونات وحالات مرضية متنوعة تلاحظ على هيئة :
- أ- ضمور النمو نتيجة نقص في نمو المبيض (Ovarian Agenesis) .
- ب- النمو المبكر للثدي في حالة متلازمة المراهقة المبكرة (Syndrome Precocious Puberty).

- ج- تضخم الثدي عادة وحيد الجانب قبل سن البلوغ وأثناء الحمل .
- د- تضخم الثدي المؤقت عند الذكور (Gnaecomastia) والأسباب قد تكون هرمونية في سن البلوغ أو نتيجة امراض مختلفة مثل السرطانات، الأمراض الاستقلابية (تشمع الكبد) وتعاطى بعض أنواع الأدوية حيث وجد أن التضخم يكون على هيئة زيادة في النسيج الدهني والضمام بالفحص النسيجي .

• التهاب الثدي

١- التهاب الثدي الحاد Acute Mastitis

- عادة يشاهد عند المرضعات ولكن يمكن ان يكون هرمونياً، الحلمة متشققة والثدي متضخم ومحمر ومؤلم والجراثيم المسببه هي المكورات العقدية والعنقودية .
- العلاج الناجح بالمضادات الحيوية يؤدي الى الشفاء التام ولكن في حالة تكون الخراج يمكن ان يتم الشفاء بالتندب أو الإزمان .

٢- التهاب الثدي المزمن (Chronic Mastitis)

غالباً التهاب حبيبي النوع، نتيجة عدم شفاء التهاب الثدي الحاد التام وتميز نوع خاص يعرف بالتهاب الثدي بالخلايا المصورة - (Duct Ectasia) Plasma cell Mastitis) يمتاز بتوسع القنوات اللبنية التكيّسي وانحباس المفرزات فيها مع تجمع للخلايا الالتهابية المزمنة وعلى وجه الخصوص الخلايا المصورة بالإضافة الى تكاثر الخلايا الفيبرينية مما يسبب كتله في الثدي، ويشاهد غالباً عند النساء في سن الضمهي .

التخر الدهني Fat Necrosis

نتيجة الرضوح (Trauma) في المنطقة الدهنية للثدي مؤدياً الى تحرر الدهون في النسيج المحيط به ينتج عنه تجمع للخلايا الالتهابية المزمنة بما فيها الخلايا المتعددة الأنوية (Giant Cells) وتكاثر الخلايا الفيبرينية وقد يكون نتيجة العلاج بالأشعة وغالباً يؤدي الى تشكيل كتلة صلبة .

* أورام الثدي

وتقسم الى حميدة وخبيثة .

الأورام الحميدة :

١- الورم الغدي الليفي Fibroadenoma

أكثر الأورام الحميدة شيوعاً ويصيب الفئة العمرية بعد سن البلوغ وقبل ٣٠ عاماً ويظهر ككتلة صلبة واضحة الحدود . والعلاج جراحي .

٢- الورم الغدي الليفي العرطل (Phyllodes Tumour, Giant Fibroadenoma) .

يشكل كتلة كبيرة الحجم عادة مع تنخر وتموت نسيجي نتيجة النمو

السريع والعلاج جراحي إذا كان السلوك البيولوجي حميداً ولكن في بعض الحالات تأخذ دعامية النسيج الضام (Stroma) الورم السلوك الخبيث (Sarcoma) مما يتطلب العلاج الجراحي بالإضافة الى الأشعة والمواد الكيماوية.

٣- الورم الحلمي Papilloma

كتلة صغيرة أسفل حلمة الثدي، محسوسة وتوجد افرازات مصلية أو دموية وقد يشاهد تكيس في القنوات الحليبية - العلاج جراحي، يحدث في سن الضهى أو قبله بقليل .

الأورام الخبيثة

الأورام الظهارية (Epithelial tumours-Carcinoma) أكثر الأشكال التركيبية الورمية شيوعاً .

غالباً تكون غدية (Adenocarcinoma) متوضعه في منطقة محدودة من القنوات (Ductal Carcinoma) أو تشمل فصاً متكاملاً (Lobular Carcinoma) وهناك أنواع أخرى لا داعي لذكرها مصنفة حسب نوعية النسيج المكونة لها . تزداد الإصابة به مع التقدم بالعمر خاصة بعد سن الثلاثين . العلاج جراحي والأشعة والأدوية الكيماوية ومعدل الحياة يعتمد على مرحلة اكتشاف المرض ومدى انتشاره التشخيص يتم بناء على الفحوصات السريرية المتنوعة، الشعاعية والنسجية .

الأسباب :

- ١- وراثية - عائلية .
- ٢- عوامل هرمونية :
- الدورة الشهرية المبكرة .

- سن الضمى المتأخر .
- غير المتزوجات وغير المرضعات. / يزيد من التعرض لهرمون الإستروجين .
- ٣- عادات يبيعية غير صحية (مثل التدخين، تناول الكحول) .
- ٤- فيروسية .

الأعراض العامة :

- كتلة صلبة تكتشفها المرأة بالصدفة .
 - تضخم العقد الليمفاوية الإبطية .
 - في المراحل المتقدمة :
 - ضمور في حلمة الثدي .
 - تقرح واحمرار الجلد فوق منطقة الورم .
 - تؤذم الذراع .
 - ألم، فقدان الشهية، فقر الدم .
- يحرص العلم الحديث على أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي عند الأنثى (Early Screening) وذلك بتنقيف المرأة كيفية الفحص الذاتي للثدي شهرياً بعد الدورة .

الخطوات العلمية المبسطة لفحص الثديين ذاتياً من قبل السيدات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي :

بالرغم من عدم توفر الاحصاءات العلمية الدقيقة حول انتشار سرطان الثدي في الأردن فإنه بوسعنا القول بعد سنوات طويلة من الممارسة الطبية بأن سرطان الثدي هو من أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً في الأردن، لذلك كان لا بد من إيجاد هذا الدليل لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المصابات بالشفاء.

أن خطوات هذا الفحص بسيطة ولا تحتاج الى جهد أو خبرة خاصة ويجب أن لا يساور الخجل أو الخوف السيدات من التعرف الدقيق على جزء من أجزاء جسدهن.

ان احتمال الإصابة بسرطان الثدي يزداد بين العقيدين الرابع والخامس من

العمر.

ان اكتشاف السيدة لأية مظاهر غير طبيعية في ثديها .. واللجوء الفوري الى الطبيب يعني إعطاء الطبيب فرصة كبيرة لانقاذها من عواقب سيئة.

وهناك حقيقة بأن ذكر السرطان يسبب الذعر لدى الكثيرين، غير أنه بإمكان الطب الحديث أن يعالج بشكل فعال بعض أنواع السرطان إذا ما تم اكتشافها في مراحلها الأولى قبل انتشارها لذلك يجب أن نبعد عن أذهاننا بأن السرطان مرض يقف الطب عاجزاً أمامه .. ولا نستسلم لليأس.

الفحص الذاتي :


ويشمل على قسمين :

الأول : التحري بالنظر (المعاينة).

الثاني : التحسس باللمس بواسطة الكف .

خطوات القسم الأول :

ويتم الوقوف منتصبية أمام المرآة (والثديين معريين).



(الشكل ١)

١- انظري الى الثديين وقارني شكليهما وحجميهما، ابحثي عن أية اختلافات بينهما وعن وجود تورم أو تورمات مهما كان حجمها أو أية اختلافات في طبيعة الجلد أو وجود انخفاضات أو أي تغيير في الحلمة أو وجود افرازات غير طبيعية منها.

وتفحصي رافعة الثديين فقد توجد عليها افرازات غير طبيعية في موضع الحلمة.



(الشكل ٢)

٢- قفي ويديك الى خصرك كما هو مبين في (الشكل ٢) اديري جدعك الى اليمين والى اليسار بحيث يصبح بإمكانك رؤية جوانب الثديين، دقق النظر واعيدي البحث كما في رقم (١).



(الشكل ٣)

٣- قفي ويداك متشابكتين خلف رأسك. كما في (الشكل ٣) انظري الى أسفل الثديين مكرره الفحص كما في (١) و (٢). بإمكانك رفع كل ثدي على حده لرؤية أسفل الثدي إذا تعذر عليك الفحص ويديك الى خلف رأسك.



(الشكل ٤)

٤- قفي ويدك مرفوعتان الى أعلى كما
في (الشكل ٤) ودققي النظر
والمقارنة بين الثديين وأعيدي البحث
كما في الخطوة (١).

خطوات القسم الثاني :


تم هذه الخطوات في وضع الاستلقاء على الظهر مما يتيح لانسجة الثدي
المختلفة بالانتشار على مساحة واسعة من الصدر وبالتالي تعيض كل نسيج
الثدي لليد الفاحصة، وقد تجد بعض السيدات وخاصة إذا كان الثدي من
الحجم الكبير أن وضع وسادة تحت الكتف الذي يحمل الثدي المراد فحصه
يسهل عملية الفحص، ولا يوجد ما يمنع ذلك.

تتم عملية الجس (التحسس) باستعمال راحة اصابع اليد اليمنى لفحص
الثدي الأيسر وراحة اصابع اليد اليسرى عند فحص الثدي الأيمن ويجب أن
يكون ضغط اليد الفاحصة معتدلاً. اضغطي نسيج الثدي باتجاه القفص
الصدري ويمكن استعمال الكريم، البودرة أو الزيت، فمن شأن هذه المواد أن
تقوي احساسك بلمس الثدي. ان تكرر هذه العملية يؤدي الى معرفتك
بلمس الثدي الطبيعي ويمكنك من اكتشاف أية أورام فيه.

يتم فحص كل ثدي على حده :

١- يتم فحص الجزء (النصف) الداخلي من الثدي كما في الشكل (١١) حيث
تكون اليد المجاورة للثدي المراد فحصه موضوعة تحت الرأس وراحة اصابع
اليد اليسرى يتم جس (تحسس) الاجزاء الداخلية من الاعلى الى الاسفل

على شكل نصف دائرة مكرره وذلك باتجاه حلمة الثدي كما في (الشكل ٥ ب).




(الشكل ٥ ب)



(الشكل ٥ أ)

٢- يتم فحص الجزء (النصف) الخارجي من الثدي كما في (الشكل ٦ أ) حيث توضع اليد المجاورة للثدي المراد فحصه بجانب الجسم وبراحة اليد الأخرى يتم جس (تحسس) الأجزاء الخارجية من الأعلى إلى الأسفل على شكل نصف دائري باتجاه الحلمة كما في الشكل (٦ ب).



(الشكل ٦ ب)



(الشكل ٦ أ)

٣- يتم جس (تحسس) جزء الثدي (ذيل الثدي) المجاور للأبط كما في الشكل (٧) وذلك بوضع اليد المجاورة للثدي المراد فحصه تحت الرأس وبراحة اصابع اليد الأخرى يتم جس ذلك الجزء من الثدي مع التأكد من جس الحفرة الأبطية لوجود أية كتل.

٤- وبعد الانتهاء من التحسس قومي بالضغط على حلمة الثدي والجزء المحيط بها برفق بين الإبهام والاصابع الأخرى ولاحظي خروج دم أو سوائل غير طبيعية.



الشكل (٧)

ملاحظات هامة :

- ١- يجب اجراء الفحص الذاتي للثديين مرة كل شهر بعد الانتهاء من الدورة الشهرية بـ ٥-٧ أيام.
- ٢- يجب ابلاغ الطبيب دون تأخير إذا لاحظت أية أورام أو علامات غير طبيعية.
- ٣- يجب ابلاغ الطبيب دون تأخير إذا تغير حجم إحدى الكتل عن حجمها في الفحص السابق.
- ٤- إذا كنت قد اجريت لك عملية استئصال ثدي سابقة، يجب عليك فحص موضع الثدي المستأصل وندبة العملية فهي المناطق المفضلة لعودة الأورام.

الوحدة
السادسة عشرة

الوحدة السادسة عشر

العظام ونقي العظم Skeletal System

- الالتهاب

حاد .

مزمن .

- ترقق العظم .

- الكساح .

- الأورام

حميدة .

خبيثة .

Skeletal System العظام ونقي العظم

- التهاب العظام

قيحيه (Pyogenic)

وتقسم إلى :

التهاب حاد Acute Osteomyelitis

المسبب غالباً المكورات العنقودية تصيب نهايات العظام الطويلة خاصة في الاطفال حيث تنتقل عن طريق الدم مسببه الانتشار السريع مع تكوين الخراج والتموت العظمي الشديد مما يؤدي الى تشكيل الشظايا العظمية الذي تتطلب التدخل الجراحي لإزالتها بالإضافة الى الألم في الساقين ، ارتفاع درجة الحرارة ، تورم وإحمرار مكان الإصابة . ولقد أصبح هذا النوع من الالتهاب نادر الحدوث بسبب إنتشار المضادات الحيوية .

النتائج

- الشفاء التام
- الإدمان
- الكسور المرضية نتيجة التفتت الشديد للعظم
- المرض النشواني Amyloid Disease
- التهاب المفاصل القيحي
- الموت بسبب تقيح وتخمج الدم
- Pyemia and Septicaemia

* الالتهاب المزمن Chronic Osteomyelitis

عادة يكون نتيجة عدم شفاء الالتهاب الحاد ويمكن ان يظهر من جديد (De novo) لسبب تواجد بؤرة التهابية قديمة تحوى عدد من الكائنات الحية الجرثومية قليلة الأمراض . عادة يبقى موضعياً ولا يشفى إلا بإزالة القيح جراحياً . ويعتبر التدرن أحد العوامل الهامة التي تسبب التهاب العظم ونقى العظم .

ترقق العظم Osteoporosis

يُعرف على أنه اضطراب على هيئة نقص أو خلل في الخلايا العظمية التنبية (Bone Matrix) وبالتالي قصور في بناء العظم وتشكيل المادة الغضروفية وفقاً لشكل العظم ومن ثم تصبح العظام هشّة ورفيكة .

المضاعفات :

- الكسور المرضية
- الضغط على اعصاب الدماغ .
- فقر الدم .
- يصيب كبار السن والنساء بعد سن الضهي بسبب نقص الاستروجين وعادة يكون مستوى الفوسفور، الكالسيوم والفوسفاتاز القلوية في الدم ضمن المستوى الطبيعي .

الكساح والخرع، Rickets

مرض عظمي معمم نتيجة نقص في فيتامين D بسبب سوء التغذية وسوء الامتصاص أو/و نقص في إدخال الكالسيوم والفوسفات، يصيب الخط المشاشي العظمي (Epipheseal line) مسبباً قصوراً في التعظم ومكوناً النسيج المعروف بنظير العظم دون كلس مما يجعل العظام طرية وقابلة للإنحناء. والأطفال بعد سن ٦ شهور أكثر عرضه للإصابة، يشكو المريض من تضخم في النهايات العظمية المشاشية، هشاشة وانحناء العظام الطويلة، صدر كصدر الحمامة (Pigeon Chest)، تحدب الظهر، تفلطح الحوض وتشوهات تشمل الجمجمة والوجه (Cranioctabes) كبروز العظم الجبهي والجداري وتحدب في الرأس وتأخر انغلاق اليوافيخ، تأخر التسنن (Delayed dentition) وإعاقه «قصع» النمو (Stunted growth). العلاج بإعطاء فيتامين D والتعرض لأشعة الشمس.

الأورام العظمية :

حميدة وخبيثة :

١- الحميدة Benign

- الورم العظمي Osteoma :

يصيب عظام الجمجمة مسبباً تعظم صلب يؤدي الى اعراض انضغاطية في تجويف الجمجمة والجيوب الأنفية وقد يؤدي الى الالتهاب . العلاج جراحي .

- الورم الغضروفي Chondroma

وحيد أو متعدد يصيب العظام الصغيرة، قد يحدث التراجع في أي

مرحلة من النمو أو يستمر في النمو مسبباً الألم وتشوه العظام مؤدياً إلى الكسور المرضية أو ظهور السرطان الغضروفي .

– الورم العظمي الغضروفي Osteochondroma

أكثر الأورام حدوثاً، وحيد أو متعدد، يصيب العظام الطويلة غالباً .

٢- الخبيثة Malignant

– الورم النقوي المتعدد Multiple Myeloma

ورم خبيث تكاثري يتكون غالباً من الخلايا المصورة (Plasma cells) حيث تعتبر هذه الخلايا مصنعاً للغلوبولينات المناعية (Immunoglobulines) يصيب الإناث والذكور بالتساوي، يلاحظ في سن متأخرة ولكن من المعروف أنه يتكاثر ببطء ولذلك يعتقد أنه في الحقيقة يبدأ عدة سنين قبل ظهوره عياناً . يتوضع عامة في الجهاز العظمي والنقي العظمي عادة وقد يكون بؤرياً (Focal) ونادراً ما يصيب الطحال، الكبد والعقد الليمفاوية . يمتاز بالألم، فقر الدم، الالتهاب وفي النهاية القصور الكلوي أو الأعراض الثانوية للداء النشواني (Amyloidosis) والعلاج يكون بالأشعة والمواد الكيماوية والعلاج الوقائي المساند نتيجة الأمراض الثانوية المرافقه له .

– ورم ايونغ Ewing's Tumour

يصيب صغار السن بين ٥-٣٠ سنة، يتوضع في العظام الطويلة، عظام الحوض، الاضلاع ولوح الكتف، يعتبر من أورام الوريقة الظاهرة العصبية البدائية (Primitive Neuro-Ectoderm) خبيث السلوك البيولوجي جداً،

ينتشر بواسطة الدم مبكراً في الرئة والعظام الأخرى وعادة يؤدي الى الوفاة .

- الغرن العظمي Osteosarcoma

شديد الخبث سلوكياً، يصيب هشاشة العظام الطويلة غالباً وخاصة مفصل الركبة، يحدث بين ١٠-٢٥ سنة ولكن يلاحظ ايضاً عند كبار السن، ينتشر بسرعة فائقة بواسطة الدم الى الرئة، يدمر العظم موضعياً مسبباً آلام شديدة، محدودة في الحركة وانتفاخ في المكان المصاب . يتم التشخيص شعاعياً ونسجياً .

- الغرن الغضروفي Chondrosarcoma

يعتبر من أكثر أنواع الأورام الخبيثة حدوثاً، يصيب كل الفئات العمرية ويتوضع في عظام الحوض والعظام الطويلة، بطيء النمو يضغط على الأنسجة المجاورة في المراحل المبكرة ومن ثم ينتشر مباشرة بواسطة الدم خاصة الى الرئة مسبباً الوفاة .

الوحدة
الثالثة عشرة

الوحدة السابعة عشر

الغدد الصماء

Endocrine Glands

- الغدة النخامية Pituitary Gland .
- الغدة الدرقية Thyroid Gland .
- غدد نظائر الدرق Parathyroid Gland .
- الغدة الكظرية Adrenal Gland .

الغدد الصماء

تسيطر الغدد الصماء على الوظائف العضوية والاستتلاية في الجسم عامة وفي ذلك تلعب الغدة النخامية المحور الرئيسي حيث تعمل على إفراز:

- هرمون النمو Growth Hormone .

- البرولاكتين Prolactin يحث إفراز الحليب .

- الغونادوتروپينات Gonadotropins:

1- Follicular stimulating Hormone (FSH)

يحث نمو الجريبات في المبيض
ovary Promotes growth of follicles in

يحث عملية الانطاف Promotes spermatogenesis

2-Lutenising Hormone (LH)

يحث التبويض Induces ovulation

و انتاج هرمون التسترون بواسطة الخصية
Stimulates Testosterone production by testes

- Thyroid-stimulating Hormone (TSH)

يحث إفراز هرمونات الغدة الدرقية ويمكن ان يسبب فرط تنسج الغشاء
البطاني للغدة .

- Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

إفراز Glucocorticoids بواسطة قشرة الغدة الكظرية
Adrenal Cortex .

امراض الغدة النخامية

وتشمل اضطرابات الفص الأمامي (Adenohypophysis) والخلفي (Neurohypophysis) قد تسبب زيادة افراز الهرمونات - Hyperfunction (Hyperpituitarism) أو نقص الإفراز - Hypofunction (Hypopituitarism).

تناذر شيهان Sheehan's Syndrome

السبب فقر ترويه دموية يؤدي إلى التنخر (Ischaemic necrosis) عند النساء بعد الولادة، وتعتمد الأعراض السريرية على مدى التغيرات النسيجية :

- ١- نقص TSH اعراض نقص نشاط الغدة الدرقية (برودة، تساقط الشعر) .
- ٢- نقص البرولاكتين - عدم القدرة على الإرضاع ومن ثم ضمور الثدي .
- ٣- نقص ACTN - عدم كفاءة Glucocorticoids : وهن، انخفاض BP، Hypolycaemia نتيجة انخفاض قيمة السكر في الدم .
- ٤- نقص Gonadotropins - غياب الدورة الشهرية، العقم، نقص Libido (النشاط الجنسي).

زيادة نشاط الفص الأمامي تسبب :

- ١- العملاقة Gigantism و ضخامة النهايات والرأس Acromegaly .
- ٢- زيادة افراز البرولاكتين - قد تؤدي إلى العقم .

نقص نشاط الفص الخلفي :

ويتتركب الفص الخلفي من نسيج عصبي ويستخدم لحفظ نوعين من الهرمونات تنتجها الغدة تحت سريية Hypothalamus أحدهما :

. (Vasopressin, Antidiuretic hormone, ADH)

يعمل على تنظيم توازن الماء وفي حالة النقص يؤدي الى ظهور ما يعرف بالسكري الكاذب Diabetes insipidus يتمثل على هيئة كثرة التبول والعطش نتيجة فقدان كميات كبيرة من السوائل، وأسبابه عادة اصابات رضحية، أورام او التهابات وما غير في منطقة الفترة تحت سريرية .

Thyroid gland الغدة الدرقية

تتكون من فصين جانبيين متصلان ببرزخ في الوسط تزن ٢٠-٤٠ غم
في الوضع الطبيعي تفرز : Thyroxine T4

Tri-iodothyronine T3

calcitonin

اضطرابات نشاط الغدة الدرقية تتمثل :

١- زيادة النشاط (Hyperthyroidism) بسبب زيادة افراز هرمون
T3,T4 .

الأعراض السريرية :

- تسارع نبضات القلب وعدم انتظامها .
 - تعرق الكفين والقدمين .
 - التورّد في الوجه .
 - جحوظ العينين .
 - اعراض عصبية .
- ٢- نقص نشاط الغدة الدرقية Hypothyroidism .

ويظهر على هيئة :

- الوذمة المخاطية Myxoedema عند البالغين
تغيرات استقلابية، انخفاض درجة الحرارة، تساقط الشعر، قلة الشهية،
وذمة، العقم .

- القدامه و البلاهة عند الأطفال Cretinism

ويكون على شكل مستوطن Endemic حيث يترافق مع نقص اليود في
الغذاء أو فرادى Sporadic حيث يترافق مع خلل في تكوين هرمون T4
التيروكسين . يشكو المريض من جفاف وخشونة الجلد، توسع بين العينين،
تضخم اللسان، تأخر تطور الدماغ والعظام .

غدد نظائر الدرق Parathyroid glands

وتتكون من أربعة غدد صغيرة تقع خلف الغدة الدرقية تعمل على إفراز
هرمون Parathormone الذي ينظم امتصاص الكالسيوم والافراز الخارجي
للفوسفات وبالتالي التوازن القاعدي / الحامضي في الدم .-(Control Acid-
Base Balance)

زيادة نشاط نظائر الدرق :

نميز ٣ اشكال :

- البدئي Primary

ويتمثل على هيئة :

١- زيادة تكوين الحصى الكلوية - فشل كلوي .

- ٢- التكييس الليفي العظمي Osteitis fibrosa cystica .
- ٣- وهن عضلي معمم General muscle Weakness .
- ٤- التكلس Metastatic Calification .

- الثانوي Secondary

- حالات هبوط الكلى المزمن، تلين العظام ونقص فيتامين D - < نقص قيمة الكالسيوم في الدم .
- Tertiary - زيادة نسبة الكالسيوم نتيجة فرط التنسج الغير متوازن .

نقص نشاط نظائر الدرق Hypoparathyroidism

- ويظهر في ثلاث حالات :
- عند الاستئصال خطأ بقصد استئصال الغدة الدرقية .
- امراض مناعية ذاتية .
- تشوهات خلقية .

أهم الأعراض :

التشنجات والتكزز Tetany

- الغدة الكظرية Adrenal gland

- وتتكون من القشرة «Cortex»، والنخاع - اللب «Medulla» وتتوضع كل منهما فوق قمة كل كلية .
- القشرة تفرز الهرمونات التالية :

- ١- Glucocorticoids أهمها Hydrocortisone : تنظيم عملية الاستقلاب الغذائي وخاصة الأنسولين ومعدل Glycogen .
- ٢- Mineralcorticoids وأهمها Aldosterone : السيطرة على عملية امتصاص وفقدان الصوديوم Na^+ ، الإفراز الخارجى للبوتاسيوم K^+ .
- ٣- Sex hormones وخاصة الذكورية Androgens وفي الغالب هو المسؤول عن العلامات الذكورية المبكرة .

النخاع يفرز :

- الإدرينالين Adrenaline : زيادة تكون الغليكوجين -gly Increase
cogenesis زيادة معدل الاستقلاب Increase Metabolic rate
وتوسع القصبات Bronchodilatation .
- نورادرينالين Noradrenaline
- يسبب الانقباض الوعائي Vasoconstriction وارتفاع ضغط الدم .

نقص النشاط الهرموني للقشرة Hypofunction

نخص بالشرح :

- Addison's Disease «مرض أديسون» نتيجة خلل في إنتاج Mineralcorticoids يكثر عند النساء، يتميز بتلون الجلد باللون البرونزي الداكن، زيادة فقدان الصوديوم وارتفاع نسبة البوتاسيوم، انخفاض ضغط الدم، الوهن وفقدان الشهية .
- زيادة النشاط الهرموني للقشرة Hyperfunction ويظهر في ثلاثة أشكال :

١- تناذر كوشينغ Cushing's Syudrome

بدانه، ووجه قمري، شعرانيه، ضعف ووهن، هشاشة العظم، ارتفاع الضغط، اضطرابات طمئيه .

٢- Cohn's Syndrome (Hyperaldosteronism)

ارتفاع الضغط، عدم انتظام نبضات القلب، تكرر Tetany .

٣- زيادة افراز الهرمونات الجنسية

المراهقة المبكرة عند الذكور Precocious Puberty الشعرانية عند الإناث Virilism .

أما زيادة نشاط نخاع الغدة الكظرية عادة يكون بسبب الأورام من أهمها :

ورم القواتم Pheochromocytoma

ورم حميد يتكون من الخلايا الكرومافينية Chromafin cells وتعتمد الأعراض على مدى ارتفاع الأمين Amines والتي تتمثل بارتفاع الضغط، زيادة الاستقلاب الغذائي والسكر في الدم، العصبية الشريانية تتقدم بسرعة وقد يظهر النزف الدماغي .

والله ولي التوفيق

الطب الشرعي

الوحدة الأولى
« الطب الشرعي »

- ١- لمحة تاريخية .
- ٢- تعريف الطب الشرعي والبيئة الطبية .
- ٣- الحالات الطبية القضائية .
- ٤- واجبات الأطباء تجاه الحالات الطبية القضائية .
- ٥- التقارير الطبية القضائية وأنواعها .

الطب الشرعي

لمحة تاريخية

لقد بدأت الجريمة منذ نشأت الخليقة حيث قام قابيل بقتل أخيه هابيل أبناء آدم عليه السلام وقد بدأت الحضارة القديمة بوضع القوانين التي استندت الى البيئة الطبية وخاصة في مواضيع الايذاء والجرائم الجنسية وكذلك في مواضيع أخلاقيات المهنة حيث وردت كثير من الأمثلة على ذلك في شرائع حمورابي والأراميون والفراعنة وغيرهم .

ومع تطور البشرية وازدياد عدد سكان العالم والتوسع في وسائل الاتصال المرئي والمسموع واختلاط الشعوب وارتفاع نسب الفقر والبطالة وازدياد حجم الجريمة وتنوعيتها أدى الى تطور الطب الشرعي وتقدمه ليواكب تطور الحياة والعلوم بشكل فعال في تحقيق العدل والأمان للمجتمع .

فأصبح الطب الشرعي في هذا القرن أحد المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها رجال القضاء للوصول الى الحقيقة، واختلقت النظم الطبية الشرعية في العالم .

- ففي بريطانيا مثلاً تميز الطبيب الشرعي المختص بمعالجة وقائع الأحياء عن الآخر المختص بتشريح الجثث (CORONER SYSTEM).

وفي سكوتلندا وأوروبا يمارس الطبيب الشرعي عمل الإثنين معاً بأن واحد وهو ما نقوم به في الأردن في الوقت الحالي (CONTINITAL SYS-TEM).

وأما الطبيب الشرعي في الولايات المتحدة الأمريكية يعالج تشريح جثث الموتى في الحالات الطبية القضائية ويسمى (MEDICAL EXAMINER) .
وأما من حيث مرجعية أو مرد هذا النوع من الاختصاص الطبي فإنه كذلك يقسم الى ثلاثة اقسام :

١- الطب الشرعي ومرجعه وزارة الصحة .

٢- الطب الشرعي ومرجعه وزارة العدل .

٣- الطب الشرعي ومرجعه الجامعات .

ومهما كان النظام المتبع أو مرجعية الطب الشرعي فإن الغاية واحدة والهدف واحد وهو الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة .

تعريف الطب الشرعي

ان التعريف المختصر للطب الشرعي هو العلاقة بين الطب والقانون « فهو ما يحتاجه الطب من القانون والقانون من الطب » .

أما بالنسبة للشق الأول وما يحتاجه الطب من القانون فيتمثل في حاجة الطب والمهن الطبية بشكل عام الى القوانين والأنظمة التي تنظم عمل هذه المهنة وأخلاقياتها مثل الدستور الطبي وقانون نقابة الأطباء وقانون المجلس الطبي وقانون الصحة العامة أو قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان فهذه قوانين لها علاقة بمهنة الطب والعاملين فيها .

أما بالنسبة للشق الثاني من التعريف وهو ما يحتاجه القانون من الطب فهذا يقوم على اساس البيئة الطبية وأهميتها بالنسبة للقضاء .

البيئة الطبية :

هي المشورة والخبرة الفنية الطبية التي يحتاجها القضاء لإثبات واقعه أو حادثه ما تتعلق بالإنسان أو صحته .

أهمية البيئة الطبية :

١- اثبات وقوع جريمة أو عدمها .

هناك كثير من القضايا لا يمكن السير فيها إلا بعد الاستعانة بالخبرة الفنية الطبية لإثبات صحتها من عدمها فمثلاً إذا قام شخص ما بالتقدم بشكوى ضد شخص آخر بأنه قام بإيذائه جسدياً فإن أول ما يطلبه رجل التحقيق من هذا الشخص هو مراجعة الطبيب واحضار تقرير طبي يثبت واقعة الإيذاء . كما وإن ادعاء انसानه بأن أحد الأشخاص قام بالإعتداء عليها وفض بكارتها فإنه يتم ارسالها الى الطبيب الشرعي لبيان صحة ادعائها من عدمه بعد الكشف عليها وتنظيم تقرير طبي بذلك .

٢- بيان نوعية الملاحقة في الجرائم المثبتة .

هناك نوعان من الملاحقة الأول بالحق الشخصي والثاني هو الملاحقة بالحق العام .

الحق الشخصي : هو حق الشخص على الدولة في معاقبة من أساء اليه .
الحق العام : هو حق المجتمع على الدولة في معاقبة الشخص المسيء لأن اساءته طالت المجتمع .

البيئة الطبية تحدد نوعية هذه الملاحقة من خلال تقدير مدة التعطيل في حالات الايذاء أو من خلال بيان شدة الإصابة وطبيعتها .

فإذا كانت مدة التعطيل أقل من عشرة ايام فإن القضية تلاحق بالحق الشخصي فقط وتسقط القضية اذا قام صاحب الشكوى بالتنازل عنها واسقاط حقه الشخصي إلا في الحالات التي تكون فيها الإصابة وحسب تقدير الطبيب بأنها خطيرة وتشكل خطورة على حياة المصاب ولو كانت مدة التعطيل لا تصل الى عشرة ايام وخاصة في حالات الشروع بالقتل .

أما إذا تجاوزت مدة التعطيل العشرة ايام أو تخلف عند المصاب عاهة او إعاقة دائمة فإن القضية تلاحق بالحق العام والحق الشخصي معاً وإذا قام صاحب الشكوى بإسقاط حقه الشخصي عن الجاني في مثل هذه الحالة فإن

القضية لا تسقط بل يتم السير بها وملاحقة الفاعل بالحق العام ومعاقبته .
لذلك لا يستطيع القضاء في مثل هذه القضايا السير فيها او انتهاء المحاكمة فيها قبل ورود البينة الطبية، ليتمكن القاضي من معرفة نوعية الملاحقة وانتهاء المحاكمة حسب الأصول المتبعة .


٣- تحديد العلاقة السببية

ونقصد بذلك العلاقة بين الجاني والأداة المستخدمة في الجريمة من جهة وبينها وبين المجني عليه والاصابة من جهة اخرى .

فالطبيب الشرعي ومن خلال معاينته للمصاب يقوم بتحديد نوع وطبيعة الاصابة والأداة المسببة لها فمثلاً اذا قمنا بوصف جرح طعني فلا بد لنا من بيان طبيعة الأداة المسببة فمن الممكن أن تكون أداة صلبة حادة ذات حافة حادة واحدة أو ذات حافتين حادتين وذلك من طبيعة أطراف الجرح الطعني وإذا قلنا بأن الجرح الموصوف هو جرح قطعي فيعني ذلك أنه ناتج عن جر أداة صلبة حادة كالكسكين وما في حكمها .

وإذا قمنا بوصف جرح عيار ناري فيجب بيان مدخل الجرح من مخرجه وذلك بوصف جرح المدخل وصفاً دقيقاً وكذلك بيان فيما إذا كان الإطلاق كان بتماس أو عن قرب أو عن بعد من خلال البحث عن نواتج العيار الناري في جرح المدخل أو حوله .

وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك واقتصر على بعضها كما ذكرت .
واليك هذا الرسم التوضيحي للعلاقة السببية بشكل عام .



٤- بيان المحكمة ذات الاختصاص التي تنظر بالقضية .

ان البيئة الطبية ومن خلال بيان مدة التعطيل وخاصة في حالات الايذاء تبين الجهة المختصة بالنظر في القضية فمثلاً اذا كانت مدة التعطيل لشخص وقع عليه فعل الايذاء اقل من عشرة ايام فإن القضية تنظر في محكمة الصلح وإذا زادت مدة التعطيل عن العشرة أيام تبقى في محكمة الصلح وإن زادت عن واحد وعشرون يوماً فإن القضية تنظر في محكمة البداية او محكمة الجنايات .

كذلك من خلال بيان مدى خطورة الإصابة على حياة المصاب فإن ذلك يحدد كذلك الجهات المختصة بالنظر في هذه القضية فالإصابات بشكل عام تقسم الى ثلاثة انواع :

أ- الإصابة البسيطة :

وهي الإصابة الغالب فيها الشفاء وان حدثت فيها مضاعفات او تسببت بالوفاة فإن ذلك يكون مدعاة للاستغراب .

ب- الإصابة الخطرة :

وهي الإصابة التي تشكل خطورة على حياة المصاب والمضاعفات فيها

متوقعة وان حدثت الوفاة فإن ذلك يكون متوقعا ولأسباب يقف عليها الطبيب.


ج- الإصابة انقائلة :

وهي الإصابة التي تغلب عليها الوفاة وان عاش المصاب يكون ذلك مدعاة للاستغراب .

وقد لا يكون هناك علاقة بين طبيعة أو نوع الإصابة والحالة العامة للمصاب وكما تقسم طبيعة الاصابات الى ثلاث انواع فإن الحالة العامة للمصاب تقسم ايضاً الى ثلاث وهي :

- ١- الحالة العامة حسنة : ويغلب عليها الشفاء بدون مضاعفات .
- ٢- الحالة العامة المتوسطة : ويغلب عليه الشفاء ايضاً ولكن ان حدثت فيها مضاعفات او الوفاة فإن ذلك يكون متوقعا .
- ٣- الحالة العامة سيئة : وهي الحالة التي يغلب فيها حدوث الوفاة ونجاة المصاب يكون أمراً مستغرباً .

وكما ذكرنا سابقاً فقد تكون طبيعة الإصابة لشخص ما بسيطة ولكن الحالة العامة سيئة وذلك لأسباب أخرى مرضية ليس لها علاقة بالإصابة مثل احتشاء عضلة القلب أو غيبوبة السكري أو نقص السكر والعلاقة بين طبيعة الإصابة والحالة العامة للمريض يمكن تمثيلها بالرسم التالي :



لذلك يجب الربط بين الحالة العامة وطبيعة الإصابة فيما إذا كانت ناشئة عنها أو عن اسباب أخرى ليس لها علاقة بالإصابة وإنما لها علاقة بالحالة المرضية السابقة او الراهنة للمصاب .

الحالات الطبية القضائية

ان الحالات التي يبحث فيها الطب الشرعي ويقوم بالكشف عليها تسمى بالحالات الطبية القضائية ذلك انها وكما أسلفنا بالبيئة الطبية فهي بحاجة الى الخبرة الفنية الطبية وقضائية لأنها منظورة امام القضاء وتقسم هذه الحالات الى ما يلي :

١- الإيذاء المقصود غير المقصود

والإيذاء يكون عادة بالضرب او بالجرح او بإعطاء مواد ضارة او بأي فعل من وسائل العنف المؤثرة كالحروق والكسور وغيرها . ويكون الإيذاء مقصوداً اذا توفرت فيه النية والقصد الجرمي وأكثر ما يكون مثل هذا النوع من الإيذاء في المشاجرات والمنازعات .

وأما الإيذاء غير المقصود فهو الذي لا تتوفر فيه النية الجرمية ويكون خارجاً عن إرادة الاسنان ويغلب على هذا النوع من الإيذاء حالات القضاء والقدر مثل حوادث السير وحوادث السقوط وحوادث التسمم العرضي .

٢- حالات التسمم :

ان التسمم في الغالب قد يكون وفي الغالب عرضي وقد يكون مقصوداً لغايات الإنتحار ويسمى بالإنتحاري أو قد يكون جنائياً وبهدف القتل، وقد كان السم بالماضي الوسيلة الرئيسية لجرائم القتل وذلك لعدم توفر مختبرات وصعوبة الكشف عنه، وأصبح في العصر الحالي الوسيلة الأكثر شيوعاً للإنتحار والحالات العرضية .

٣- الكحول والمخدرات :

ان الكحول وفي معظم الدول العربية كما هو الحال في معظم دول

العالم مسموح به من حيث الصناعة والبيع والتناول وفي الأردن لم يمنع القانون تناول الكحول وإنما سمح به إلا في حالات معينة كأن يكون مقرون بالشغب وإزعاج الآخرين أو في حالات قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو تناول الكحول أثناء الوظيفة الرسمية أو تقديمه إلى حدث هذا ولم تحدد نسبة معينة للكحول في الدم وإنما اقتصر على وجود الكحول بالدم تحت اية نسبة مهما كانت متدنية .

أما بالنسبة للمخدرات فقد نصت التشريعات القضائية على منع جميع جوانبه من صناعة أو زراعة أو استيراد أو تصدير أو ترويج أو حيازة واعتبرت المدمن المتعاطي انسان مريض ويجب علاجه وقد قسمت الدول بشكل عام بالنسبة للمخدرات الى دول انتاج ودول عبور أو مرور ودول استهلاك والأردن تعتبر دولة عبور أو مرور والحمد لله .

٤- الجرائم الجنسية :

وكلمة جرائم هي أعم وأشمل من كلمة اعتداءات جنسية والتي ترد في معظم كتب الطب الشرعي ذلك أن ليس كل جريمة جنسية هي اعتداء بل هناك جرائم جنسية تتم برضا الطرفين وبدون اعتداء وفي نفس الوقت تعتبر جريمة وتلاحق بالقانون .

وسوف نبحث في الجرائم الجنسية التي يكون فيها للطب الشرعي دور وكلمة فيها بالنسبة للجرائم التي ليس للطب فيها دور فقد تركنا الحديث عنها وأهم الجرائم الجنسية التي للطب دور في معابقتها وابداء الخبرة الفنية فيها وهي:

أ- الزنا : وهو موقعة ذكر لأنثى برضاها .

ب- الاغتصاب : وهو موقعة ذكر لأنثى (غير زوجة) حية بدون رضاها.

- ج- السفاح : وهو مواعدة ذكر لأنثى من احدى أصوله أو فروعه ممن هم محرومون عليه شرعاً .
- د- هتك العرض (اللواط) : وهو مواعدة ذكر لذكر أو ذكر لأنثى من فتحة الشرج .
- وسوف نبحث هذه الجرائم وطبيعتها وملاحقتها والبيئة الطبية فيها في باب الجرائم الجنسية لاحقاً .

٥- الحمل والاجهاض غير المشروع :

ان من نتائج ومضاعفات الجرائم الجنسية حدوث الحمل غير المشروع وغالباً ما يكتشف هذا النوع من الحمل في مراحل متقدمة منه وخاصة في مرحلة الولادة وعندما تراجع الحامل الطبيب لحدوث آلام الولادة عندها يكتشف الطبيب بأنها حامل بعد اجراء الفحوصات الطبية السريرية والتحيرية والشعاعية وفي مثل هذه الحالة يطلب من الطبيب الشرعي اجراء الكشف الطبي وبيان حالة غشاء البكارة فيما إذا كان سليم او ممزق وفي أغلب الحالات التي تعاملنا معها كانت النتائج سلبية اي ان غشاء البكارة سليم تماماً وهنا يثار موضوع امكانية الحمل رغم سلامة غشاء البكارة والجواب نعم فمن الممكن وبكل بساطة حدوث الحمل مع بقاء غشاء البكارة سليم .

أما بالنسبة للاجهاض غير المشروع فيشمل جميع أنواع الاجهاض باستثناء الاجهاض العلاجي والذي نص عليه الدستور الطبي وقانون الصحة العامة وهو الذي يشكل فيه الحمل خطراً على حياة الحامل أو صحتها أما ما عدا ذلك من أسباب الاجهاض فهي تعتبر مخالفة للقانون وتشكل جريمة .

٦- اثبات الأبوة والبنوة :

لقد كنا بالماضي نبحث هذا الموضوع تحت باب نفي الأبوة وليس اثباتها

على اعتبار الفحوصات الطبية التي كانت تجري بالماضي لهذه الغاية كانت تنفي ولا تثبت الأبوة ولكن مع تطور العلم والطب، والطب الشرعي بشكل خاص فقد توصل العلماء الى فحص يثبت الأبوة والبنوة من خلال اجراء فحص المقارنة لمادة (DNA) والتي تصل نسبة النجاح والجزم فيها الى ١٠٠٪ حسب الطريقة التي تجري فيها .

وموضوع اثبات الأبوة والبنوة كثيراً ما يثار في حالات الحمل غير المشروع وتعدد الاشخاص المتهمين وكذلك في حالات الشك بتبدل الأطفال داخل المستشفيات أو في حالة فقدان طفل والعثور عليه بعد مرور فترة زمنية طويلة وغيرها من الحالات .

٧- تحديد المسؤولية والمسؤولية الناقصة :

كثيراً ما يثار موضوع المسؤولية في حالات ارتكاب الجرائم وخاصة القتل والتي يدعي فيها الجاني بالجنون لمحاولة الافلات وابعاد المسؤولية عن نفسه ففي حالات الجنون مثلاً فإن الفحص الطبي والبينة الطبية مهمة جداً لإثبات حالة الجنون أولاً ثم بيان منذ متى هذا المرض موجود عند صاحبه ففي حالة اثبات ان الجاني كان مجنوناً حين ارتكابه الجريمة فإن ذلك يعفيه من المسؤولية ويعتبر غير مسؤول عن افعاله وتأمّر المحكمة عادة في مثل هذه الحالة بوضع الجاني في مستشفى الأمراض العقلية حتى يتعافى من مرضه ولا يخرج من المستشفى حتى ولو تعافى إلا بأمر من المحكمة . ولا تعاد محاكمته وأما اذا ثبت بأن الشخص كان بكامل قواه العقلية حين ارتكابه الجريمة وأصيب بعد ذلك بالجنون فإنه يتم وضعه في مستشفى الأمراض العقلية حتى يتعافى ويشفى من الجنون فيقدم بعد ذلك للمحاكمة . كذلك يثار موضوع المسؤولية والمسؤولية الناقصة في حالات السن فإذا كان مرتكب الجريمة دون سن السابعة من العمر فإنه يعتبر غير مسؤول عن أفعاله وإذا كان الشخص ما بين السابعة من العمر والثانية عشر فإنه يعتبر مسؤولاً ولا يعاقب وإذا كان سن الجاني فوق

الثانية عشر وأقل من الثامنة عشر فإنه يعتبر مسؤولاً مسوولية ناقصة ويعاقب حسب قانون الأحداث فإذا كانت الجريمة المرتكبة تستوجب عقوبة الاعدام فإنه لا يعدم .

وأما إذا كان سن الجاني فوق الثامنة عشرة فإنه يعتبر مسؤولاً مسوولية كاملة عن أفعاله ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون حسب الجرم المقترب .

وكذلك يمكن ان يثار موضوع المسؤولية في حالات السكر وفي هذه الحالة فإنه اذا ثبت ان الجاني كان في حالة سكر اثناء ارتكابه الجريمة وكان تناوله للكحول بغير رضاه أو بدون علمه بوجود المادة المسكرة التي قدمت له من اشخاص آخرين فإنه يعفى من المسؤولية ويكون غير مسوول عن الفعل المقترب .

أما إذ كان تناوله للكحول برضاه أو بعلمه بوجوده اثناء شربه فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية وإنما يعتبر مسؤولاً عن أفعاله وإنما تنفي عنه صفة العمد في جرائم القتل العمد ذلك أن الانسان حين يكون تحت تأثير الكحول لا يستطيع التخطيط والاعداد لارتكاب الجريمة وبالتالي فإنه من غير الممكن ان يكون هناك سبق اصرار وترصد في ارتكاب الجريمة ونقصد في هذه الفقرة الغيبوبة الناشئة عن الكحول التي نصت عليها القوانين .

٨- ابداء الخبرة الفنية الطبية :

في الحالات التي تتطلب ذلك للقضاء مثل تقدير نسبة العجز في حالات الإعاقة والعاهة الدائمة، وفي تقدير قيمة الضرر المادي والمعنوي في حالات الأيذاء وتخلف العاهة الدائمة . وغير ذلك .

٩- الكشف على حالات الوفيات في جرائم القتل وشبهة القتل :

يتم عادة الاستعانة بالطبيب الشرعي للكشف على حالات القتل ومسرح

الجريمة ويتبعها الكشف على الجثة وتشريحها ليبان حال الجثة والوقوف على السبب الحقيقي للوفاة والطبيب الشرعي في هذا المجال يلعب الدور الرئيسي في مساعدة رجل التحقيق للوصول الى الحقيقة ومعرفة كيفية ارتكاب الجريمة .

وتعاون الجهة القضائية والجهة الأمنية والجهة الطبية الشرعية بالطرق العلمية القويمة يفضي عادة الى افضل النتائج في مكافحة الجريمة والوقاية منها .

وكذلك يلعب الطب الشرعي دوراً أساسياً في كشف الجرائم المخفية وذلك بالكشف على حالات شبهة القتل والتي غالباً ما تعرض على الطبيب على انها حالة وفاة طبيعية .

وقد شملت حالات وفيات الفجأة وخاصة غير المتوقعة منها كونها غير معروفة السبب وتثير شبهة القتل .

والكشف على الحالات الطبية القضائية له فوائد ويحقق الكثير من الأهداف أهمها :

- ١- معرفة السبب الحقيقي للوفاة .
 - ٢- إعادة بناء الحادث أو الجريمة .
 - ٣- لغايات احصائية ووقائية .
 - ٤- لغايات علمية مثل اكتشاف الأمراض والوقاية منها .
 - ٥- لغايات تحديد المسؤولية مثل حوادث السير التي يدعي فيها السائق بأنه راكب .
 - ٦- لغايات شرعية مثل تحديد وقت الوفاة في حالات الإرث .
- ان موضوع البحث في الوفاة وعلاماتها وأسبابها وطرق الكشف عليها يحتاج الى وقت طويل لذا تم تخصيص باب للبحث في هذه الأمور .

واجبات الأطباء تجاه الحالات الطبية القضائية

ان مهنة الطب تعتبر من اسمى وأرقى المهن التي تتعامل مع الإنسان وحياته وصحته . لذلك فإنه يترتب على الطبيب واجبات تجاه الحالات الطبية القضائية التي يتعامل معها واهم هذه الواجبات تتمثل فيما يلي :

١- واجب الاسعاف :

ان واجب الاسعاف هو واجب مقدس ومقدم على جميع الواجبات الاخرى . فعلى الطبيب حين يتعامل مع أي حالة طبية أن لا ينسى بأنه طبيب أولاً . لذلك عليه ان يقدم الاسعاف والعلاج أولاً للحالة وعليه أن يوازن بين هذا الواجب والواجبات الأخرى وعليه أن يتحلى بالصبر واللباقة وحسن المعاملة مع رجال القضاء أو الأمن حين يقوم بالتعامل مع حالة طبية قضائية فعليه ان يوضح للمدعي العام او رجال الأمن بأن حالة المريض لا تسمح بأن يعطى افاده مثلاً في حالة كون المصاب في حالة دوخان أو شبه غيبوبة وان أخذ إفادة في هذه الحالة لن تفيد ويمكن الطعن فيها بكل سهولة .

فبإمكانه طلب مهلة للإسعاف واعطاء العلاج اللازم وبعد ان تستقر حالة المصاب وتسمح له بالتعاون يخبر المدعي العام او رجال الأمن بأنه المصاب في حالة تسمح بإعطاء إفادة .

كذلك على الطبيب ان يعطي الحالة التي يتعامل معها كل اهتمام وان لا يهمل بالتشخيص فيبذل أقصى ما عنده من جهد وعناية فمثلاً اذا قام رجال الأمن بإحضار شخص ما للفحص عن السكر فعلى الطبيب ان يجري الفحص بكل أمانة واخلاص وان يتأكد بالطرق العلمية فيما اذا كانت حالة هذا الشخص ناشئة عن الكحول ام أنها ناتجة عن اسباب مرضية مثل هبوط أو ارتفاع نسبة السكر بالدم او وجود أمراض أخرى أو تناول لعلاج ما أو هناك اصابة بالرأس أو غيره تجعله في هذه الحالة وحتي لو تأكد الطبيب من أن الحالة

ناشئة عن تناول للكحول فمن واجبه التأكد من حالة الشخص وتقييم حالته فلربما يكون بحاجة الى علاج من الكحول حيث من الممكن ان يكون هذا الشخص قد تناول كمية كبيرة تصل الى درجة التسمم بالكحول وفي مثل هذه الحالة عليه ان يخبر رجل الأمن بأن الحالة تستدعي الاسعاف والعلاج وأنه بحاجة الى دخول المستشفى وفي حال رفض رجل الأمن لطلب الطبيب عليه ان يدون ذلك وتنسيبه بدخول المستشفى حتى لا يتحمل مسؤولية فيما بعد لو حدثت مضاعفات أو وفاة .

٢- واجب التبليغ :

لقد نصت التشريعات القانونية على وجوب التبليغ عن الحالات القضائية والجرائم المشهودة بشكل عام وخصص الأطباء وأصحاب المهن الصحية بذلك حيث من الممكن واثناء معالجة احدى الحالات ان يكشف الطبيب أو أحد مساعديه أو أن تبدو له أن الحالة ناتجة عن وقوع جثة أو جناية فعليه في هذه الحالة ان يخبر السلطات الأمنية او القضائية بذلك وإلا فإنه سوف يعرض نفسه للمسؤولية والعقاب .

وعلى الطبيب أن يتنبه كذلك وأن يوازن في حالات التبليغ بين هذا الزايج وبين حفظ السر المهني فهناك حالات من الجرائم لا تتم الملاحقة فيها الا بشكوى او بدعوى الحق الشخصي هنا لا يجوز للطبيب ان يبلغ عن هذه الحالات وإذا قام بالتبليغ وتبين أن الشخص صاحب الحق بالشكوى لا يريد إقامة دعوى، فمن حق هذا الشخص أن يدعي على الطبيب بإفشاء السر المهني.

فالتبيب مؤتمن على حياة الناس وأسرارهم وان أقل ما تتطلبه طبيعة عمله عدم التعرض الى ما يطلع عليه خلال اداء وظيفته باطلاع حتى أقرب الناس اليه لما قد يترتب عليه من مضاعفات .

وقد نصت المادة (٢٢٥) من قانون العقوبات (قانون رقم ١٦ لسنة

١٩٦٠) على أنه (يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي ومحاكمات لجلسات السرية وكل محاكمة منعت المحكمة بنشرها) .

لذلك على الطبيب ان يكون ملماً بالقانون وخاصة فيما يتعلق بالنواحي التي يترتب عليه من خلال مزاولته لمهنته وان يعلم متى يستطيع التبليغ عن الحالات التي تعرض عليه من الحالات التي لا تستوجب التبليغ .

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (٢٠٧) من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ على أن (كل موظف أعمل أو أربأ اعلام السلطة القضائية ذات الصلاحية عن جنائية أو جنحة عرف بها اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة خمسة دنانير الى عشرين ديناراً) .

كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن :

(كل من قام حال مزاوله احدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جنائية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية؟) . (من نفس المادة) .

وقد تم استثناء الحالات التي لا تقام فيها الدعوى إلا بشكوى ويسقط فيها الحق العام بإسقاط الحق الشخصي وذلك في الفقرة الرابعة من نفس المادة (تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها عن الشكوى) .

٣- ضبط الأدلة المادية والجرمية :

في كثير من الحالات يكون الطبيب أول من يتعامل مع الحالة الطبية القضائية سواء أكان ذلك بالكشف على مسرح الجريمة أو بإحضار الحالة الى مكان مزاولته المهنية فهنا من واجب الطبيب ان يقوم بضبط الأدلة المادية والجرمية ويتعامل معها بكل موضوعية وطرق علمية صحيحة .

فمثلاً اذا قام الطبيب بمعاينة حالة اعتداء جنسي فعليه ان يقوم بضبط جميع الأدلة المادية التي يشاهدها أو تبدو له انها تخدم القضية فيقوم بضبط الملابس أولاً بعد أن يطلب من الأهل أو المرافقين للحالة بإحضار ملابس بديلة للمجنني عليها، ثم يقوم الطبيب بضبط اي مواد يعثر عليها على جسم المجني عليها مثل الشعر أو الصوف أو الوبر وغيره ويقوم بوضع كل عينة في كيس مخصص لها ويدون عليها اسم المادة المضبوطة واسم المجني عليها ورقم الحالة وينحرز عليها بطريقة جيدة ثم يقوم بعد ذلك بأخذ مسحات مهبلية وشرجية ومن أي مكان آخر في جسم المجني عليها يشته به وجود مادة غريبة .

ويضع كل مسحة في مكانها المخصص ويدون عليها اسم العينة واسم المفحوص ورقم العينة وتاريخها .

ثم بعد ذلك يقوم الطبيب وبعد تحريز العينات بملئ النماذج المخصصة للمختبر الجنائي والتي يذكر فيها اسمه واختصاصه، وعنوانه، واسم العينات المرسله، وعددها، ونوع الفحص المطلوب وتاريخ ارسال العينات وتاريخ اخذها واسم الشخص المرسله معه واسم وعمر الشخص المأخوذه منه العينات ولحمة بسيطة عن ظرف الحالة .

إن عملية أخذ العينات والتعامل معها من حيث الضبط والتحريز والارسال والتوقيت والسرعة في اخذها من الأمور المهمة جداً، ويستطيع الدفاع الدخول منها في القضية والاعتراض والطعن في الخبرة الفنية الطبية او التشكيك فيها اذا كان هناك تقصير في اي مرحلة من مراحل التعامل مع الأدلة المادية والجسمية .

ومن الأدلة المهمة جداً ايضاً والتي غالباً ما يغفل عنها الأطباء المعالجون هي الملابس وخاصة في حالات الاصابة بالأعيرة النارية إذ أول ما يقوم به الأطباء هو تمزيق الملابس ونزعها عن المصاب وبعد ذلك يتم اهمال هذه الملابس والقائها في سلة القمامة دون الإلتباه الى الأهمية الكبرى لها لاحقاً، فمثلاً اذا مات هذا الشخص رغم المحاولات الطبية لإنقاذ حياته ولم تأخذ منه

افادة صحيحة بالواقعة فسوف يتم تحويل الجثة الى الطبيب الشرعي للكشف عليها وتشرحها وبيان سبب الوفاة وهنا يقوم الطبيب الشرعي بالكشف على الحالة ولا يتبين له في الجثة أو عليها أي علامة من علامات قرب إطلاق النار ذلك أنه من الممكن ان تكون جميع هذه العلامات موجودة على الملابس التي تم اغفالها والتخلص منها وان هذا يغير كثيراً من مجرى التحقيق والقضية .

وفي حالات أخرى كالجروح الطعنية او الجروح بشكل عام يرتكب كثير من الأطباء نفس الأخطاء وذلك بالتخلص من الملابس واغفالها والتي تكون ذات أهمية كبيرة في بيان الاصابات في الملابس وتوافقها مع الاصابات على جسم الضحية او في حال وجود اثار لدم أو بقع مشتبهة أو أية مواد أخرى ذات أهمية تحقيقية أو دفاعية .

والأمثلة كثيرة في هذا السياق ونكتفي بما ذكرنا سابقاً ونلخص أهمية ضبط الأدلة المادية والجرمية فيما يلي :

١- الحفاظ على الحقيقة والحقوق .

٢- السير الصحيح بالقضية .

٣- مساعدة رجال الأمن والقضاء والمحامون بالوصول الى الحقيقة .

٤- كتابة التقرير الطبي :

ان من واجب الطبيب وبعد معانيته للحالة الطبية القضائية وبعد تقديم الاسعاف وضبط الأدلة المادية والجرمية وتبليغ الجهات المختصة ان يقوم بتنظيم تقرير طبي قضائي بالحالة والتقرير الطبي من حق المصاب ومن واجب الطبيب ان يعطي هذا الحق ويجب عليه .

وللتقرير الطبي صفات عامة يجب على الطبيب ان يعرفها ويتقيد بها فالتقرير الطبي لا يشترط ان يكتب على نموذج معين وإنما يجوز كتابته على ورقة بيضاء ولكن يجب ان يكتب فيه الطبيب جميع مكونات التقرير الطبي

وقد وضعت نماذج خاصة للتقارير الطبية وذلك تسهيلاً على الأطباء في كتابتها.

وعلى الطبيب أن يتحرى الصدق والدقة في كتابة التقارير الطبية وأن يقوم بتعبئة ترويسة التقرير بعد التأكد من هوية الشخص المفحوص وذلك عن طريق ابراز هويته الشخصية او عن طريق معاناة الاصابات الموصوفة سابقاً او بواسطة ولي أمر المصاب اذا كان حدث ويجب كتابة التقرير بلغة سهلة واضحة حتى يتسنى لرجل القضاء قراءتها وفهمها واستيعابها ثم يجب ان تكون متسلسلة وان لا يترك فيها فراغات بين السطور حتى لا تسمح بتعبئتها لاحقاً من قبل اشخاص غايين وكذلك يجب ان تخلو من التشطيط واذا أخطأ الطبيب في عبارة ما اثناء الكتابة فيأمكنه وضع الكلمة او الجملة بين قوسين () وكتابة عبارة لا بل بعدها ثم يسترسل في متابعة تقريره .

ويجب ان يشير الطبيب في تقريره الى التقارير السابقة ارقامها وتواريخها ومصدرها وأن يشير الى نتائج الفحوصات المخبرية والشعاعية . وفي نهاية التقرير عليه أن يضع توقيعه واسمه بشكل واضح ومفتوح .

ويتكون التقرير الطبي من ثلاثة اجزاء رئيسية وهي :

١- ترويسة التقرير :

وتحتوي على معلومات عن طبيعة المشكلة مثل الحادث او مشاجرة او كشف جنس ... الخ وكذلك رقم التقرير وتاريخه وساعته واسم الطبيب المنظم للتقرير والجهة ذات العلاقة التي بناء على طلبها حرر التقرير ورقم الكتاب وتاريخه واسم الشخص المفحوص صاحب العلاقة وعمره وجنسه وعنوانه ومكان اصدار التقرير الطبي .

٢- متن التقرير :

وهذا يبدأ عادة بالإشارة وهي وصف طبيعة الحالة ولحظة بسيطة عن

القضية ومن ثم الإشارة الى التقارير والمعاينات السابقة وبعد ذلك وصف المعاينة الحالية ونتائج الفحوصات المخبرية والشعاعية والحالة الصحية الراهنة وهنا علينا تحري الدقة في وصف الاصابات من حيث طبيعتها ونوعها وشكلها وابعادها وموقعها والأداة المسببة لها .

٣- نتيجة التقرير :

وهنا يتم تلخيص نتائج المعاينة وما ترتب على الحالة من شفاء تام أو تخلف عاهة جزئية دائمة أو تقدير مدة التعطيل .

ويقصد بمدة التعطيل : هو المدة التي يتعطلها شخص ما عن ممارسة أعماله الاعتيادية اليومية نتيجة اصابته بأضرار جسدية وما ينتج عنها من مضاعفات .

وكثير من الناس يخلطون بين مدة التعطيل والمدة التي تحتاجها الاصابة للشفاء أو الإجازة المرضية وهنا لا بد من التوضيح أن مدة التعطيل لا تساوي مدة الشفاء أو الإجازة المرضية، فكثير من الاصابات تحتاج مدة زمنية للشفاء اطول من مدة التعطيل، وكذلك مدة التعطيل لا تقتصر على الاشخاص العاملين وإنما يتم تقديرها كذلك لصغير السن وحتى الرضيع الذي لا يعمل وللشباب الطالب والعامل والشيخ الكبير والمتقاعد لذلك فهي لا تعني الإجازة المرضية والتعطيل عن الوظيفة .

ويعتمد تقدير مدة التعطيل على اسس علمية طبية وهي :

- ١- نوع وطبيعة الاصابة .
- ٢- مكان الاصابة ومدى اعتماد الشخص على العضو المصاب .
- ٣- طريقة معالجة الإصابة .
- ٤- طبيعة عمل المصاب .
- ٥- عمر وجنس المصاب .

وهنا أورد أن أورد بعض الأمثلة على هذه الأسس العلمية فمثلاً :

• إذا أصيب شخصان أحدهما بجرح سطحي في الساعد والآخر أصيب بكسر في الساعد فإن مدة التعطيل تكون حسب طبيعة الإصابة ونوعها عند الشخص الثاني أطول من الأول .

• وإذا أصيب شخصان بنفس نوع وطبيعة الإصابة مثل كسر في الساعد والاثنان من نفس العمر والوظيفة ولكن أحدهما أصيب في الساعد الأيمن والآخر بالأيسر وعلى فرض أن الاثنان إيمان فإن مدة التعطيل وحسب مدى اعتماد الشخص على العضو المصاب تكون أطول عند الشخص المصاب بكسر في الساعد الأيمن .

• إذا أصيب ثلاث اشخاص بكسر في عظم الفخذ الأيمن مثلاً وتم معالجة الأول بطريقة الشد والثاني بالجبس والثالث بإجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر بواسطة صفيحة معدنية وبراعي فإن مدة التعطيل تعتمد على طريقة المعالجة وهي أطول عند الأول ثم الثاني وأخيراً الثالث أقل من الاثنان .

وبالنسبة لعلاقة مدة التعطيل بالقانون فقد نصت المادة (٣٣٣) من قانون العقوبات (قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠) على أن (كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيدائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً عوقب بالجبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات) .

كما نصت المادة (٣٣٤) من نفس القانون على أنه :

١- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزيد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالجبس مدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكليتا العقوبتين .

٢- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته عن العشرة أيام فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيًا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام .

وقد يتخلف من الإصابة حدوث عاهة دائمة وهذه العاهة قد تكون جزئية أو كلية .

وقد عرف القانون العاهة الدائمة في نص المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وهي :

إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل، او تسبب في تشويه جسيم او أية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات .

وعلى الطبيب ان يتحرى الدقة في الفحص وان يستعين بخبرات الأطباء الآخرين في مختلف الاختصاصات للوصول الى نتيجة نهائية في موضوع العاهة الدائمة فيقوم الطبيب بتحويل المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية عن طريق الجهة المختصة لتقرير نسبة العجز وبعد ان يثبت مدة التعطيل .

أنواع التقارير الطبية القضائية :

تقسم التقارير الى عدة انواع وتختلف أهمية كل تقرير عن الآخر وأهم هذه التقارير ما يلي :

أ- التقرير الطبي القضائي الأولي : ويصدر هذا التقرير الطبي عادة عن الطبيب المعالج او طبيب الإسعاف وهو أول طبيب يتعامل مع الحالة ويستقبلها. فيقوم الطبيب بوصف الاصابات وتقييم الحالة العامة للمصاب ولا يغلق هذا التقرير بمدة تعطيل او بنتيجة الحالة مستقبلاً . لذا تكمن أهمية هذا

التقرير في حفظ حق المصاب بإقامة دعوى أو اسقاطها مبدئياً من حيث الحق الشخصي . إلا ان رجل الأمن لا يستطيع وقف الدعوى أو القضية وإنما يجب عليه تحويلها الى المحكمة المختصة ولا تستطيع المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى أو اسقاطها ايضاً حتى ولو تم التنازل عن الشكوى واسقاط الحق الشخصي كون التقرير ما زال مفتوح ولم يبين مدة التعطيل حتى يبين للمحكمة فيما اذا كان هناك حق عام أم لا .

ب- التقرير الطبي القضائي اللاحق : وهذا التقرير عادة يصدر عن الطبيب الشرعي بعد ان يطلع على التقرير الطبي الأولي ويستند اليه وبعد ان يقوم باستشارة الأطباء المعالجين من ذوي الاختصاصات المختلفة المتعلقة بالحالة وكذلك بعد الاطلاع على تقارير الأشعة والصور الشعاعية وتقارير المختبر، يقوم بمعاينة المصاب ويدون بعد ذلك ملاحظاته حول الحالة ويقوم بتنظيم تقرير طبي يشير فيه الى كل التقارير السابقة ذكرها ويذكر فيه نتيجة معانيته للمصاب وينسب إعادة معانيته ثانية على ضوء ما يحتاجه من استشارات اخرى من الأطباء المعالجين مشيراً في نهاية التقرير على أن المدة اللازمة لإعادة معاينة المصاب تحتسب من مدة التعطيل أم لا أي عليه أن يذكر عبارة (مع التعطيل عن العمل خلالها، ومع عدم التعطيل عن العمل خلالها) . وأهمية هذا التقرير هي تلخيص الحالة وتثبيت الحالة الصحية الراهنة للمصاب مما يعطي الجهة القضائية المختصة فكرة عن طبيعة الاصابات ومدى خطورتها على حياة المصاب وتأجيل القضية الى موعد لاحق .

ج- التقرير الطبي القضائي القطعي (النهائي): هذا التقرير لا يصدر إلا عن الطبيب الشرعي وبعد أن يقوم بمعاينة المصاب وتبين له أن الحالة الصحية قد استقرت اما بالشفاء أو توقع الشفاء بدون مضاعفات أو بتخلف عاهة دائمة جزئية أو كلية .

وهنا يقوم الطبيب بالإشارة الى كل التقارير السابقة بالأرقام والتواريخ ونتائج الفحوصات المخبرية والشعاعية ونتيجة المعاينة الطبية النهائية ثم يقوم بعد

ذلك بتقدير مدة التعطيل عن العمل ويختم التقرير الطبي بالتوقيع عليه أو يشير في نهاية التقرير الي تخلف عاهة وينسب الى الجهة المختصة، إحالة المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية لتقدير نسبة العجز .

وللتقرير الطبي القطعي او النهائي أهمية كبرى بالنسبة للجهة القضائية المختصة وتتلخص أهميته فيما يلي :

- ١- بيان وجود الحق العام من عدمه في القضية .
- ٢- بيان الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية .
- ٣- بيان شدة الخطورة والحالة النهائية العامة للمصاب .
- ٤- تمكين القاضي من اتخاذ قرار اعلان ختام المحاكمة .
- ٥- يمكن استخدامه لغايات حقوقية بعد ذلك لتحصيل البالغ المستحقة من التأمين أو الضمان الاجتماعي أو أي جهة أخرى ملزمة بالدفع .
- ٦- يمكن استخدامه لإقامة دعوى حقوقية بقيمة الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت فيه الاصابات .

د- التقرير الطبي القضائي في حالات الكشف عن الجرائم الجنسية : وهذا النوع لا يختلف عن التقارير الطبية السابقة من حيث الشكل والتقسيم وإنما يتم التركيز فيه على نوعية الكشف المطلوب ويشير الطبيب في بدايته الى الجهة ذات العلاقة ونوع الفحص المطلوب وكذلك عليه ان يدون بعض الملاحظات مما يسمع من المعتدى عليها ثم بعد ذلك يقوم بوصفها بدقة ذاكرةً درجة الوعي والتركيز والحالة العقلية وطريقة حديثها وفيما اذا كان عمرها يناسب جسمها وبعد ذلك يقوم بوصف الملابس من حيث شكلها وطريقة لباسها بالوضع الطبيعي على الجسم أم غير ذلك وفيما اذا كان عليه آثار لعلامات شدة وعنف من تمزق أو بقع دموية أو بقع منوية أو شعر أو تراب وأية مادة أخرى يشاهدها الطبيب على الملابس جميعها ثم يقوم بعد ذلك بوصف المعاينة الطبية لجميع

انحاء جسم المعتدى عليها ويذكر جميع الاصابات التي يشاهدها من حيث طبيعتها ونوعها ومكانها والأداة المسببة لها وعمرها . ويصف بعد ذلك الاعضاء التناسلية فيما اذا كانت طفولية غير ناضجة أو بالغة ناضجة مكتملة النمو وإذا كانت هناك اية تشوهات خلقية عليه أن يصفها ويصف جميع الاصابات او علامات الشدة والعنف التي يشاهدها ويصف غشاء البكارة وصفاً دقيقاً تفصيلياً من حيث نوعه وشكله وسماكته وعمقه وارتفاعه ويصف حوافه وقطر الفتحة وفيما اذا كان سليم أم ممزق وإذا كان هناك تمزق عليه أن يبين فيما اذا كان التمزق قديماً أو حديث ويصف مكان التمزق بالنسبة لميناء الساعة فيقول مثلاً (هناك تمزق قديم على الساعة الخامسة والساعة السابعة من ميناء الساعة) ثم يذكر بعد ذلك فيما اذا تم أخذ مسحات مهبلية أو شرجية والجهة التي استلمتها مع العينات الأخرى المضبوطة اذا كان هناك أية أدلة مادية أخرى تم ضبطها من الملابس او من الجسم كالشعر وغيره ويذكر كذلك الجهة المرسلة اليها ويضع بالنتيجة ملخص الحالة وفيما اذا كانت سليمة أم لا ويختتم التقرير .

ان أي تقصير من قبل الطبيب في تدوين اي من مشاهداته او مما تم شرحه سابقاً في تقريره الطبي يجعل التقرير في موقف ضعف وعرضة للتشكيك من قبل الدفاع وعدم الأخذ به وبالتالي ضياع الحقيقة ومن حق الدفاع ان يستدعي الطبيب منظم التقرير ويناقشه ويستوضح منه بعض الأمور التي يرى أنها من مصلحة موكله كما ان هيئة المحكمة والادعاء لها الحق في ان تستوضح من الطبيب بعض الأمور التي تخدم القضية وتحقق العدالة .

هـ- تقارير الكشف على حالات السكر : ان هذا النوع من التقارير غالباً ما ينظم من قبل طبيب الطوارئ والذي يقوم بالكشف على الحالة وهنا على الطبيب ان يقوم بمعاينة المفحوص بدقة وأن يستثني بداية وجود أية اصابات أو أمراض تؤدي الى نفس الأعراض والملاحظات وبعد استثنائها عليه التأكد من رائحة الكحول من فم المفحوص ويجري الفحص اللازم

لحالات السكر وان يقوم بأخذ عينة دم بإرسالها الى المختبر لقياس والاثبات أولاً وجود الكحول في الدم ونسبته ان وجد .

وعلى الطبيب عند أخذ العينة ان ينتبه الى عدم استعمال الكحول كمادة معقمة مكان الإبرة ويستعيز عنها بأية مادة معقمة اخرى وعليه أن يملأ زجاجة العينة بالكامل حتى لا يتطاير الكحول منها وأن يحفظها جيداً في الثلجة لحين ارسالها وأن يرسلها بأسرع وقت ممكن .

وفي نتيجة التقرير يوضح الطبيب الحالة العامة للمفحوص وفيما اذا كان متمالك لقواه العقلية والجسدية وفيما اذا كانت حالته تسمح بإعادته مع رجال الأمن وإذا كانت حالته تستدعي الاسعاف والمعالجة بنسب التسمم للكحول فعلى الطبيب ان يذكر ذلك وأن ينسب ادخاله المستشفى حتى يرفع المسؤولية عن نفسه .

و- تقارير الكشف على حالات الوفيات : هذه التقارير تتعلق بحالات الكشف والتشريح للوفيات القضائية ويقوم الطبيب الشرعي عادة بتنظيمها وهي لا تختلف عن غيرها من التقارير من حيث الشكل والمضمون إلا في بعض الأمور مثل كتابة اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وتاريخ الكشف واسم الشخص المعرف على الجثة وذلك في ترويسة التقرير ثم يبدأ التقرير بالإشارة وهنا يشير الطبيب الى المدعي العام الذي طلب منه ايقاع الكشف والتشريح ويذكر اسم المدعي العام والتاريخ وساعة الوفاة وساعة الكشف ولحظة بسيطة عن ظروف الوفاة كما سمعها من المدعي العام بعد ذلك يقوم بالكشف الظاهري على الجثة ويصف حالة الجثة من الخارج ويبدأ عادة بالملابس فيصفها وصفاً دقيقاً وجيداً ثم بعد ذلك يقوم بوصف علامات الوفاة المتأخرة والمدة التي مضت على الوفاة تقريباً ويصف الإصابات والعلامات المرضية والتفريعات التي يشاهدها على ظاهر الجثة من الخارج بشكل دقيق كما ذكرنا ذلك في حالات الكشف على الاحياء بعد ذلك يقوم بوصف التشريح ويبدأ عادة من الرأس فيصف فروة الرأس من الداخل وعظام الجمجمة والدماغ وقاعدة الجمجمة ثم

يصف العنق من الداخل بجميع اجزائه ومحتوياته من عضلات وأنسجة وأوعية دموية وأعصاب وعظام العنق والغضاريف بدقة ثم يقوم بعد ذلك بوصف الصدر من الداخل ويبدأ من العضلات والأضلاع حتى يصل التجاويف الصدرية ومن ثم أحشاء الصدر كل جزء منه بالتفصيل ثم ينتقل بالوصف الى البطن فيصف عضلات البطن من الداخل وتجاويف البطن وأحشاء البطن كل عضو على حدة من حيث الشكل والتغيرات الإصابية او المرضية والوزن وغير ذلك .

بعد ذلك يصل الى نتيجة التقرير وهنا يقوم بتلخيص مجمل الاصابات التي شاهدها ومواقعها والأداة المسببة لها وفيما اذا كانت اكثر من واحدة تعطي نفس النتيجة ويذكر في نهاية التقرير سبب الوفاة ويختتمه بالتوقيع عليه وكتابة اسمه بطريقة واضحة ومفتوحة.

«الوحدة الثانية»
الاستعراف

- ١- التعريف وأهم الوسائل العلمية للإستعراف .
- ٢- انواع الاستعراف .
- ٣- البصمات .
- ٤- الاستعراف على الجثث .
- ٥- الاستعراف على العظام .
- ٦- تحديد الجنس .
- ٧- تقدير العمر .
- ٨- تحديد القامة .
- ٩- البصمة الوراثية DNA Finger Printing .

الاستعراف على الأحياء والجثث والأشلاء المختلفة

الاستعراف :

هو التعرف على هوية الانسان الحي والميت سواء وجد كاملاً أو وجدت بقاياه بالطرق والوسائل العلمية .

وتكمن أهمية الاستعراف في ايجاد ما يستدل من آثار مادية على وجود علاقة بين المجني عليه والجاني وبينهما من جهة وبين مسرح الجريمة أو مكان الحادث وبين الاداة والسلاح المستخدم من جهة أخرى .

وكذلك في حالات ادعاء الأبوة وانكارها وفي حالات الكوارث الجماعية مثل حوادث الطيران والقطارات والزلازل وغيرها .

وأهم الوسائل العلمية والآثار المادية التي يشملها هذا الفصل .

١- هل هي لإنسان أم حيوان، وهل هي لإنسان واحد أو أكثر .

٢- تحديد الجنس .

٣- تحديد العمر .

٤- مقارنة قياس طول جسم الانسان أو تقدير طوله .

٥- مقارنة بصمات الأصابع وراحة اليدين وباطن القدمين .

٦- مقارنة الشعر في مختلف مناطق الجسم .

٧- لون العيون وما فيها من عدسات صناعية أو لاصقة أو أمراض .

٨- وجود أمراض معينة مميزة .

- ٩- وجود ندب أو تشوهات خلقية أو مكتسبة أو كسور أو عمليات جراحية سابقة أو علامات فارقة .
- ١٠- قياس القدم لمعرفة قياس الحذاء .
- ١١- نوع الدم وفصيلته .
- ١٢- الملابس ومحتوياتها .
- ١٣- الصور الشخصية .
- ١٤- فحص البصمات الجينية أو الشيفرة الوراثية (Dna Finger Printing)

ماهية الاستعراف :

هي مجموعة علامات وأوصاف ومميزات تميز شخص معين عن سواه مدى الحياة ويقسم الاستعراف الى أربعة انواع .

أنواع الاستعراف :

١- الاستعراف الجنائي :

وهذا النوع من الاستعراف هو من اختصاص الأمن العام ومكتب تحقيق الشخصية وغالبا ما يتم بواسطة بعض الصور والمقاييس الخاصة وبصمات الأصابع .

٢- الاستعراف المدني :

وهو تعرف بعض الشهود على شخص معين أمام المحاكم .

٣- الاستعراف الشخصي :

وهو تعرف بعض الأقارب والأصدقاء على شخص من الأحياء والأموات.

٤- الاستعراف القضائي :

وهو التعرف على جثة مجهولة ومعرفة صاحبها عن طريق الصفات المميزة الموجودة فيها . لذلك يتطلب الاستعراف عادة دوراً مشتركاً يتعاون فيه الأطباء مع رجال البحث الجنائي كما يتطلب أحياناً الاستعانة باختصاصات طبية معينة ذات خبرة في الموضوع مثل اختصاصي العظام والأشعة والأسنان وبالإضافة الى الاستعانة بقيود الملفات الطبية لدى الأطباء والمستشفيات .

الاستعراف الجنائي :

ويعتمد هذا النوع من الاستعراف على معلومات شخصية توضع في بطاقة الأحوال الشخصية وتشمل :

- ١- تفاصيل عن هيئة الشخص مثل لون الشعر والعينان والجلد والتقاطيع وشكل الأنف والأذن ... الخ .
- ٢- علامات فارقة مميزة قد تكون موجودة مثل الوشم والندب والوحمات ... الخ .
- ٣- مقاييس الجسم مثل - القامة، طول الذراعين، القامة في حالة الجلوس طول الرأس، عرض الرأس، طول الأذن اليمنى، المسافة بين الوجنتين، طول القدم الأيسر، طول الأصبع الأوسط والأيسر، طول الأصبع الخنصر الأيسر وطول الساعد الأيسر واليد .

البصمات :

وهي أهم وأوحد الطرق وأمثلها في الاستعراف الجنائي :
وتتكون البصمات عادة من تقاطع خطوط بارزة تفتح بها مسامات العرق بالجلد وتكون نماذج شخصية أي أنه لا توجد يدان متماثلتان تماماً .
وتبقى هذه ما دام الشخص على قيد الحياة وحتى بعد الموت قبل أن تتفسخ

الجثة ويلدوب الجلد ولا يمكن احداث تغير فيها إلا بإزالة طبقات الجلد وتوجد عادة في الجلد الخالي من الشعر .

وكل بصمة تعطي شكل مثلث يتكون من لقاء الخيوط ببعضها . ولبعض البصمات مثلثان أو أكثر وهناك بصمات لا توجد بها مثلثات على الإطلاق . والبصمات بشكل عام تقسم الى اربعة انواع او اشكال وأهمها :

١- القوسية : تمر الخيوط من أحد جوانب الاصبع الى الآخر دون انثناء او زاوية وتشكل ما نسبته ٧٪ من أنواع البصمات .

٢- الحلقيية : وتدر الخطوط في هذا النوع بشكل حلقي ومن الممكن ان تكون مائلة الى اليمين ونسبتها ٣٪ أو مائلة الى اليسار أي تمر الخطوط من اليمين الى اليسار ثم تعود لليمين مكونه زاوية وتشكل ما نسبته ٦٥٪ .

٣- الدائرية : وفي هذا النوع تدور الخطوط حول مركز في الوسط ونسبة هذا النوع من البصمات ٢٥٪ .

٤- المركبة : وتشمل على نوعين أو أكثر من الانواع السابقة وهي أقل من ٢٪ من النسبة العامة .

وطريقة أخذ البصمة تتم عادة بالضغط على منشفه بها نوع خاص من الاحبار ثم يطبع الاصبع على الورق واما بطبع الاصبع وجوانبه وذلك بتحريكه حركة دائرية أو نصف دائرية .

كيفية اظهار البصمات :

يتم اظهار البصمات عن الاثماء المختلفة بواسطة استخدام مساحيق مثل الجرافيت ثم يتم تصويرها فوتوغرافياً . ونذكر هنا أهم الاثماء التي يمكن اظهار البصمة عليها والمادة المستعملة في ذلك :

١- الأوراق : يتم اظهار البصمه على الأوراق بواسطة مسحوق ناعم من

اللاتيمون المطحون أو تنقع عليها ورقة نشاف مبللة بمحلول نترات الفضة بتركيز ١٠٪ ثم تعرض على الهواء العادي أو أشعة الشمس أو الأشعة البنفسجية .

٢- الأقمشة : ترش الأقمشة بمحلول نترات الفضة ١٠٪ ويضاف إليه حامض الخليك أو تنقع على التوالي بمحلول نترات الفضة ثم في محلول الخليك ثم تترك للجفاف في حجرة مظلمة .

٣- الأسطح المعدنية والجلود : يستعمل لهذه الأشياء مسحوق النحاس .

٤- الفواكه : يتم الكشف عليها باستعمال مسحوق كربونات الرصاص .

٥- الخشب : وهنا يستعمل مسحوق الزئبق .

٦- الزجاج : يملئ بحبر اسود أو أزرق ثم يصور فوتوغرافياً .

٧- بصمه بها أثر شحمي : تعرض لبخار اليود .

٨- البصمات المدמה : ويستعمل في هذا النوع مرشحات ضوئية أثناء التصوير . ويتم حفظ البصمات عادة بواسطة التصوير .

أو النقل على ورق سليولوزي (CELLULOID PAPER) أو كشافات معينة (SPECIAL STICKS) .

مقارنة البصمة والحكم عليها :

في مقارنة البصمات والحكم على أنها متماثلة أو أن نقول مثلاً بأن هذه البصمة تعود لفلان من الناس، يجب الحصول على (١٢) اثنا عشر نقطة تشابه بين بصمة الشخص والبصمة المقارنة حتى نستطيع القول بأن البصمتين لشخص واحد أو لنفس الشخص، ومن أهم التوافق ما يلي :

١- الاتفاق في النوع .

٢- الاتفاق في شكل الدلتا والزاوية .

٣- الاتفاق بالمركز .

٤- في السعة .

٥- وجود آثار لجروح أو إصابات .

٦- الصفات الفرعية للخطوط مثل بداية الخط أو نهايته . أو انحرافه أو تفرعه أو اندماجه في خط آخر، تكوين جزر في طريق الخطوط وغيرها .

وهناك حالات لا تفلح فيها مقارنة البصمات أو لا يصلح فيها أخذ البصمة أصلاً وذلك في بعض الأمراض كالجذام أو تصلب الجلد والحساسية الحادة (الأكزيميا) والمزمنة والحروق الشديدة والعميقة . وتحدث هذه الأمراض تقشراً في بشرة الجلد مما يغير شكل البصمة أو يزيل الخطوط الجلدية .

وهناك اختفاء مؤقت للبصمة نتيجة العمل باليدين في أعمال البناء والرخام والحداة وغيرها وتعود عادة بعد يومين إلى ثلاثة من التوقف عن العمل .

التحقق من هوية الشخص في حالة عدم وجود البصمات أو البطاقة

يعتمد على الوصف الدقيق للشخص المطلوب وبخاصة الأوصاف التالية:

١- مستوى الذكاء وطريقة الكلام ومستوى التعليم ونوع الملابس وغير ذلك (وكلها متغيرات) .

٢- شكل الوجه العام :

- مستدير، مثلث، مستطيل .

- الجبهة متسعة، ضيقة .

- الأنف زاوي، منحرف، أفطس .

- اتصال الأنف مع الجبهة قوسي، زاوي .
- فتحة الأنف شكلها، اتساعها، احتوائها على الشعر .
- الفم شكله، اتساع الشفتين .
- الشارب طوله، لونه، اللحية شكلها، طولها، لونها .
- الذقن شكله مدبب، عريض، مستوي الحافة أو مسنن .
- الأذنين شكلهما، حجمهما اتجاههما .

٣- شكل العينين :

ويشمل الجفنين من حيث الاتساع والاتجاه، معتدلة، متقلبة للداخل أو الخارج وأهداب الجفون طويلة أو قصيرة، غزيرة أو خفيفة سليمة أو مريضة، الحاجبين مفتوحة أو متصلة قوسية أو معتدلة .

الحدقة : عسلي، أسود، أزرق، أخضر .

القرنية : وجود عتامة عليها وشكلها وعلامات مرضية أو خلقية .

٤- شعر الرأس :

لونه وطوله، توزيعه وسماكة الشعرة الواحدة وجود القمل والصئبان وغير ذلك .

٥- الوشم :

وهي تلوين في الجلد بطريقة مكتسبة ولا يزول إلا بالجراحة ويجب ملاحظة شكله ولونه وموضعها .

٦- الوحمات والحسنات والتشوهات الخلقية :

وهذه قد تكون من العلامات المميزة والفارقة .

٧- الندب :

وهي الآثار التي تتخلف عادة عن الجروح ويجب ملاحظتها من حيث

الشكل خطية، أو عريضة أو مائلة أو منتظمة أو غير منتظمة أو ندب ناتجة عن الحروق .

الاستعراف على الجثث

الطبيب الشرعي يتعامل مع الكثير من حالات الوفيات القضائية وفي حالة الجثث المجهولة يمكن أن تعرض على الطبيب الشرعي بإحدى الأشكال التالية :

١- الجثث الحديثة :

وتكون هذه الجثث محتفظة بكل مظاهرها الخارجية والداخلية المميزة لها.

٢- الجثث المتعفنة :

وهي التي يكون مضى عليها فترة من الزمن وتختلف درجة التعفن حسب المدة التي مضت عليها وحسب البيئة التي وجدت بها والظروف الجوية المحيطة بها وفي هذه الحالات تكون بعض المميزات أو كلها قد ضاعت بسبب التعفن وهنا يحاول الطبيب أن يزيل آثار التعفن ويعيد الملامح والمميزات بالدرجة المناسبة لإجراء المقارنة مع مميزات اشخاص مفقودين .

٣- الأملاء :

وغالباً ما تكون جثث متقطعة الأوصال ويعثر عليها على فترات واشلاء متثرات في أماكن مختلفة وهنا يحاول الطبيب إعادة تكوين الجثة بوضع اجزائها المتقابلة مع بعضها البعض ويحاول إعادة بناء المميزات الخاصة .

٤- العظام :

وهنا يتم العثور على مجموعة من العظام من بقايا جثث الموتى وهذه

الحالة تحتاج الى جهد اكبر في تحديد العمر والجنس والطول وسبب الوفاة وغيره .

طريقة الاستعراف على الجثث :

يتم الاستعراف على الجثث الحديثة والمتعفة منها وذلك باتباع الوسائل العلمية التالية :

- ١- الجنس .
- ٢- الملامح .
- ٣- السن .
- ٤- الطول .
- ٥- الجنسية .
- ٦- البنية .
- ٧- علامات مميزة مثل الوشم والتدب والتشوهات الخلقية .
- ٨- حالة الأسنان محشوة، مخلوطة، جسور، أسنان صناعية .
- ٩- علامات خارجية بالجثة تدل على سبب الوفاة مثل وجود اصابات جروح طعنبة أو جروح اعيرة نارية وغيرها، من العلامات التي تبقى رغم المدة التي مضت على الوفاة وزمنها وظروف الجثة من وقت الوفاة .
- ١٠- في حالات الاناث يتم الكشف على غشاء البكارة وبيان حالته ويجب التحفظ على كل قطعه من الملابس ومحتوياتها وأي مرققات أخرى مع الجثة لأنها ذات أهمية كبيرة في الاستعراف وفي التحقيق.

الاستعراف على العظام :

يتم الاستعراف على العظام بعد جمعها ووضعها في مكان واحد وبعد أن تطرح التساؤلات التالية :

١- هل هي آدمية :

ويتم تحديد ذلك من خلال المشاهدة والمعرفة العلمية السابقة بالعظام
(EXTERNAL FEATURES).

ومن خلال اجراء فحص الترسبات المخبري على العظم وهو ما يسمى
(Precipitain Test) أو (Bone Fragment Test).

٢- المدة التي مضت على الوفاة :

ويعتمد ذلك على ظروف التحلل والظروف التي كانت الجثة متواجدة فيها - فهل كانت الجثة مدفونة أو على السطح بالهواء أو بالماء .
الظروف الجوية من حرارة ورطوبة وغيرها .

فالجثث في الهواء تتحلل بشكل أسرع من الجثث الموجودة بالماء وفي كلتا الحالتين تكون أسرع من الجثث المدفونة بالتراب ويتم تحلل الأنسجة الرخوة أولاً وبعد تحللها وغياها فإن الغضروف يبقى على السطح المفصلي وكذلك الأربطة ثم بعد ذلك تتحلل وتبقى العظام .

٣- هل هي لشخص واحد أو أكثر :

ويتم معرفة ذلك من خلال تكرار بعض العظام أو عدم تطابقها أو اختلاف حجمها ومنها .

٤- تحديد جنس المتوفي .

٥- تحديد العمر عند الوفاة : السن الذي بلغه الشخص المتوفي عند وفاته.

٦- تحديد طول الجثة أو الجسم .

٧- تحديد النوعية أو الجنسية : هل هي لإفريقي زنجي أو أبيض أو أصفر .

٨- تحديد سبب الوفاة :

كأن يتبين وجود كسور بالعظم أو سموم مركزة بالعظم أو اثار
لأعيرة نارية أو مرضية .

تحديد الجنس في الاستعراف :

ان لتحديد الجنس في الاحياء أهمية كبيرة وتتلخص أهمية تحديد الجنس
فيما يلي :

١- الميراث والزواج .

٢- التعليم .

٣- حقوق التصويت .

٤- الخدمة العسكرية .

ويتم تميز الجنس عادة من المظهر الخارجي أولاً ومن الملابس والملامح
والصوت وطريقة المشي وتتميز كذلك من وجود الخصيتين عند الذكر
والمبيضين عند الأنثى وافرازات السائل المنوي وحصول الحيض وتثار كذلك
مسألة تحديد الجنس في حالات معينة مثل :

١- التخنث الحقيقي :

وتكون الغدد الذكرية والأنثوية موجودة وهذا نادراً جداً ولكنه ممكن .

٢- التخنث العادي :

ويكون هناك تشوه كبير في تكوين الأعضاء التناسلية بحيث يصعب
التحقق منها، فيكون القضيب عند الذكر صغيراً ومسدوداً ويشبه البظر
المتضخم . ولا تتدلى الخصيتين ويبقى الصفن مشقوقاً فيظهر على شكل
شفرتين .

ويتم تميز الجنس عادة من خلال :

- ١- في سن البلوغ وذلك حسب خروج المني أو حصول الحيض .
 - ٢- التركيب الجسماني العام مثل هيئة الكتفين واستدارة المنكبين والردفين .
 - ٣- طريقة نمو الشعر بالعانة والوجه .
 - ٤- الصوت : يكون رفيع عند الإناث وخشن عند الذكور .
 - ٥- نمو الثديين عند الإناث .
 - ٦- في حالات الوفيات يتم تحديد الجنس من خلال التشريح :
 - وجود مبيضين أو خصيتين .
 - فحص الثديين والعانة .
 - وجود الرحم والرحم يقاوم التعفن عادة ويتأخر بالتحلل .
- ويمكن تحديد الجنس والتفريق بين الذكر والأنثى اعتماداً على العظم ويتوقف تحديد الجنس في هذه الحالة على كمية العظم المتوفرة من الجثة .
- فمثلاً بواسطة (عظام العانة، الورك) نستطيع تحديد الجنس في ٩٠٪ من الحالات العادية من البيض و ٨٣٪ في الجنس الزنجي .
- وأكثر ما يكون قريباً إلى الدقة في تحديد الجنس من خلال عظام الحوض وأهم المميزات في عظام الحوض .
- ١- التواء في جدران الحوض تكون أكثر بروزاً عند الرجل وأقل ظهوراً عند الإناث .
 - ٢- ارتفاع العظم في الإناث أقل .
 - ٣- المسافة بين العرفين الحرقفيين (Iliac Crest) أقل في الإناث عنها عند الرجال بحوالي ١٠ ملم (٢٧٣ ملم في الإناث) .
 - ٤- المسافة بين الشوكتين الحرقفيين العلويين (Antro-Superior Iliac Spine) أعلى عند الإناث . وتبلغ (٢٥٠ ملم) .

- ٥- القوس العاني في الإناث (Pupic arch) أوسع وأكثر استدارة .
- ٦- تقوس العرف الحرقفي (Iliac crest) يبلغ مستوى اعلى وأكثر ظهوراً في الذكور .
- ٧- الشرم العظيم الوركي (Greatum Sciatic Notch) أوسع كثيراً في الإناث ويكون زاوية قائمة تقريباً وفي الذكور يكون ضحل وتتدلى نهايته الخلفية لأسفل فيكون زاوية حادة كثيراً ويكون عميق وضيق وهذه العلامة من أكبر وأكثر العلامات فائدة في تحديد الجنس .
- ٨- جسم العانة (Body of Pubis) أعرض وأقل تحوراً في الإناث والفرع النازل منه يبدأ في الحافة الوحشية لجسم العظم ويعطي شكلاً قرنفلياً في الإناث وأما في الذكور فيظهر كجزء من جسم العظم . ويكون جسم العانة صغيراً مثلث الشكل في الذكور . ومربع في الإناث .
- ٩- الثقب المسدود (Obturate Foramen) :
يكون مثلث الشكل والقاعدة متجهة الى الأمام في الإناث أما في الذكور فيكون بيضاوي وقاعدته لأعلى .
- ١٠- الحفرة الحقية : (Acetabulum) تكون أضيق في الإناث .
- ١١- العجز (Sacrum) يكون أقصر وأوسع في الإناث ويكون التقوس في نصفه العلوي يكاد ويكون مستقيماً والتقوس أوسع في النصف السفلي وأما في الذكور فالتقوس يكون متساو تقريباً في نصفيه والعجز طويل وضيق متجانس الإنحناء .
- ١٢- السطح المفصلي للحرقفة يمتد الى الفقرة الثانية في العجز في الإناث والى الفقرة الثالثة في الذكور .

عظم القص :

يتميز عادة في الذكور بأن جسمه دائماً أكبر من ضعف قاعدته وعلى العكس في الإناث يكون طول جسمه أقل من ضعف طول قاعدته .

الفك السفلي :

يميل إلى الشكل المربع في الذكور وقوسي في الإناث .

المفاصل :

وخاصة المفاصل الكروية السطح المفصلي كبير في الذكور وصغير في الإناث .

عظم الجمجمة :

وله أهمية كبيرة في تحديد الجنس مثل عظم الحوض وأهم الميزات فيها ما يلي :

- ١- الجمجمة في الأنثى تكون عادة أصغر .
- ٢- الأقواس الجانبية في الإناث تكون أقل ظهوراً والخافة حادة وأدق .
- ٣- الاتصال بين العظمتين الأنفية والجبهة أقل نمواً في الإناث والقوس الممتد من الجبهة للعظمتين الأنفيتين يكاد يكون مستقيماً في الإناث وأما في الذكور فيكون متخسفاً ويشكل زاوية ظاهرة عند الإتصال .
- ٤- التوءات اللقمية للمؤخرة (Condylod process) قصيرة وعريضة في الإناث وطويلة وضيقة في الذكور .
- ٥- مواضع اندغام العضلات بقاعدة الجمجمة واضحة وخشنة في الذكور .

وفي الجدول التالي نبين أهم الفروقات وسهولة حفظها وتطبيقها عملياً :
جدول رقم (١) (الفرق بين الذكر والأنثى في عظم الجمجمة)

الأنثى (Femal)	الذكر (Male)	الجزء العظمي
- ملساء	- بارزة	الحذبة الجدارية Parietal Eminces
- غائبة أو غير بارزة	- بارزة	- الحروف الحاجبية Superciliary Riges
- قوسي	- زاوية	الاتصال الأنفي الجبهي (Frunto-nasal-junction)
- قصير وصغير وناعم	- طويل وخشن	النمىء الحشائي (Mastoid Process)
السطح	السطح	- اللقمة القذالية (Occipital Condyles)
- قصيرة وعريضة	- طويلة وضيقة	

تحديد الجنس من الشعر :

١- شعر العانة :

في النساء ينتهي بخط محاذ للفرعين الصاعدين للعظم العاني، وفي الذكور يميل الى الامتداد نحو السرة .

٢- شعر الرأس :

يكون في النساء أنعم وأطول .

٣- شعر الوجه :

في الرجال يكون عادة موجود ولا يوجد في النساء إلا في حالات مرضية .

٤- شعر الصدر والجسم :

في الذكور ينمو الشعر على الصدر والظهر والأطراف بشكل واضح وكثيف .

تقدير العمر :

ان تقدير العمر له أهمية كبيرة في نواحي الحياة المختلفة ويعتمد عادة على الأساليب والطرق العلمية وله كذلك أهمية في تحقيق الشخصية وفي الحالات التي لا يوجد فيها شهادة ميلاد .

١- عند عقد الزواج :

وخاصة عند الإناث إذ يمنع القانون زواج الفتاة تحت سن الرابعة عشرة .

٢- عند تحديد المسؤولية الجنائية :

وقد ذكرنا ذلك في موضوع المسؤولية والمسؤولية الناقصة . وهناك أحكام لا تنفذ ولا يحكم فيها الحدث .

٣- عند دخول المدرسة أو الانتقال من مرحلة الى مرحلة .

٤- في حالات التجنيد العسكري ودخول الجيش .

٥- عند التسجيل في جداول الناخبين .

٦- عند التقدم لوظيفة حكومية وكذلك عند التقاعد .

٧- عند بيع عقار أو أموال غير منقولة .

٨- عند الطلاق في تحديد الرعاية للأطفال . فالأولاد يقعون في حضانة الأم حتى سن التاسعة والإناث حتى سن الحادية عشرة .

٩- في حالات الإرث الشرعي والوصاية .

١٠- في حالات الإجهاض وقتل الوليد واختفاء الولادات يتم تقدير عمر الجنين . وتقدير العمر يمتد من الأشهر الرحمية الأولى وحتى سن متقدم يصل الى أكثر من ٨٠ سنة ولا يعتبر بسيط مثل تحديد الجنس . ويتم تقدير العمر في مراحل النمو المختلفة (الرضاعة، الطفولة، الشباب، الشيخوخة) وقد توافق أو تختلف مع مراحل برنامج زمني محدد لأنها تختلف حسب الجنس والبيئة والتغذية والسلالة وغيرها .

وتعتمد الدقة في تقدير العمر على كمية أجزاء الهيكل العظمي في الأموات .

وأهم الوسائل والطرق المتبعة في تحديد العمر تعتمد على ما يلي :

١- تقدير العمر من طول العظم :

- لغاية توقف الزيادة في طول العظم تكون العظام الطويلة دالة على مرحلة النمو، وتمتد من خمسة شهور رحمية الى مرحلة البلوغ وتوقف الزيادة في الطول، وكلما زاد العمر كلما قلت الدقة في تقدير العمر بهذه الطريقة لتداخل عوامل أخرى وتعتبر هذه الطريقة جيدة في الحالات التي يتوجب فيها تحديد العمر لهيكل عظمي غير بالغ وبدون جمجمة .

٢- تقدير العمر من ظهور مراكز التعظم :

- وفي مثل هذه الحالة يجب أن يكون هناك بقايا من الأنسجة لتحافظ على العظم وما به من مراكز تعظم والكراديس والجماخر حتى نتمكن من عمل صور أشعة وتعتبر هذه الطريقة الأمثل في حالات الأطفال كلاً كان أصغر سناً .

الجدول رقم (٢)

وأهم نوى العظم وظهورها حسب العمر يمكن اجمالها بالجدول التالي :

« مراكز التعظم وظهورها حسب العمر »

العمر	مراكز أو نوى التعظم
١. ٥-٦ شهور رحمية	- التعقب (Oscalcis)
٢. ٧ شهور رحمية	- الكعب (Astragalus)
٣. عند الولادة نهاية الحمل	- العظم الزندي
	- الطرف السفلي لعظم الفخذ .
	- الطرف العلوي للقصبة .
٤. السنة الأولى	- الأسفيني الخارجي
	(Extremenal Caneifor)

٣- تقدير العمر من الأسنان :

- ان الاعتماد على الأسنان وحدها في تقدير العمر ليس ذو فائدة كبيرة وإنما يجب أن تتماشى مع الطرق والأساليب الأخرى . وذلك ان بزوغ الأسنان يعتمد على متغيرات عديدة وقد يصل الرضيع الى سن العام الواحد بدون أسنان ويعتمد ذلك على متغيرات أخرى مثل :

١- عدم إكمال النمو .

٢- الجنس .

٣- التغذية .

٤- الأمراض .

٥- الوراثة .

والأسنان تقسم الى نوعين حسب الظهور الأسنان المؤقتة (الحليب)، والأسنان الدائمة والاعتماد على الأخيرة أكثر فائدة منه بالأولى وتفيد في حال توفر الهيكل العظمي كاملاً .

١- اسنان الحليب المؤقتة :

تبدأ بالظهور عادة في الشهر السادس من العمر ويكتمل ظهورها في السنة الثانية من العمر وعددها الكامل عشرون سنّاً عشرة اسنان في كل فك وناب وضواحك وعددها اثنان في كل جهة .

والجدول التالي يبين ظهورها حسب العمر :

جدول رقم (٣)

ظهور اسنان الحليب حسب العمر

الأسنان	العمر	المتوسط
١ . القواطع الوسطى السفلية	٦-٨ أشهر	٦ أشهر
٢ . القواطع الوسطى العلوية	٧-٩ أشهر	٩ أشهر
٣ . القواطع الجانبية	٨-١٠ أشهر	٩ أشهر
٤ . الأنياب	١٦-٢٠ شهر	١٨ شهر
٥ . النواجذ الأمامية	١٢-١٦ شهر	١٢ شهر
٦ . النواجذ الخلفية	٢٠-٣٠ شهر	٢٤ شهر

٢- الأسنان الدائمة :

وتبدأ بالظهور عادة في السنة السادسة من العمر ويستمر ظهورها حتى تكتمل الى سن الخامسة والعشرون وعددها ستة وثلاثون سنّاً تقسم على النحو التالي :

سنة عشر سنًا في كل فك، ثمانية في كل جهة وكل جهة تحتوي على قاطعان أماميان وناب واحد وضاحكان وثلاثة طواحن بالخلف ومجموعها ثمانية .

والطواحن الدائمة الأولى تبرغ بانتظام في السنة السادسة على وجه التقريب والثانية الوسطى تبرغ في السنة الثانية عشرة تقريباً وأما الثالثة الخلفية وتسمى طواحن العقل فهي شاذة ولا يعتمد عليها .

وفي الجدول التالي نبين العمر بالنسبة لظهور الأسنان الدائمة :

جدول رقم (٤)

الأسنان الدائمة	العمر للظهور
١. الطواحن الأمامية	٦ - سنوات
٢. القواطع الوسطى	٧ - سنوات
٣. القواطع الجانبية	٨ - سنوات
٤. النواجذ (الضاحك) الأمامية	٩ - سنوات
٥. النواجذ (الخلفية)	١٠ - سنوات
٦. الأنياب	١١ - سنة
٧. الطواحن الوسطى	١٢ - سنة
٨. الطواحن الخلفية (العقل)	١٧ - ٢٥ سنة

وتتميز الأسنان المؤقتة الحليب عن الأسنان الدائمة من خلال مشاهدتها فالأسنان الدائمة تكون القواطع اسمك وأقوى وأعرض من قواطع اللبن وخاصة في الفك الأعلى ولونها أبيض عاجي .

ومع انتهاء ظهور القواطع الدائمة يحدث ما يلي :

- ١- بداية اتحاد القطع الأمامية مع بعضها .
 - ٢- اتحاد الجزء القاعدي والجزء الوحشي للعظم القذالي .
- أما بالنسبة لتقدير العمر حسب مراحل النمو المختلفة فتتم على النحو التالي :

١- تقدير العمر في مرحلة الرضاعة :

يتم تقدير العمر في هذه المرحلة من النمو حسب العلامات التالية :

أ- سقوط الحبل السري :

ويتم عادة في خلال الأسبوع الأول من الولادة بعد خمسة الى سبعة ايام بواسطة التغيرات التي تحدث في الحبل السري .

ب- متوسط الوزن عند الولادة :

- في الذكور يكون ما بين ٣-٣,٥ كيلو غرام .

- في الإناث يكون ما بين ٢,٥-٣ كيلو غرام .

ج- النمو الفيزيائي وحركات الطفل مثل الجلوس وغيرها :

حيث يتضاعف وزن الطفل في سن الستة شهور ويزداد الى ثلاث اضعاف في السنة الأولى من العمر ويتضاعف أربع مرات في السنة الثانية .

د- ظهور أسنان الحليب :

(انظر الجدول رقم (٣)).

هـ- ظهور مراكز التعظم :

وتظهر مراكز التعظم في الإناث مبكرة قليلاً عن الذكور ومراكز التعظم في الفخذ والأطراف السفلى للكمبرة والقصبية تظهر في السنة الأولى في الإناث ولا تظهر في الذكور إلا في السنة الثانية (انظر الجدول رقم ٢) .

٢- تقدير العمر في مرحلة الطفولة :

يتم تقدير العمر في مرحلة الطفولة من السنة الثانية وحتى الخامسة عشر من عمر الطفل (من تمام ظهور أسنان الحليب وحتى سن البلوغ) ويعتمد تقدير العمر في هذه المرحلة على ما يلي :

١. مراكز التعظم .
٢. الالتحام العظمي فعظمي الجبهة تلتحمان وتكونان عظماً واحداً في حوالي السنة الثالثة من العمر والفرع السفلي بعظم العانة يلتحم بفرع عظم الورك في حوالي السنة السادسة أو الثامنة .
٣. الأسنان الدائمة :

وتبدأ بالظهور في حوالي السنة السادسة ما عدا اسنان او أضراس العقل فتظهر في المرحلة التالية .

٣- تقدير العمر في مرحلة الشباب والبلوغ :

وتبدأ هذه المرحلة من بلوغ الحلم الى اكتمال النمو (من سن ١٢-٢٥ سنة) .

والبلوغ عند الإناث يكون قبل الذكور بعام او عامين تقريباً وعلامات البلوغ في الإناث تبدأ في الظهور في سن ما بين ١١-١٣ سنة وهي :

١. استدارة المنكبين والردفين .
٢. كبر الثديين ونموهما .
٣. ظهور الدورة الحيضية الشهرية .
٤. ظهور شعر العانة والإبط .

وأما علامات البلوغ عند الذكور فتبدأ عادة بالظهور في سن ما بين ١٢-١٤ سنة وهي :

١. خشونة الصوت .
٢. ظهور الشارب واللحية .
٣. كبر القضيب .
٤. ابتداء الإنماء .
٥. نمو شعر العانة والإبط .

وهناك أسباب مرضية قد تعجل أو تؤخر ظهور البلوغ :

ويتم تقدير العمر في مرحلة الشباب من خلال التهام الكراديس والعظام مع جماخرها ونقصد بالكرايس (Epiphesis) والجماخر (Diaphesis) وهذه الوسيلة تعتبر الأدق تقريباً ولكن توجد بعض الحالات المرضية التي تؤدي الى تأخر هذا الالتحام ويظهر عادة في صور الأشعة ان الإلتحام قد تم قبل تمامه الفعلي في بعض هذه الحالات .

٤- تقدير العمر في مرحلة الإكتهال والشيخوخة :

١- تعتبر مرحلة الإكتهال والشيخوخة من مرحلة اكتمال النمو الى نهاية العمر في سن متقدم وتقدير العمر في هذه المرحلة يعتبر تقريبي محض ويعتمد على ما يلي :

١. المظهر العام للجسم .
٢. التجاعيد في الوجه .
٣. الشيب بالشعر والصلع .
٤. انقطاع الحيض عند المرأة .
٥. ظهور القوس الشيخوخي لقرنية العين .

وهذه المظاهر غالباً ما تكون مضللة أو خاطئة في كثير من الحالات لذلك
م تقدير العمر في هذه المرحلة على ضوء المعطيات التالية :

١- التحام عظام الجمجمة وزوال التفاريز بينها ويبدأ عادة من سن ثلاثين
عام في الدرز السهمي (Sagital) ويظهر أولاً على السطح الداخلي
للعظم.

وفي سن ٣٠-٤٠ سنة يبدأ في الدرز الاكليلي (Corneal) عند
بدايته في الدرز الجبهي الاسفني ثم ينتشر الى أعلى .

الدرز الجدالي الصدغي (Temporo-parietal) لا يلتحم عادة بل
يقتى الى سن متقدم من العمر .

٢- العظم الاسفنجي يتخلخل في العظام الطويلة .

يبدأ هذا التغيير بالعظم بعد سن الثلاثين ويبدأ عادة في عظم
الحوض ثم يبدأ التخلخل في عظم العانة من جهة الإرتفاع العاني
فيصبح أملس ويظهر ذلك بالأشعة أو بالتشريح .

٣- القص والغضاريف :

التحام مقبض القص وتعظم الغضروف الحنجري والتحامه مع
القص وتعظم الغضاريف الضلعية وغضروف الارتفاع العالي
والغضاريف المفصالية وتعظم الغضروف الدرقي كل ذلك يبدأ بعد
الخمسين من العمر وهذه جميعها لا يمكن الاعتماد عليها بدقة في
تقدير العمر .

٤- فحص الأسنان (طريقة توما لفحص الأسنان) :

وتشمل هذه الطريقة التغيرات التالية بالأسنان :

١. تآكل السطح وخاصة للطواحين .
٢. ضمور اللثة وزيادة الجزء الظاهر من الأسنان ونقص الجذر وتخلخل
السن تدريجياً .

٣. تكون طبقة اضافية من العاج في أعلى تجويف اللب .
٤. زيادة طبقة الاسمنت المحيط بالجذر مع تآكل من أسفل الى أعلى وانسداد تجويف اللب تدريجياً .
٥. انفراج زاويتي الفك السفلي وضمور الناحية السطحية للفكين .

تحديد القامة :

في حال وجدت جثة عظامها متفككة من بعضها فيمكن تقدير قامة الشخص من مقياس الجذع أو الأطراف .
فالمسافة بين أطراف الأصابع والذراعين ممدودتين على جانبي الجسم تساوي طول القمة تقريباً .
ضعف طول أحد الذراعين مضافاً اليه ٣٠ سم (طول الترقوتين + ٤ سم عرض القص) يعطي نفس النتيجة .
المسافة بين قمة الرأس وبين الإرتفاع العاني يساوي نصف قامة الشخص .
النسبة بين طول الجذع من أعلى مقبض القص الى الإرتفاع العاني / الى القامة يساوي ٣,٣/١ .

كيف تقاس العظام :

- ١- عظم الفخذ :
يقاس من أعلى الرأس الى أسفل الركبة من الجهة الأنسية .
- ٢- العضد :
يقاس جميعه .
- ٣- القصبة :
تقاس من السطح العلوي للرأس الى طرف الكعب الأنسي .

٤- الكعبرة :

تقاس من أعلى الرأس الى طرف التواء .
وفي حالة العظام الطرية مع الغضاريف تقاس القامة على النحو التالي :

أولاً : في الذكور :

- طول الفخذ $\times 12,88 + 81,231$
- طول العضد $\times 2,894 + 70,714$
- طول القصبة $\times 2,376 + 78,807$
- طول الكعبرة $\times 3,271 + 86,465$

ثانياً : في الإناث :

- طول الفخذ $\times 1,945 + 73,163$
- طول العضد $\times 2,754 + 72,46$
- طول القصبة $\times 2,352 + 75,639$
- طول الكعبرة $\times 3,343 = 82,189$

- الإستعراف عن طريق البصمة الجينية DNA Finger Printing

لقد تطور علم الوراثة في السنوات الأخيرة وتقدم تقدماً كبيراً في عدة مجالات من بينها مجال العلوم الطبية الشرعية فبدأ استخدام البصمة الجينية في مواضيع عدة منها :

أ- اثبات الأبوة والبنوة : في الحالات المتنازع عليها مثل الإدعاء على شخص ما بأبوته لطفل مجهول الأب من سفاح أو اغتصاب أو زنا أو غيرها .

وكذلك في حالات اختلاط الأطفال في المستشفيات او ضياع طفل ما والعثور عليه بعد زمن .

ب- وكذلك في حالات الجرائم الجنسية وجرائم القتل في حال العثور على عينات بيولوجية يمكن من خلالها التعرف على هوية الجاني ومقارنة العينات مع المتهم .

العينات المستخدمة :

١- عينة الدم : على الأقل ١ مل من الدم يجب الحصول عليها للمقارنة واستخراج البصمة الجينية ومن المفضل ان تكون كمية العينة ٥ مل ويفضل ان توضع العينة في عبوة زجاجية واذا وضعت في عبوة بلاستيكية فيجب ان (تفرز) تثلج في البراد المجمد .

٢- البقع الدموية : يجب ان ترسل البقع الدموية كما هي على السطح دون أن تمس الى المختبر ويجب ان تحفظ مبردة قدر الإمكان ومن الممكن ان تؤخذ مسحة منها (Swab) على قطنة ثم تجفف بدون حرارة او تثلج .

البقع الدموية الجافة يمكن ان يتم كشطها بواسطة شفرة وتوضع في علبة بلاستيكية صغيرة وترسل مبردة قدر الإمكان الى المختبر .

٣- السائل المنوي والسائل المهبلي : تؤخذ عادة بواسطة مسحات قطنية من المهبل او الشرج او الفم ويجب ان تجفف في الهواء بالسرعة الممكنة بدون تسخين ثم تحفظ بعد ذلك في المبرد .

ويتم أخذ السائل المنوي بواسطة قاصة ثم يتم وضعها في زجاجة عادية وتحفظ في المبرد بالتلج . والبقع المنوية يمكن أخذها كما هي على حالها وحفظها مبردة قدر الإمكان حتى يتم ارسالها الى المخبر لإجراء التحليل .

٤- عينات الشعر : مصادر الشعر من الرأس والجسم والعانة والإبط والحوابج

وحتى يتم اجراء فحص البصم الوراثي DNA يجب ان تكون جذور الشعر فيها عدد كاف من الأنويه .

ويجب ان يكون موجود على الأقل من ١٠-٢٠ شعرة تؤخذ من جذورها وتوضع في علبة بلاستيكية ومن ثم تثلج اذا كان هناك تأخير في ارسالها .

٥- العينات التشريحية النسيجية : يجب أخذ على الأقل ٢غم من الأنسجة تؤخذ وتوضع في عبوة بلاستيكية بدون مثبتات (Fixative) او حافظات (Preservative) وتوضع في الفريزر صلبة . الطحال هو من افضل الاحتشاء لإجراء فحص DNA ومن ثم الكبد، العضل، الكلى والدماغ .



العينات الطازجة تكون أفضل من العينات المتعفنة والتي في مراحل التعفن المتقدمة تكون عديمة النفع بسبب تحلل كروماتين النواه وهناك طريقة حديثة متطوره يمكن من خلالها معرفة DNA حتى بعد سنوات طويلة من خلال العظم الجاف .

وهذه الطريقة تستخدم اقل ما يمكن من محتويات الخلية .

طريقة استخراج DNA

يتركب DNA من شريطين من مواد نيتروجينية عددها اربعة وهي الأدينين والجوانين والثيامين والسيتوسين يتم في المختبر فصل الشريطين بواسطة تعريضه الى حرارة عاليه الى شريط منفصل تم بإضافة مواد وقواعد نيتروجينية يمكن مضاعفة عدد الحامض DNA .

وهناك طريقة البلمرة التسلسلي PCR .



طفل لقيط يتم الاستعراف عليه من خلال العلامات الخارجية
وأخذ العينات اللازمة لعملية الاستعراف

الوحدة الثالثة
الجروح والإصابات

- تعريف الجرح .
- المسحجات الحيوية وغير الحيوية .
- الجروح القطعية .
- الجروح الطعنیه .
- الجروح الرضیة .
- الرضوض والكدمات .
- جروح الأعیرة الناریة .

الجروح والإصابات

تعريف الجرح :

هو أي شرط أو قطع في استمرارية الجلد أو الأغشية أو أنسجة الجسم المختلفة .

أما التعريف القانوني لكلمة الجرح وحسب ما نصت به المادة الثانية من قانون العقوبات (ق رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠) على أنه :

يراد بلفظة الجرح كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية . وإيذاء للغرض المقصود من هذا التفسير يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أو شق أي غشاء آخر .

فالتعريف الطبي شمل جميع أغشية وأنسجة الجسم الداخلية أو الخارجية ذلك انه من الممكن ان يصاب الكبد أو الطحال بجرح بدون اصابة جدار البطن بجرح او شق فمن الناحية الطبية يعتبر هذا جرح . ولكن وحسب التعريف القانوني فإنه لا يعتبر من الجروح .

ولما قصد القانون بالخارجي ما يمكن لمسه وبدون شق أو شطر اي غشاء آخر فإصابة الساعد أو الصدر أو أي مكان ظاهر يعتبر جرح وكذلك اصابة الأنف من الداخل والفم واصابة المهبل أو الشرج تعتبر من الجروح لأنه من الممكن لمسها بدون شطر أو شق .

وعندما يقوم الطبيب بمعاينة الجروح بشكل عام فعليه ان يدون المعلومات التالية :

١- نوع الجروح : - قطعيه .

- رضيه .

- طعنيه .

- ٢- موقع الجروح من الجسم متوخياً الدقة بالوصف .
- ٣- عدد الجروح .
- ٤- أبعاد الجروح وذلك بقياس الطول والعرض والعمق .
- ٥- العمر التقريبي للجروح . (المدة التي مضت على حدوثها) .
- ٦- طبيعة الجروح .
- ٧- الأداة المستخدمة أو المسبب للجروح .
- ٨- الحالة العامة للمصاب الناتجة عن الإصابة بالجروح .
- ٩- المضاعفات التي قد تترتب على هذه الجروح .
- ١٠- المواد والعلامات العالقة بالجرح وتدل على الأداة .
- ١١- بيان فيما اذا كانت هذه الجروح حيوية اي حدثت والإنسان على قيد الحياة قبل الوفاة أو غير حيوية حدثت بعد الوفاة وذلك في حالات الكشف عن الوفيات .

والجروح تقسم من حيث طبيعتها والأداة المسببة لها الى الأنواع التالية :

- ١- السحجات أو الخدوش أو الكشوط (Abrasions) :
- وجميعها مرادفات لنفس الإصابة والتي هي نزاع الطبقة الخارجية من الجلد أو مع طبقات الجلد التي تقع تحتها .

أهم المميزات والمتفرعات :

- ١- تنتج عن الاحتكاك أو الانضغاط بشده متفاوتة بين الجلد وأي جسم صلب راض .
- ٢- تكون بالعاده سطحيه .

- ٣- قد تأخذ شكل الأداة أو الجسم المسبب لها مثل الأطراف .
- ٤- سرعة الشفاء خلال أيام معدودة وعلى مراحل معروفة .
- ٥- تشفى عادة بدون مضاعفات ولا تترك أثراً لاحقاً .
- ٦- تعتبر من الإصابات البسيطة التي لا تشكل عادة خطورة على حياة الإنسان .

-المغزى من تفسير السحجات وماذا يستدل منها :

- للسحجات مدلولات كبيرة رغم بساطتها وسطحيتها إلا أنه من الممكن ان يستدل منها على ما يلي :
- ١- فحص السحجات بدقة يساعد في معرفة اتجاه القوة المستعملة وذلك لأن طبقات الجلد تكون منزوعة ومرفوعة الى الأعلى باتجاه القوة المسببة .
 - ٢- يستدل من السحجات على مميزات الآلة أو الأداة المسببة من حيث المساحة والشكل وطبيعة السطح الذي لامس الجلد .
 - ٣- يستدل كذلك من السحجات على مدى القوة المستعملة فالسحجات قد تكون سطحية في حال القوة السطحية قليلة الشدة وقد تكون سحجات طبيعية في حال قوة أشد (مثل اطار السيارة) .
 - ٤- تدل السحجات في حال وجودها على المعتدي والمعتدى عليه بوجود مقاومة .
 - ٥- وجودها في اماكن معينة من الجسم يدل على طبيعة الجريمة مثل وجود سحجات هلالية الشكل على مقدم العنق تدل على الخنق اليدوي، وجود سحجات على مقدم انسية الفخذين وعلى الوجه حول الفم تدل على مقاومة في جريمة اغتصاب مثلاً .
 - ٦- سرعة شفاء السحجات ومرور ذلك في مراحل معروفة يمكن ان يدل على عمر السحجات والاصابات المرافقة لها من كدمات وجروح .

٧- وجود السحجات في اماكن معينة في متناول اليد وبشكل معين تدل على الإصابات المفتعلة .

- اندمال او شفاء السحجات يمر كما ذكرنا سابقاً في مراحل ولذلك مدلولات كبيرة وأهم هذه المراحل هي :

١- مرحلة تكون القشرة : يخرج من سطح السحجة سائلاً مصلياً يكون مدمى خلال الساعات الأولى من الإصابة وتكون رطبه لينه ثم تبدأ بالجفاف بعد بضعة ساعات وتكون قشره مصلية تكون مدمى خلال الساعات الأولى من الإصابة وتكون رطبة لينه ثم تبدأ في الجفاف بعد بضعة ساعات وتكون قشرة مصلية ممتبسة من السائل المصلي والخلايا الميتة والمكونات الخلوية للدم وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأولى .

٢- مرحلة التجديد الطلائي : ويتميز بارتفاع حواف القشرة المصلية مع زيادة غمق لون البشرة وسمكها وتبدأ هذه المرحلة بعد أربعة وعشرين ساعة تقريباً وتستمر ثلاثة ايام .

٣- مرحلة التكاثر الظهاري ويتميز ظاهرياً بتحديد القشرة وانفصال حوافها عما حولها ويتكامل هذا الدور في حوالي الأسبوع .

٤- مرحلة سقوط القشرة المصلية : وتسقط هذه القشرة كاشفة عن سطح طلائه بلون وردي متميز عند ذوي البشرة البيضاء ويكون هناك ارتفاع في السطح مما يجاوره ويزول ذلك مع تجانس اللون مع خلال عدة اسابيع بدون أثر أو تخلف ندبه .

الموت من تسلخات الجلد وخاصة


أولاً : تكون بلون أصفر باهت .

ثانياً : جافة الملمس .

ثالثاً : لا يصاحبها ارتفاع حواف التسلخ .

وقد تنتج عن الجفاف الموضعي في المناطق التي كانت رطبة قبل أو حوالي وقت الموت مثل ما يحصل في صفن الخصيتين وفي شفاة الرضع وقد تكون من حيث المظهر شبيهة جداً في السحجات الحيوية ولكن يمكن تفريقها بالفحص المجهرى .

وأنه لمن الصعوبة التفریق بين السحجات الحيوية التي حدثت قبيل الوفاة والحاصلة عند الموت وبعده بوقت قصير جداً حتى في الفحص المجهرى لأن الفارق الزمني ما بين الموت الظاهري أو السريري والموت الخلوي يتيح للخلايا استهلاك طاقتها المخزنة في محاولة الترميم حتى الموت .



سحجات طبيعية حيوية تظهر شكل الأداة المسببة وهي فرزات إطار سيارة.



سحجات طنبعية حيوية تظهر شكل الأداة المسببة نفس الحالة .

٢- الجروح القطعية

وهي القطع الحاد المنتظم بالأنسجة ويشمل عادة قطع الجلد والأنسجة والعضلات التي تقع تحته بما في ذلك الأوعية الدموية . وقد تكون حواف الجرح غير منتظمة اذا كانت الاصابة في المناطق الرخوة المترهلة من الجسم مثل منطقة الإبط والصفن .

وأهم ما يميز هذه الجروح :

- ١- تنتج عادة عن جسم صلب ذو حافة حادة .
 - ٢- تكون حواف الجرح منتظمة .
 - ٣- يكون طول الجرح القطعي عادة أكبر من عمقه .
 - ٤- قاعدة الجرح غالباً ما تكون نظيفة .
 - ٥- من مضاعفات هذا النوع من الجروح النزف الدموي الى الخارج غالباً .
 - ٦- يكون الشعر في منطقة الجرح مقطوعاً بشكل حاد .
- هذا وللجروح القطعية تفسير ومغزى أو دلالات فالجروح القطعية تكون عرضية او انتحارية او جنائية او مفتعلة ولكل حالة ما يميزها عن غيرها .
- أ- الجروح القطعية العرضية : تحدث عادة نتيجة التعرض بأداة صلبة حادة بطريقة غير مقصودة ويمكن ان تكون في اي مكان من الجسم في حال السقوط على أداة حادة وغالباً ما تكون باليد نتيجة استعمال الأدوات الحادة كالسكين وما في حكمها ويكون عددها محدود وغالباً ما تكون جرح قطعي واحد .
- ب- الجروح القطعية الانتحارية : أهم ما يميز هذه الجروح عن غيرها ما يلي :

١- تكون عادة من حيث الموقع في مكان حيوي من الجسم يؤدي الى الوفاة السريعة مثل مقدم العنق والرسغ أو مقدم المرفقين أو قاعدة الفخذ .

٢- تكون عادة في متناول اليد بالنسبة للمتحرر .

٣- تكون مصحوبة بجروح سطحية تردديه حول الجرح الرئيسي وخاصة عند بداية الجرح القاتل .

٤- يفيد في معرفة اليد التي استعملها المتحرر او التي كان يستعملها من خلال موقع وصفات الجرح ووجود السلاح في يد المتحرر في حالة التوتر الرمي .

٥- تكون الجروح الانتحارية في بدايتها عميقة وسطحية في نهايتها اذ في نهاية الجرح تضعف القوة وتصبح سطحية وفي جروح العنق الانتحارية تبدأ من الجهة المعاكسة عادة وإذا كان أيمن تبدأ من الجهة اليسرى وتنتهي في الجهة اليمنى من العنق .

ج- الجروح القطعية الجنائية:

تحدث مثل هذه الجروح في حالات المنازعات والمشاجرات وجرائم القتل المقصود والعمد وأهم ما يميزها ما يلي :

١- تكون في مواقع مختلفة من الجسم ومتعددة .

٢- تكون ذات صفات مختلفة فبعضها عميق وبعضها سطحي .

٣- وجود جروح مقاومة في مواقع معينة مثل باطن اليدين والأصابع نتيجة الإمساك او محاولة الإمساك بالسلاح المستعمل .

٤- تكون سطحية في بدايتها وعميقة في نهايتها وخاصة اذا تمكن

الجاني من ضحيته فإنها تكون متماثلة العمق تقريباً اي يكون عمقها في بداية الجرح مماثل لعمق الجرح في نهايته وخاصة في حالات قطع العنق .


- ٥- تكون غالباً مصحوبة بإصابات أخرى مثل السحجات والكدمات .
- د- الجروح القطعية المفتلة : وهذه الجروح يحدثها الشخص بنفسه وذلك لغاية ما في نفسه وغالباً ما يكون لتقديم شكوى كبدية بحق اشخاص آخرين أو للحصول على اجازة مرضية او فائدة معينة مثل تأمين أو غيره ولا تكون أبداً بقصد الإنتحار وأهم ما يميزها :
 - ١- تكون سطحية متعددة متوازية بشكل منتظم او متقاطعة .
 - ٢- تكون في متناول اليد فتكون على ظاهر الساعد الأيسر او على الصدر والبطن .
 - ٣- تكون الملابس سليمة من اية شقوق او قطع في اماكن الجروح .
 - ٤- تكون على جسم المصاب علامات وندب لجروح سابقة قديمة مماثلة.
 - ٥- تكون سطحية في بدايتها وفي نهايتها بشكل متماثل تقريباً .
 - ٦- من النادر ان تؤدي الى مضاعفات او امراض .
 - ٧- تحدث في اشخاص لهم تاريخ معروف بإثارة المشاكل ومن أصحاب السوابق وفي داخل السجون .



جروح قطعية مفتعلة يلاحظ انها سطحية خطية متوازية باتجاه واحد حسب اليد المستعملة .



جرح قطعي غير حيوي



جروح قطعية مفتعلة تظهر عليها جميع صفات الجرح المفتعل .

٣- الجروح الطعنية :

وهي عبارة عن جروح وخزعة نافذة في السطح داخل الجسم وأهم ما يميزها :

- ١- تنتج عن جسم صلب حاد ذو رأس حاد ومدبب وتكون ذات حافتين حادتين أو حافة واحدة حادة .
- ٢- غالباً ما تكون منتظمة الحواف .
- ٣- دائماً يكون عمقها اكبر من طولها .
- ٤- تكون عادة نازفة الى داخل الجسم وبالعكس الجروح القطعية .
- ٥- غالباً ما تكون هذه الجروح جنائية ومن الممكن ان تكون عرضية او انتحارية .
- ٦- أهم مضاعفات هذا النوع من الجروح النزيف الدموي والسدة او الصمة الهوائية واصابة الاحشاء داخل الجسم .

المغزى من تفسير هذا النوع من الجروح :

أ- يمكن معرفة نوع السلاح المستعمل اذا كان ذو حافة حادة واحدة أو ذو حافتين حادتين من خلال تحديد زاويتي الجرح فإذا كانت زاويتي الجرح حادتين يكون السلاح المستعمل ذو حافتين حادتين مثل الشبرية او الجنيبة وأما اذا كانت احدى الزاويتين حادة والأخرى غير حادة فإن السلاح المستعمل يكون ذو حافة حادة واحدة مثل السكين والموس وما في حكمها.

ب- عمق الجرح قد يكون أقل من طول السلاح المستعمل او أطول منه وهذا يعتمد على المسافة التي نفذها السلاح داخل الجسم ووضع الجزء المصاب في الجسم وقت الإصابة ومدى مرونة الجزء المصاب ويعتمد كذلك على وجود مقاومة في طريق الإصابة كالعظام مثلاً وعلى مدى القوة المستعملة في احداث الإصابة .

فمثلاً : جرح طعني بالبطن ممكن ان يكون عمقه كبيراً وفي نفس الوقت المسافة التي نفذها السلاح بسيطة أو جزء منه وبدون ان يحتاج الى قوة لإحداثه ولعدم وجود مقاومة في طريق الإصابة مثل عظام وقابلية البطن للإنضغاط جميع هذه العوامل تجعل الإصابة عميقة على الرغم مما أوردناه .

ج- ان وجود سحجات حول حواف الجرح الطعني وخاصة السحجية الطبيعية او الختمية عند احدى زوايا الجرح تدل على أن السلاح المستعمل نفذ بكامله داخل الجسم وقد تكون السحجة على زاويتي الجرح اذا كان للسلاح مقبضين متصلين بالنصل .

د- ان تتبع مسار الجروح الطعنية داخل الجسم يساعد كثيراً على معرفة اتجاه القوة المستعملة والوضع الذي كان عليه المصاب وقت الإصابة وموقع المعتدي بالنسبة للمجني عليه عند وقوع الاعتداء .

هـ- ان تعدد مواصفات الجروح الطعنية واختلافها من حيث الشكل والاتجاه من الممكن ان تدل على ان مرتكب الجريمة اكثر من شخص واحد وكذلك ممكن ان تدل على تعدد واختلاف الأسلحة المستعملة في الجريمة.


و- تعدد الجروح الطعنية تدل على كونها جنائية وبقصد القتل .

ومن أهم مضاعفات الجروح الطعنية وأسباب الوفاة فيها :


- ١- النزف الدموي الشديد .
- ٢- إصابة الاحشاء الداخلية وخاصة الحوية .
- ٣- السدة الهوائية .
- ٤- التجمع الهوائي والدموي في تجاويف الجسم وخاصة الصدر .
- ٥- الالتهابات الناتجة عن دخول جسم ملوث الى داخل الجسم .



جرح طعني ذو حافة حادة واحدة



جروح طعنبة بالصدر ناتجة عن أداة حادة



جرح طعني ذو حافة حادة واحدة



جروح طعنبة بالصدر ناتجة عن أداة حادة

٤- الجروح الرضية او التهتكية :


وهي عبارة عن تمزق وتباعد الجلد والأنسجة نتيجة الارتطام بجسم صلب راض أو نتيجة سحقها بين قوتين راضتين متعاكستين مثل وقوعها بين الجسم الراض المسبب لها وبين عظام الجسم أو أي جسمين صلبين آخرين . وقد يحدث نتيجة زيادة التوتر في الجلد سبب الضغط مع الشد بقوة وأهم ما يميز هذه الجروح :

- ١- حوافها غير منتظمة وتكون متسحجة ومتكدمه .
- ٢- يكون الشعر في منطقة الاصابة مهروساً .
- ٣- تكون قاعدة الجرح مهروسة وغير نظيفة .
- ٤- يكون النزيف في مثل هذه الاصابات بسيطاً بسبب تكدم الأوعية الدموية .
- ٥- يكون الجلد مرفوعاً باتجاه القوة المستعملة .
- ٦- أهم مميزات هذا النوع من الجروح وجود الجسور بين حواف الجرح وهو بقايا الانسجة والأوعية والأوتار المقطعة التي تصل حواف الجرح .
- ٧- تنتج هذه الجروح عادة عن جسم صلب راض .
- ٨- من أهم مضاعفات هذه الجروح الالتهابات الناتجة عن تلوث الجرح .
- ٩- غالباً ما تكون هذه الجروح عرضية مثل حوادث السير والسقوط وقد تكون جنائية ونادراً ما تكون انتحارية او مفتعلة إلا في حالات الانتحار بالسقوط من مرتفع او علو .

المغزى من تفسير هذه النوع من الجروح :

- ١- تدل على شدة الاصابة ومدى تأثير القوة المستعملة على ضوء مدى تأثيرها في اعماق الجسم .

- ٢- من الممكن ان تدل على طبيعة الأداة المسببة او المستعملة في الحادث وطبيعة البيئة المحيطة التي حدثت فيها .
- ٣- وجودها في أماكن ومواقع معينة من الجسم تدل على ظروف هذه الاصابات من حيث كونها عرضية او انتحارية او جنائية .



جرح رضي في فروة الرأس ويتميز بوجود جسور من الأنسجة
وحواف غير منتظمة

- ٤- من الممكن تميز نوع هذه الجروح من حيث كونها رضية أو سطحية أو هرسية أو تهشمية .
- ٥- ان هذا النوع من الإصابات يشفى عادة بتخلف ندب ظاهره غير منتظمة وقد تترك تشوهاً في اماكن حدوثها .

٥- الكدمات او الرضوض :

وهي عبارة عن نزيف دموي داخل الأنسجة الواقعة تحت الجلد نتيجة تمزق الأوعية الدموية بفعل شدة او ارتطام بجسم صلب راض .

وهي غالباً ما تكون عرضية ومن الممكن ان تكون جنائية او انتحارية او مفتعلة .

وأهم مميزات الكدمات ما يلي :

- ١- تكون أكثر وضوحاً في الأطفال والنساء وكبار السن منها في الرجال وذلك بسبب رخاوة الأنسجة ورقة الأوعية الدموية في الأطفال والنساء .
- وأما كبار السن فيعود السبب الى الحالة المرضية التي تكون عليها الأوعية الدموية في الجسم .
- ٢- تكون الكدمات أقل وضوحاً وقد لا تظهر في الأماكن التي يكون فيها الجلد قريباً أو ملاصقاً للعظم أو عضلات قوية او طبقة كثيفة من الألياف وفي مثل هذه الحالات تظهر الكدمات على شكل انسكاب دموي في المناطق الرخوة المنخفضة بالنسبة لمكان الإصابة فمثلاً كدمة في الجبهة تحدث انسكاباً دمويّاً حول العينين .
- ٣- ان الكدمات قد تظهر على شكل متسحج في سطحها وذلك تبعاً لطبيعة السطح الذي لامس الجلد والقوة المستعملة وقد تكون الكدمات على

شكل كدمات طبيعية او ختمية اذا كانت القوة المستعملة عامودية على الجلد .

٤- ان الكدمات قد تحمل مميزات الجسم الصلب الراض المسبب لها من حيث شكلها وطبيعة سطحها الذي لامس الجلد مثل الكدمة الخطية او ما يسمى بالحز الرقبي في حالات الخنق بواسطة حبل حول العنق .

٥- تكون الكدمة أشد في بداية استعمال القوة .

٦- قد تظهر الكدمات متأخرة حتى في حالات الوفيات فقد لا تظهر قبل مرور اربعة وعشرون ساعة .

٧- قد تظهر الكدمات بشكل اوضح على الجسم من الخارج في الأشخاص البيض ويمكن ان تظهر في داخل الأنسجة والأحشاء .

٨- وجود كدمات متنوعة ومتفرقة في انحاء مختلفة من الجسم وذات أعمار مختلفة في الأطفال تدل على تلازمة الطفل المذب أو تعنيف الطفل .

٩- يمكن تقدير عمر الكدمات من خلال التغيرات التي تمر فيها في مراحل الشفاء او من خلال تقدير عمر الإصابات المصاحبة لها مثل السحجات والمراحل التي تمر فيها الكدمات اثناء شفائها ومرور الوقت تتميز من خلال تغير اللون فيها ومثال على ذلك :

تكون الكدمة في بداية حدوثها باللون الأحمر ثم بعد مرور ثمانية واربعون ساعة تقريباً تتحول الى اللون الأزرق والبنفسجي وبعد مرور ثلاثة الى خمسة ايام يتحول لونها الى الأخضر ثم بعد مرور فترة من الزمن تقدر بحوالي الأسبوع تتحول الى اللون الأصفر ثم خلال يومين تختفي اي ان الكدمة بشكل عام تحتاج الى اسبوعين تقريباً للشفاء والاختفاء .

وان التغير في اللون يعتمد على التغيرات الكيميائية التي تحدث للدم النارف داخل الأنسجة .

وان هذه التغيرات التي تطرأ على الكدمة تعتمد على مدى الإصابة

وقوتها وموقعها من الجسم بالإضافة الى عمر المصاب وحالته الصحية وجنسه ففي كبار السن تختفي بعد مدة أطول من صغار السن وفي الذكور تختفي قبل الإناث كما أن الكدمات في الأنسجة الرخوة مثل الجفون تختفي في مدة أقل مما لو كانت في أنسجة قوية .

- أما بالنسبة للتشخيص التفريقي للكدمات : فإنها قد تكون كدمات غير حيوية تحدث بعد الوفاة وإذا حدثت اثناء الوفاة او بعدها بفترة زمنية قليلة فمن الصعب تمييزها عن الكدمات الحيوية وحتى مجهرياً وذلك بسبب التفاعل الناتج عن الطاقة المخزنة بالخلية حتى بعد الوفاة مباشرة قبل وفاة الخلية .

وأهم ما يميز الكدمة الحيوية عن الكدمة غير الحيوية وجود التفاعلات الحيوية للإصابة من الخلايا المكونة بالدم في مكان الكدمة وعلامات التفاعل الحيوي للإندمال عدا عن الشكل الخارجي للكدمة الحيوية وتعدد مراحلها وألوانها .

- كذلك من الممكن ان يتم الخلط بين الكدمة والزرقة الرمية وفي مثل هذه الحالة يمكن تمييزها عن بعضها البعض بسهولة :


١- الكدمة ممكن ان تكون في اي مكان او موقع من الجسم وأما الزرقة الرمية فإنها تكون دائماً في الأماكن المنخفضة من الجسم .

٢- الكدمة تكون عادة محددة بمنطقة ما بالجسم اما الزرقة الرمية فتكون بشكل أوسع ومنتشرة ولا تظهر الزرقة الرمية في مناطق الالتئام بالجسم حيث ان الكدمة لا تختفي بالضغط اما الزرقة الرمية فإنها تختفي بالضغط عليها .

٣- الكدمات قد تكون بألوان متعددة حسب مرحلة الشفاء التي تمر بها بينما الزرقة الرمية تكون بلون بنفسجي أو أحمر فاقع أو باهت .



كدمة في الجبين تظهر بشكل اوضح في المنطقة الرخوة حول العينين



كدمة بلون بنفسجي داكنه حيويه تظهر في منطقة الركبة .




كدمة في أسفل العين في طور الشفاء



كدمة تحت فروة الرأس وتظهر النزف الحيوي للإصابة



كدمة على ظهر اليد حيوية بلون أحمر حديثه




كدمة مع تسحج على الوجنه وصيوان الأذن



حالة قتل وليد وتظهر كدمات على الوجه



كدمة مع تسحج



كدمات حيوية وغير حيوية تظهر على الظهر



كدمة حيوية



سحجات ظفرية على الوجه

٤- في حالة احداث شرط في مكان الزرقة الرمية فإن الدم ينسكب الى الخارج لأن الزرقة الرمية تحدث بترسب الدم في الأماكن المنخفضة بسبب أو بفعل الجاذبية الأرضية بينما حال الكدم فإن الدم لا ينسكب لأن النزف يبين الأنسجة .

٥- بالفحص المجهرى للكدمة نجد العلامات الحيوية الخلوية بمكونات الدم في مكان الكدم أما في الزرقة الرمية فإننا لا نجد التفاعلات الحيوية للخلايا مكونات الدم .

٦- جروح الأعيرة النارية :

وهي عبارة عن الجروح التي تنتج عن الاصابة بالأعيرة النارية المختلفة وتقسم هذه الجروح الى نوعين رئيسيين وهما :

١- جرح مدخل العيار الناري (Entry Wound) .

يتم تحديد هذا الجرح في العادة من خلال شكله ومميزاته ومن خلال فحص الملابس في حال وجودها مما تحمله من علامات مميزة .

وأهم مميزات جرح مدخل العيار الناري وبغض النظر عن المسافة التي اطلق فيها العيار الناري :

١- وجود فقدان نسيجي مكان الجرح : فعادة يكون جرح المدخل فيه فقدان في الجلد والأنسجة الواقعة تحته على شكل فوهة تختلف من حيث الشكل والمساحة او القطر حسب نوع العيار الناري وعياره والمسافة التي اطلق منها وعدد الأعيرة النارية التي مرت من نفس جرح المدخل . وفي العادة يكون شكل جرح المدخل بيضوي او دائري الشكل .

٢- وجود علامات المسحة الرصاصية على حواف جرح المدخل وهي نواتج ما علق برأس المقذوف الناري من زيوت وشحوم من السلاح المستخدم .

٣- وجود تسحج في إحدى حواف جرح المدخل وتنتج عن احتكاك رأس المقذوف بالجلد أثناء اختراقه له ويدل بالعادة على اتجاه العيار الناري .

اما بالنسبة للعلامات الخاصة لجرح مدخل العيار الناري اعتماداً على المسافة التي اطلق منها العيار الناري فعلينا وقبل أن نبين هذه العلامات وحسب مسافة الإطلاق أن نبين وباختصار نواتج العيار الناري وهي :

ان المقذوفات النارية وبشكل عام تتشابه من حيث الصفات والمكونات العامة لها وبالتالي من حيث نواتج اطلاق الأعيرة النارية فالمقذوف الناري يتكون من :

١- الكبسولة : وتحدث الشرر أو النار .

٢- الحشار الداخلي : وهو ما يفصل ملح البارود عن حبات الرش في حالة الخرطوش .

٣- ملح البارود : ويقع بين الكبسولة والحشار الداخلي واحتراقه نتيجة الشرر الناتج عن الكبسولة يولد غازات وطاقة عالية .

٤- حبات الرش : وتقع في الاسطوانة بين الحشار الداخلي والخارجي وهي العنصر الرئيسي المؤثر في الخرطوش .

٥- الحشار الخارجي : وهو ما يفصل حبات الرش عن فوهة الخرطوش .

أما في الأسلحة النارية العادية من مسدسات وأسلحة اتوماتيكية أخرى فإن مكونات المقذوف الناري فهي :

أ- الكبسولة : وتقع في قاعدة الظرف وينتج عنها شرر أو نار .

ب- ملح البارود : ويقع بين الكبسولة ورأس المقذوف أو الرصاصة واحتراقه يولد طاقة عالية نتيجة تولد الغازات بفعل الاحتراق والضغط الشديد الناتج عن احتراق ملح البارود .

ج- رأس المقذوف (الرصاصية) : وتقع في مقدمة الظرف وتتكون من

مادة رصاصية مغطاة بطبقة من النحاس ويختلف نوعها وقياسها من سلاح إلى آخر .

بعد ان عرفنا وباختصار مكونات العيار الناري علينا الاشارة الى ما يحدث عند اطلاق العيار الناري من حيث الميكانيكية فإنه عند الضغط على الزناد واصابة الكبسولة تنطلق منها شرارة تؤدي الى احتراق ملح البارود وتولد لهب وغازات ومن ثم ضغط شديد واندفاع رأس المقذوف وانفصاله عن الظرف باتجاه الهدف . وينتج عن هذه العملية ما يلي :

- ١- خروج رأس المقذوف الرصاصية في حالة تسارع ودرجة حرارة عالية .
 - ٢- خروج غازات اول اكسيد الكربون الناتج عن احتراق ملح البارود .
 - ٣- خروج لهب ايضاً ناتج عن احتراق ملح البارود .
 - ٤- خروج دخان ناتج عن الاحتراق .
 - ٥- خروج ملح بارود ساخن غير محترق .
- اعتماداً على ما ذكرنا سابقاً وعلى ضوء المسافة المطلق منها العيار الناري تكون صفات جرح مدخل العيار الناري كالتالي :

١- اطلاق العيار الناري بتماس مع الجسم :

نقصد بالإطلاق بتماس اي ان فوهة السلاح تكون ملتصقة او قريبة من الالتصاق بالجسم، وتكون صفات جرح المدخل بهذه الحالة كما يلي :

أ- تكون فتحة الدخول واسعة : نتيجة دخول الرصاصية ودخول الغازات من خلال الجرح وانحباسها بين الجلد وما يقع تحته من الأنسجة والعظام مما يؤدي الى تمزق الجلد وعدم انتظام حواف الجرح وفي حالات التصاق الجلد أو قربه من العظم مثل حالات الرأس يكون شكل الجرح أو حوافه متشعبة ويعطي الشكل النجمي .

ب- وجود كدمة حلقيّة حول حواف الجرح : نتيجة ارتداد الجلد بفعل الفعل ورد الفعل الى داخل فوهة السلاح وانطباعه على الجلد على شكل حلقة حول مدخل الجرح .

جـ تكون نواتج الإطلاق معظمها في داخل اعماق الجرح وتحدث تغيرات كثيرة في أعماق الجرح مثل تلون الأنسجة والدم باللون الأحمر الوردي نتيجة تفاعل الهيمجلوبين مع اكسيد الكربون وتشكيل مادة كاربو كسيهيموجلينين (HBCO) التي تعطي اللون الوردي .

كذلك تكون الأنسجة محترقة بفعل اللهب الناتج عن الإطلاق وتكون بقايا ملح البارود في داخل الجرح . في اسلحة الخرطوش نجد بالإضافة الى ما ذكرنا سابقاً الحشار الخارجي وحبات الرش في داخل فوهة او مدخل العيار الناري أما اذا كان الإطلاق قريباً من التماس فإننا نجد نفس العلامات السابقة بالإضافة الى وجود آثار الاحتراق والإحمرار وآثار ملح البارود في حواف الجرح وحوله والشعر يكون محترقاً في منطقة الإصابة . وفي هذه الحالة لا نشاهد الكدمة الحلقيّة التي وصفناها بالاطلاق بتماس .

٢- اطلاق العيار الناري عن قرب :

ويقصد بالاطلاق عن قرب اي من مسافة قريبة من الجسم وأهم ما يميز هذا الجرح وما حوله ما يلي :

أ. وجود فقدان نسيجي في فتحة او فوهة المدخل بقطر أقل من الإصلاق بتماس .

ب. وجود تغير في لون الجلد الى اللون الأحمر الوردي بفعل الغازات .

ج. وجود احمرار او احتراق حول مدخل العيار الناري بفعل اللهب .

د. وجود وشم بارودي في الجلد حول فتحة مدخل العيار الناري بفعل

التصاق ملح البارود غير المشتعل مع الجلد ويسمى الوشم البارودي لأنه لا يزول مثل الوشم إلا بالجراحة .

هـ- تكون حواف جرح المدخل مقلوبة الى الداخل ومتسجة ومحتركة .

وهذه التأثيرات والعلامات تبدأ بالتلاشي كلما ابتعدت فوهة السلاح المستعمل عن الجسم المصاب حتى تختفي نهائياً حسب المسافة.

وان آخر ما يختفي من هذه العلامات من حالات الإطلاق عن قرب هو النمش او الوشم البارودي . ويتسع انتشار النمش البارودي حول فتحة الدخول كلما زادت المسافة بين فوهة السلاح المستعمل والجسم .

أما في حالات استعمال اسلحة الخرطوش فإننا نجد كلما زادت المسافة تقل الفوهة او فتحة الدخول وتعدد الى عدة فتحات ناتجة عن حبات الرش ويزداد قطرها كلما بعدت المساحة وكذلك في هذا النوع من الأسلحة فإننا نجد تكدم او جرح سطحي قريب من فتحة الدخول نتيجة ارتطام الحشار الذي يخرج مع المقدوف الناري للجسم .

٣- اطلاق العيار الناري عن بعد :

ويقصد به الإطلاق من مسافة بعيدة تتجاوز المسافة التي تترك أي أثر لنتائج العيار الناري ويطلق على جرح مدخل العيار الناري الذي يكون خالياً من هذه الآثار إلا من المقدوف نفسه ويتميز هذا الجرح بما يلي :

أ- وجود فقدان نسبي في فوهة مدخل الجرح .

ب- تكون حواف الجرح متسحجة ومقلوبة الى الداخل .

د- عدم وجود أي أثر أو علامات قرب اطلاق النار أو نواتج اطلاق العيار الناري .

٢- جرح مخرج العيار الناري (Exit Wound) .

ويقصد بجرح المخرج المكان الذي ينفذ منه المقذوف الناري الى خارج الجسم .

ويتميز جرح مخرج العيار الناري بما يلي :

١. يكون على شكل تمزق في الجلد وأقرب ما يكون الى المخرج الرضي وتكون حواف الجرح مقلوبة الى الخارج .

٢. يكون عادة اكبر من جرح المدخل وغالباً ما يكون اكبر من حجم المقذوف نفسه .

٣. يخلو تماماً من أي آثار لنوايج اطلاق العيار الناري .

٤. لا يكون فيه فقدان نسيجي ويمكن اعادة وصل الجلد والأنسجة وتقريبها من بعضها .

٥. وجود عدة جروح رضية نتيجة خروج العظام المتفتت من خلال الجلد والأنسجة .

وتؤدي عادة اصابة العظام بالمقذوف الناري الى احداث كسور تفتتية بالعظم مما يؤدي الى انتشارها واصابة اجزاء كبيرة من الأنسجة والأحشاء واحداث عدة فتحات خروج . وتكون فتحة الدخول في العظام أصغر من فتحة الخروج وخاصة في اصابات الرأس فالجمجمة وكما هو معروف تتكون من طبقتين، أو صفيحتين من العظام صفيحة خارجية وصفيحة داخلية فإذا دخل المقذوف الناري في عظم الجمجمة فإنه يحدث فوهة صغيرة في الصفيحة الخارجية وفوهة اكبر في الصفيحة الداخلية ويسمى في هذه الحالة بالشطف الداخلي وفي مكان خروجه تكون الحالة معكوسة ويسمى في هذه الحالة بالشطف الخارجي . واصابة الدماغ تكون اكبر حجماً ومحاطة بتكدم ونزيف ويسبب تفتت عظم الجمجمة وتحوله الى شظايا .

مسار العيار الناري :

يتم تحديد مسار العيار الناري داخل الجسم عن طريق ربط جرح مدخل العيار الناري بجرح مخرج العيار الناري أو مكان استقراره داخل الجسم في حال كونه مستقر فالربط كذلك فيما بينهما من إصابات بالأحشاء الداخلية وحسب الترتيب التشريحي بالمسار .

ويعتمد تحديد المسار داخل الجسم على اتجاه الإطلاق وسرعته وعلى طبيعة الأنسجة التي يصيبها في طريقه .

ويتم عادة تحديد المسار في الوضع التشريحي القائم العادي بالنسبة للجسم ولا يتم تحديد اتجاه معين للإطلاق .

فمثلاً إذا قلنا ان اتجاه مسار العيار الناري داخل الجسم كان يتجه من اليمين والأمام الى اليسار والخلف . فإن هذا يعني عدة اتجاهات واحتمالات ممكنة للإطلاق وحسب الوضع الذي كان عليه المجني عليه بالنسبة للجاني .

فحص المصابين بالأعيرة النارية :

يشمل فحص المصابين بمثل هذه الجروح ما يلي :

١- تحديد جرح مدخل العيار الناري .

٢- فحص الملابس وتحديد ومطابقة الاصابات فيها وعلى الجسم وكذلك التحري عن وجود علامات او نتائج الإطلاق عليها والاحتفاظ بها وارسالها الى المختبر الجنائي .

٣- البحث عن علامات قرب اطلاق النار او نتائج الإطلاق .

٤- تقدير المسافة التقريبية التي اطلق منها العيار الناري .

أ. اطلاق بتماس .

ب. اطلاق قريب من التماس .

جـ. اطلاق عن قرب .

د. اطلاق من مسافة بعيدة عن الجسم .

٥- تحديد جرح مخرج العيار الناري .

٦- تحديد مسار العيار الناري بالجسم .

٧- البحث عن وجود جروح واصابات اخرى من علامات شدة أو عنف او علامات مقاومة .

٨- في حالة استقرار المقذوف الناري داخل الجسم فإنه لا بد من استخراجه بدقة وحذر والتعامل معه بطريقة لينة حتى لا تحدث فيه أي خدش او اضافة علامة عليه حتى يتم ارساله بعد التحفظ عليه وتحريزه جيداً الى المختبر الجنائي لتحديد نوعه وعياره واجراء فحص المقارنة مع السلاح المضبوط لبيان فيما اذا كان السلاح المستعمل أم لا كما يتم التحفظ على الأظرفه الفارغة في مسرح الجريمة وارسالها لإجراء الفحص المقارن عليها ايضاً .

بالنسبة لتقدير مسافة الاطلاق بدقة فإن ذلك يبقى نظرياً ولا يمكن الجزم فيه وحتى في حالات اجراء التجارب على نفس السلاح في المختبر الجنائي وذلك لأن الاطلاق يعتمد على عدة عوامل منها الظروف الجوية المحيطة من رياح واتجاه الريح والرطوبة وموقع مطلق النار بالنسبة لاتجاه الريح وكذلك يعتمد على وجود عوائق في طريق المقذوف الناري . أو اصابة المقذوف لجسم آخر او ارتداده مثل اصابة المجني عليه .

وفي جميع الأحوال فإن تقدير المسافة يبقى تقديره لخبراء المختبر الجنائي وبعد اجراء التجارب على السلاح المستعمل ومقارنة الآثار التي يتركها المقذوف الناري على مسافات مختلفة مع الآثار الموجودة على ملابس الضحية وتعتبر هذه الطريقة الأقرب الى تحديد المسافة .

ويمكن تقدير المسافة كما اسلفنا سابقاً اعتماداً على العلامات التي يتركها تأثير نواتج العيار الناري على الجسم .

- ١- الإطلاق بتماس : جميع نواتج العيار الناري داخل جرح العيار الناري .
- ٢- الإطلاق قريب من التماس : لغاية ١٠ سم تظهر آثار الغازات .
- ٣- الإطلاق من قرب : لغاية ٥٠ سم .
- ٤- الإطلاق عن بعد : يتجاوز (٩٠ سم) . لا تظهر إلا علامات المقذوف الناري .

اصابات الأسلحة المتفجرة

تنتج هذه الاصابات عن مختلف انواع الأسلحة المتفجرة من ذخائر وقنابل والغام وتحدث عادة اصابات بليغة تتميز بالحروق الشديدة والبتير والتمزق وتنتج عادة الاصابات عن نواتج الانفجار من شظايا واحتراق وقوة الضغط الناتج عنه (Blast injury) .

وأهم ما يميز هذه الاصابات انها تكون بالمنطقة القريبة من الجسم المتفجر فتكون الاصابة البليغة او البتر في الجهة الأقرب للانفجار .

ملاحظات عامة حول قضايا الإيذاء

هناك حالات في الإيذاء لا تعتبر مخالفة للقانون وذلك من خلال اسباب التبرير والواردة في قانون العقوبات فقد نصت المادة :

(٦٢) من قانون العقوبات على ما يلي :

١. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .

٢. يجيز القانون :

أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آبائهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

ب- أعمال العنف التي تقع اثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب .

ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين في حالات الضرورة الماسة .

وأما في حالات أخرى مثل إيذاء الزوجات من قبل الأزواج فإن ذلك يعتبر جريمة ومخالفة للقانون على الرغم من الحق الشرعي للزوج بضرب زوجته ضمن العرف العام والشروط المسموح على أساسها بالدين الإسلامي في حالات تشوز المرأة ويعتبر إيذاء الزوجة من قبل الزوج سبب مبرر للتفريق بينهما أمام المحاكم الشرعية .

كذلك لا يعتبر ضرب المعلم لتلميذه مبرراً أمام القانون حتى ولو كان ذلك لمصلحة الطالب فقد اعتبر ذلك مخالفه يعاقب عليها القانون .




جروح مخارج أعير نارية في الرأس



جروح مداخل أعيرة نارية في الرأس مع علامات قرب اطلاق نار
(احتراق، احمرار، وشم)




مخرج عيار ناري في العظم



جروح مخارج أعيرة نارية في الرأس



مداخل أعيرة نارية بالجمجمة



مداخل ومخارج أعيرة نارية في الجمجمة مع وجود شطف داخلي للمداخل
وشطف خارجي للمخرج

الوحدة الرابعة
الحروق

- تعريف الحروق .
- الحروق النارية .
- الحروق السلقية .
- الحروق الكيماوية .
- الحروق الكهربائية .

الحروق

تعريف الحروق: تعرف الحروق على انها الآفات والأضرار الجسمانية الناتجة عن حرارة عالية سواء كانت لها أو سائلاً حاراً أو اشعاع وأبخرة.

وتقسم الحروق الى اربعة انواع حسب المسببات التي تحدثها :

١. الحروق النارية .
٢. الحروق السلقية .
٣. الحروق الكهربائية .
٤. الحروق الكيماوية .

الحروق النارية (Flame burn)

وتنتج هذه الحروق عن تعرض الجلد والجسم لحرارة اللهب المباشرة وأغلب هذه الحالات في هذا النوع من الحروق تكون عرضية وخاصة في فصل الشتاء وفي فئة الأطفال والنساء . وما زالت في بلادنا تحدث حالات انتحار بالحرق الناري المباشر وخاصة بين النساء الرفيات على الأخص .

إلا أن الحروق النارية من الممكن ان تكون جنائية وعن قصد جرمي أو بهدف اخفاء جريمة ذلك عن طريق حرق الجثة وفي الحالات القضائية يتعامل الطبيب الشرعي مع حالات الحروق على انها جنائية حتى يثبت العكس بعد الكشف على الجثة وتشريحها واستبعاد اي اسباب اخرى أدت الى الوفاة .

تصنف الحروق الى درجات تبعاً الى شدة الحروق وعمقها في الجسم واتساع انتشارها الى ثلاثة درجات بالنسبة للأطباء المعالجين اختصاصي الحروق والى ستة درجات بالنسبة للأطباء الشرعيين، وذلك بسبب وجود درجات من الحروق تحدث في الوفاة فيتم التعامل معها من قبل الأطباء الشرعيين ولا تصل الى الاطباء المعالجين .

درجات الحروق :

- ١- الدرجة الأولى : وهي احتقان الجند وينعكس بظهور الاحمرار وارتفاع درجة حرارة الجلد مع وذمة خفيفة ويشمل الطبقات الخارجية من الجلد ومثال على هذه الدرجة ما يحدث عند التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف لفترة طويلة
- ٢- الدرجة الثانية : ويشمل الضرر في هذه الدرجة الطبقات المتقرنة من الجلد وقد يصل الى الطبقة الشوكية منه ويؤدي الى حدوث ألم شديد بسبب امتداد الحرق الى النهايات العصبية وتظهر تسلخات جلدية سطحية مع نضح سوائل مصلية مباشرة من الجلد .
- ٣- الدرجة الثالثة : وفي هذه المرحلة يمتد الضرر ليشمل كل طبقات الجلد بما فيها الطبقة القاعدية، ويكون مصحوباً ببقاعات تحتوي على سائل مصللي، وإذا شفي المصاب من الحروق في هذه الدرجة فإنها تترك ندب واضحة على الجلد، وأما الدرجة الأولى فإن الشفاء فيها يكون عادة بدون ترك أي أثر للحرق .
- ٤- الدرجة الرابعة : يمتد الضرر في هذه المرحلة حتى يشمل كل طبقات الجلد بما فيه الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الداخلية ويختفي الألم في هذه المرحلة وعلى العكس من ذلك فإنه يظهر خدر ناتج عن تلف الأعصاب الحسية .
- ٥- الدرجة الخامسة : ويشمل التأثير الحراري في هذه الدرجة كل طبقات الجلد مع الأنسجة والعضلات التي تليه .
- ٦- الدرجة السادسة : وتسمى هذه المرحلة بالتفحم حيث أن التأثير الحراري يصل الى الانسجة والعضلات وحتى العظام وفي هذه المرحلة غالباً ما تكون هناك خلفية جنائية، فيقوم الجاني بعد قتل ضحيته بحرقها حتى يخفي معالم الجثة وسبب وفاتها الحقيقي، ولذلك فإن الطبيب الشرعي عند تعامله مع هذه الحالات من الحروق فإنه يتحرى الدقة في البحث

والتشريح ويقوم بأخذ عينات من سوائل الجثة المتوفرة واحشائها وذلك لتحرري عن السموم والكحول والعقاقير المخدرة والمهذبة . . .

وتكون إحدى هذه الحالات سبباً في حدوث الحروق وخاصة في حالات السكر الشديد بالإضافة إلى التدخين حيث يغلب على المدخنين النعاس تحت تأثير المخدر مما يؤدي إلى حدوث الحريق وتفحم الجثة . كما أن الطبيب الشرعي يبحث عن العلامات الحيوية في الجثة من إصابات حدثت قبل الوفاة كما يبحث عن أول أكسيد الكربون فإذا كانت نسبته تزيد على ١٠٪ في الدم فإن ذلك يعني أن الشخص قد كان على قيد الحياة وأما إذا كانت النسبة أقل من ذلك أو صفر فإن ذلك يعني أن الشخص كان قد فارق الحياة وقت حدوث الحريق أو قبلها كذلك في هذه المرحلة قد يشاهد الطبيب أثناء التشريح وجود كسور بالعظم وخاصة في الجمجمة وهذه تكون غير حيوية وبسبب الحروق وقد تثير شبهة وقوع جريمة وكذلك قد يشاهد الطبيب نزيف داخل الجمجمة فوق الأم الجافية (Extradural Hematoma) وتتميز بلونها الشيكولاتي وحتى نتأكد من أنها حدثت بسبب الحريق فإن ذلك يتبين من خلال قياس نسبة أول أكسيد الكربون فيه، فإذا كانت ظاهرة قبل الوفاة فيجب أن تكون نسبة أول أكسيد الكربون في الدم مساوية لنسبته في التجمع أو النزيف الدموي فوق الأم الجافية.

كما أن شدة الحروق واضرارها بالجسم تعتمد على مساحة انتشارها بالجسم فكلما زادت نسبة انتشارها كلما كانت الخطورة فيها اشد واحتمالات الوفاة فيها اكبر وخاصة عند الأطفال وتقسم هذه النسب في الجسم كالآتي :

١. الرأس والعنق ٩ ٪
٢. الجذع من الامام ١٨ ٪
٣. الجذع من الخلف ١٨ ٪
٤. الأطراف العلوية لكل منها ٩ ٪ = ١٨ ٪ الطرفين العلويين
٥. الاطراف السفلية من الأمام ١٨ ٪

٦. الأطراف السفلية من الخلف ١٨٪

٧. منطقة العانة ٦٪

أسباب الوفاة بالحروق النارية :

ان حدوث الوفاة بالحروق قد يكون سريعاً ومباشراً بعد حدوث الحروق، وقد تحدث في وقت متأخر بعد مرور مدة من الزمن على حدوث الحروق، وأهم هذه الأسباب هي :

١- الصدمة العصبية (Neurogenic Shock) : وهي نتيجة الألم الشديد الذي يرافق حدوث الحروق وخاصة بالدرجة الأولى والثانية بنسبة عالية من مساحة سطح الجسم .

٢- الصدمة السوائلية (Hypovolemic Shock) : وقد تحدث نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل حيث ان الحروق وخاصة بالدرجة الثانية والثالثة تنضح كميات كبيرة من السوائل مما يؤدي الى قصور عمل القلب وهبوطه الحاد مما يؤدي الى الوفاة .


٣- الاختناق : يحدث نتيجة انسداد المسالك التنفسية بالشوائب وتأثير الدخان والغازات على المسالك التنفسية وتكون وذمة شديدة بالبلعوم مما يؤدي الى الاختناق والوفاة .

٤- التسمم : ويحدث بفعل الغازات الناتجة عن الحروق وخاصة اول اكسيد الكربون حيث ان قوة ارتباطه بخضاب الدم عالية جداً وتفوق الأكسجين بأكثر من ٢٥٠ مرة، كما ان غازات اخرى قد تنتج عن احتراق بعض المواد مثل السيانيد (غاز السيانونر) مما يؤدي الى الوفاة السريعة .

٥- انتان الدم : وهي حالة تسمم او تجرثم الدم حيث ان مقاومة الجسم تضعف في حالة الحروق وتعرض بعض المناطق المصابة للجراثيم

بسهولة مما يؤدي الى اصابة الحروق بالتهاب والحمج ومنطقة الحروق تعتبر بيئة جيدة لنمو وتكاثر الجراثيم ويصعب السيطرة عليها في حال حدوثها الى انتشارها في الدم وحدث الوفاة .

٦- هبوط الكلى الحاد : وتعتبر من اهم المضاعفات اللاحقة للحروق بسبب فقدان كميات كبيرة من السوائل وحدث الصدمة (Shock) مما يؤدي الى حدوث الوفاة .



« حالة حروق نارية وصلت الى درجة التفحم »

٢- الحروق السلقية :

وتنتج هذه الحروق عن التعرض للسوائل ذات الحرارة العالية او البخار وتتميز الحروق السلقية بما يلي :

أ- تكون عادة على درجتين :

١. الدرجة الأولى : هي نفس الحالة كما هو في الحروق النارية وتتميز بالإحمرار الذي يصيب البشرة الخارجية من الجلد ويتمثل بالإحمرار وتكون مؤلمة جداً وتشفى عادة بدون ترك أثر لندب او غيرها .

٢. الدرجة الثانية : وتتميز هذه الدرجة بالأضرار الجسمية الناتجة عن التفاعل الحراري الذي يصيب الطبقات الخارجية والداخلية للجلد مع ظهور فقاعات على سطح الجلد وتسليخات في بعض الأماكن واحمرار اشد وتكون مؤلمة وقد تترك اثار بعد شفائها بوجود ندب مكان الحروق .

ب- تكون الحروق السليقة رطبة .

ج- يكون الشعر رطب ولا نشاهد اي حرق او شعط فيه .

د- تكون عادة خالية من الشوائب او الشحار .

هـ- لا يصاحبها اختناق او تسمم بالغازات .

اسباب الوفاة بالحروق السليقة :

١- الصدمة العصبية (Neurogenic Shock) : نتيجة الألم الشديدة المصاحبة للحروق وخاصة اذا كانت نسبة الانتشار في الجسم عالية .

٢- الصدمة السائلة (Hypovolemic Shock): وتحدث نتيجة فقدان كميات كبيرة من السوائل في حال عدم اسعاف المصاب او التأخر في اسعافه .

٣- انتان الدم (Septicemia) : وهي ناتجة عن التهاب الحروق وخمجها مما يؤدي الى تجرثم الدم وحدوث الصدمة الانتانية (Septic Shock) وتتميز الجثة بلونها الباهت المصفر مع احتقان شديد بالأحشاء ونزف بالغدد الكظرية (الفوق كلوي) .

٤- هبوط الكلى الحاد : وذلك نتيجة لفقدان كميات كبير من السوائل وحالة الصدمة التي تصيب الجسم..

اما بالنسبة لظروف حالات الحروق السلقية فأغلبها تكون عرضية (Accidental) وخاصة بين الأطفال اثناء لعبهم وعيشتهم مما يؤدي الى انسكاب السائل المغلي عليهم او سقوطهم فيه، وكذلك تحدث مع النساء والفتيات المراهقات اثناء عملهن بالمطبخ وقد تحدث اثناء الحمام ونادراً ما تكون جنائية او انتحارية مثل الحروق النارية .

٣- الحروق الكيميائية (Chemical Burn) :

وتحدث هذه الأنواع نتيجة التعرض للمواد الكيميائية وتفاعلها مع الماء الموجود بالجلد مما يؤدي الى انتاج حرارة عالية جداً وتزداد شدتها كلما زادت فترة اتصال التفاعل الحراري مع الجلد وكلما زادت المساحة المتأثرة بالحريق .

وغالباً ما تكون الحوادث عرضية اثناء العمل وخاصة بالمختبرات التي يستخدم فيها المواد الحامضية .

وقد تكون انتحارية وخاصة عن طريق تناول المادة الحامضية او القاعدية، وتتميز هذه الحالات بوجود حروق بالفم والبلعوم والمريء والمعدة . وقد تكون بعض الحالات جنائية عن طريق سكب هذه المواد على الضحية في محاولة لتشويه الشخص او احداث اضرار فيه بقصد الايذاء . وكذلك قد يستخدمها الجاني في محاول لإخفاء معالم ارتكاب جريمة قتل .

وتتميز كذلك هذه الأنواع من الحروق من رائحة المواد الكيميائية التي تكون عالقة بالجلد او بالملايس لذلك على الطبيب الذي يتعامل مع مثل هذه الحروق ان يأخذ عينات من المادة العالقة بالجسم وارسالها الى المختبر لمعرفة نوع المادة .

وأهم اسباب الوفاة في هذا النوع من الحروق هي الصدمة العصبية، وذلك لشدة الألم الناتج عنها وقد تحدث الوفاة لاحقاً نتيجة المضاعفات التي تحدث مثل انتان الدم وهبوط الكلى وغيرها .

٤- الحروق الكهربائية (Electrical Burn) :

تختلف الحروق من درجة الى درجة أخرى حسب شدة التيار الذي أحدثها، فهناك التيار الكهربائي المنخفض وهناك التيار الكهربائي ذو الضغط العالي والأخير قد يؤدي الى تفحم الجسم .

وتتميز هذه الحروق بوجود مدخل للتيار الكهربائي في مكان التماس الأولي للجسم ومخرج للتيار في مكان التفريغ وعادة يكون الجزء المتصل بالأرض فنشاهد جرح مدخل التيار الكهربائي في اليد على سبيل المثال على شكل بقعة بيضاء ويحيط فيها هالة حمراء مع وجود اثر للمادة الواصلة للتيار في مكان الاصابة مثل اسلاك معدنية وقد لا نشاهد في بعض الحالات مدخل ومخرج او اية علامات اخرى لحروق كهربائية وفي مثل هذه الحالات للحروق الكهربائية يتم تشخيصها ظرفياً بعد استبعاد اية اسباب اخرى للوفاة وذلك من خلال التشريح الدقيق للجثة وأخذ العينات اللازمة للتحري عن أية مواد سمية أدت أو ساهمت في حدوث الوفاة .



حالة حروق نارية متفحمة لطفل

الوحدة الخامسة
الجرائم الجنسية

- تعريف الجرائم الجنسية .
- جريمة الاغتصاب .
- جريمة الزنا .
- جريمة السفاح .
- جريمة هتك العرض «اللواط» .
- البيئة الطبية في الجرائم الجنسية .
- غشاء البكارة وأنواعه .
- الأمراض الجنسية .
- الشذوذ الجنسي وأنواعه .

الجرائم الجنسية

يقصد بالجرائم الجنسية كل فعل جنسي يقع على الإنسان بغض النظر عن جنسه ذكراً كان أم أنثى أو عمره صغيراً أو كبيراً بطريقة غير مشروعة . وقد تعمدنا تسميتها بالجرائم الجنسية خلافاً لما يرد في معظم الكتب العلمية الطبية بتسميته الاعتداءات الجنسية وذلك لأنه ليس كل جريمة جنسية تتم بالإعتداء، فهناك الكثير من الجرائم الجنسية تتم بالرضا بين الطرفين على الرغم من ذلك تعتبر جريمة في نظر القانون .

وأهم الجرائم الجنسية التي سنبحثها في هذا الباب في الجرائم التي للطب الشرعي دور في الكشف عنها وإثباتها وهي :

- ١- جريمة الاغتصاب .
- ٢- جريمة الزنا .
- ٣- جريمة السفاح .
- ٤- جريمة هتك العرض (الواط) .

جريمة الاغتصاب

١- يعرف الاغتصاب على انه واقعة ذكر بالغ لأنثى غير زوجته حية بدون رضاها، وقبل ان نبدأ البحث في جريمة الاغتصاب فإننا نورد اهم المواد المتعلقة بهذه الجريمة في قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ :

المادة ١/٢٩٢ من واقع انثى (غير زوجة) بغير رضاها سواء بالإكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

٢- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها يعاقب بالإعدام.

المادة ٢٩٣ من واقع انثى (غير زوجة) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة ٢٩٤ من واقع انثى (غير زوجة) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هذا ويتبين لنا ان اركان عملية الاغتصاب فيما يلي :

١. **مواقعة ذكر لأنثى :** ويقصد ادخال العضو الجنسي الذكري في العضو الجنسي الأنثوي المخصص له وان ادنى درجات المواقعة التي تدخل ضمن تعريف المواقعة هي اختفاء الحشفة بين الشفرتين، والحشفة هي رأس القضيب وعدم دخول القضيب بالمهبل لا يعتبر مواقعة وعليه فإذا فقدت العملية احد أركانها فإنها لا تعتبر جريمة اغتصاب وتتحول الى قضية هتك عرض كما ان الشرط بالمواقعة ان يكون بين الذكر والأنثى في جريمة الاغتصاب .

٢. **غير زوجة :** ويقصد بذلك انها غير زوجة الجاني أي غريبة عنه ولا تحل له مواقعتها فالجنبي عليها غير زوجة الجاني وذلك ان مواقعة الزوجة ولو كان بدون رضاها فإنه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الأردني إلا ان هذا الفعل في بعض الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جريمة اغتصاب اذا كانت خارج عن إرادة الزوجة .

وقد يفهم البعض ان المقصود بكلمة (غير زوجة) اي غير متزوجة فمواقعة المرأة المتزوجة من شخص غريب ولو بانعدام الرضا لا يعتبر اغتصاباً وانه يجب ان تكون الجنبي عليها متزوجة حتى يعتبر الفعل اغتصاباً . ونقول لهؤلاء بأن هذا التأويل غير صحيح وغير منطقي وذلك وجب على المشرع ان يوضح هذا الأمر حتى يكون مفهوم من الجميع .

٣. انعدام الرضا : وقد اوضح ذلك المشرع في نص المادة ٢٩٢/١ سواء كان بالإكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع .

والإكراه أنواع فقد يكون في اغلب الاحيان باستخدام القوة واشكال الشدة والعنف ويتمثل ذلك بالآثار السلبية التي يحدثها الجاني على جسم ضحيته حتى يتمكن منها بعد ان تفقد قواها ومقاومتها له ونشاهد في هذا المضمار كدمات مختلفة الاشكال والاحجام في مختلف انحاء الجسم ونشاهد كذلك انواع من السحجات على الوجه حول الأنف والقم وعلى الساعدين وكذلك الفخذين وخاصة في المناطق الداخلية الانسية للفخذين وعلى شكل سحجات ظفرية . أما بالنسبة للتهديد فإنه بالعادة لا يترك أثراً على جسم الضحية وذلك بسبب استسلام الضحية للجاني بدون مقاومة بعد تهديدها سواء بالقتل بالسلاح الناري او السكين او بقتل عزيز عليها مثل ابنها او شقيقها او احد والديها او بفضح سر من اسرارها هو على علم به او غير ذلك من اشكال التهديد .

أما الخداع فله صور كثيرة فقد يقوم الجاني بإعطاء وعود ومغريات كثيرة لضحيته حتى يتمكن منها او يقوم بإجراء لأنواع شتى من الحيل حتى يتمكن منها ويقوم بجريمته ومن ذلك ان يقوم بوعدها بالزواج وهناك نص على هذه الحالة :

المادة ٣٠٤/١ كل من خدع بكرة تجاوزت الخامسة عشر من عمرها بوعد الزواج ففرض بكارتها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ويلزم بضمان بكارتها .

٢. الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعود الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة .

ومن أمور الخداع ايضاً تسلل الجاني الى فراش المجني عليها اثناء استغراقها بالنوم وظنها بأنه زوجها وعندما تستيقظ تفاجأ بأنه شخص غريب وتسمى

هذه الحالة (Impersonation) وهناك اشكال كثيرة على الحيلة والخداع لا يمكن حصرها ويترك امر تقييسها الى المحكمة التي تنظر في القضية . كذلك فإن صغر السن يعد عنصراً أساسياً لانعدام الرضا وذلك لأنها لا تملك حق الرضا والتصرف اذا كانت دون سن الثامنة عشرة من عمرها وذلك من خلال القاعدة القانونية المعروفة بأن الفعل الذي يقوم به الشخص تحت سن الثامنة عشرة من عمره ضد مصلحته يعتبر باطلاً ولا يعتد به بما في ذلك البيع . وفي هذا المجال فإن موافقة انثى دون سن الثامنة عشرة يعتبر فعلاً ضد مصلحتها ولذلك فهو يعتبر اغتصاباً حتى ولو كان برضاها ونصت على ذلك ايضاً المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ :

الفقرة الثانية : كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها عوقب بالإعدام . وكذلك المادة ٢٩٤ - من واقع انثى (غير زوجة) اكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . وقد اعتبرت محكمة التمييز في احدى قراراتها في قضية كانت ضحيتها فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وحكمت فيها محكمة الجنايات الكبرى بنص المادة ٢/٢٩٢ . ان محكمة الجنايات أخطأت في حكمها واعتبار السن من اركان الاغتصاب وذلك على اعتبار الرضا في هذه الحالة لا يعتد به وردت محكمة التمييز على ذلك بأن السن هو عنصر مشدد في مثل هذه الجرائم ولا يعتبر ركناً من اركان الجريمة على الأسس التالية :

١- ان الاغتصاب بإجماع الفقه والقضاء هو موافقة انثى موافقة غير شرعية بغير رضاها وانعدام الرضا هو ركن في جريمة الاغتصاب . فإذا حصل الرضا فلا تعد جريمة اغتصاب .

٢- ان صغر السن في جريمة الاغتصاب ليس ركناً في الجريمة بل هو ظرف مشدد لها وان المقصود برضا المجني عليها في هذا النوع من الجرائم هو التعبير المطلق عن إرادة القبول وهو امر لا علاقة له بالسن او العجز الجسدي او النقص النفسي وقد افرد المشرع لهذه الحالات نصوصاً خاصة

بها ولم يعتبرها من حالات انعدام الرضا او الاكراه التي يحكمها نص واحد .

٣- يتبين من نص المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات بالصيغة المعدلة في القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ ان المشرع عالج في القانون المعدل جريمة واقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل الثامن عشر برضاها وسها عن معالجة جريمة واقعة انثى لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها برضاها والتي كانت الفقرة الثانية منها قبل التعديل تغطيها وعلى ذلك يعد من جرائم الواقعة صدور القانون المعدل رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ نص يعالج هذه الدعوى في هذا الباب وحيث يفترض في فعل الواقعة وقع المساس بالعورة على صورة هتك العرض فيكون الأدنى المتيقن في فعل الواقعة لأنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها برضاها ينطبق على احكام المادة ١/٢٩٨ من قانون العقوبات التي تنص على :

كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكر او انثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره او حملته على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

وحيث ان هذا التكيف لا يحق التناسق والتدرج في مقدار العقوبة تبعاً لشدة الظروف اذ تصبح عقوبة واقعة الانثى اتمت الخامس عشرة بالمادة ٢٩٤ عقوبات معدلة اشد من عقوبة واقعة انثى دون سن الخامسة عشرة بموجب التكيف المشار اليه . إلا أنه لا يوحد في القانون او الفقه الجزائية انه لا عقوبة بلا نص ولا يجوز عمل الاجتهاد او القياس في هذه الخصوص وعلى ذلك فعلى محكمة الجنايات الكبرى ان تطبق المادة ١/٢٩٨ عقوبات على فعل الجاني مع مراعاة المادة ١/٣٠١ ب كظروف مشدد لاقراره بفض البكارة .


ونود ان نبين على الرغم مما ورد سابقاً في قرار محكمة التمييز الموقرة بأن السن والضعف او العجز الجسدي او النفسي او العقلي لا يعتبر من اركان انعدام الرضا وانها عناصر مشددة للعقوبة وبما انها تعتبر ظروف مشددة للعقوبة

فمن ذلك يتضح انها بالأصل مخالفة للقانون وإن التخلف العقلي قد يفقد الإنسان أهليته لاعطاء او ابداء الموافقة او الرضا في مثل هذا النوع من الجرائم لذلك فإن الأوجب اعتبار الفعل بدون الرضا ذلك حسبما جاء في قرار محكمة التمييز المقصود به في هذا النوع من الجرائم هو التعبير المطلق عن إرادة القبول وفي هذه الحالات لا يوجد أصلاً أي تعبير ضمنني على الموافقة لذلك فقد اعتبر المشرع ان الموافقة في مثل هذه الحالات تستوجب عقوبة اشد مشدداً بذلك العقوبة .

البيئة الطبية في جرائم الاغتصاب

تعتمد البيئة الطبية على معاينة المجني عليها والجاني فيجب عرض كل منهما على الطبيب ليقوم بمعاينتهم واثبات الجريمة او نفيها . ويقوم الطبيب باستجواب المجني عليها وطرح العديد من الاسئلة ثم يتركها تسرد ما حدث معها بعد ان تطمئن له وثق بأنه استجواب طبي لا علاقة له بالتحقيق وأثناء حديثها يدون الطبيب بعض الملاحظات مثل حالتها العقلية او النفسية من حيث تملكها لوعيها واتزانها في الزمان والمكان وعليه ان ينتبه اذا ما كانت تحت تأثير مادة مخدرة او مهدئة او متناولة للكحول ثم ملاحظة الطبيب طريقة تصرفها، هل تتصرف بحياء ام انها لا تبالي في الحديث، وبعد ان تنتهي من سرد ما حدث معها يشرح الطبيب ما سيقوم به من فحص يأخذ موافقتها على الفحص كتابة او شفويّاً بعد ذلك يقوم بمعاينتها وفحصها بوجود ممرضة مساعدة ويلاحظ طريقة خلع الملابس بحياء او بشكل عادي وبعد ذلك يقوم بفحص الملابس باحثاً عن علامات الشدة والعنف فيها وعن اية علامات او مواد مشتبّه بها من بقع منوية او مواد اخرى او بقع دموية او اعشاب او اترية تتفق مع المكان الذي حدثت فيه الجريمة حسب الرواية ام لا، ثم بعد ذلك يطلب من الجهة المرافقة لها بإحضار ملابس بديلة لها ويقوم بالتخفظ على الملابس والتحرّيز عليها وارسالها الى المختبر الجنائي مع العينات الأخرى .

بعد ذلك يقوم الطبيب بفحص المجني عليها فيدون اي علامات شدة او عتف او اية اصابات او علامات يشاهدها على جسم المجني عليها ذاكراً طبيعتها وحجمها وموقعها والأداة المسببة لها وعمر الإصابة فيما اذا كانت تنفق مع الواقعة ام لا، ثم بعد ذلك يقوم بفحص الاعضاء التناسلية واصفاً اياها من الخارج والداخل وعليه ان يبين فيما اذا كانت ناضجة مكتملة النمو او طفولية غير ناضجة وعليه ان يبين اية علامات او اصابات يشاهدها حول او على الاعضاء التناسلية وعليه ان يذكر اذا كان هناك اي تشوه خلقي في الاعضاء التناسلية ام لا فهناك حالات من التشوهات الخلقية في الاعضاء التناسلية تمنع حدوث الواقعة الجنسية بل من المستحيل ان تكون حدثت . وهذا يكون دليل على عدم حدوث الواقعة وفقدان الجريمة ركناً اساسياً منها، بعد ذلك يقوم بفحص الاعضاء التناسلية من الداخل ويصفها من حيث وجود اية علامات او اصابات او مواد تدل على وقوع الفعل ام لا، فيقوم بوصف غشاء البكارة وصفاً دقيقاً تفصيلياً فيصف بعده الى داخل المهبل مقدراً مسافة بعده عن مدخل المهبل وبعد ذلك يصف شكله وتركيبته فيما اذا كان لحمياً او



علامات قُبْل على الصدر والرقبة (Kissing or Love Bite)

غضروفياً ثم يصف جداره من حيث سماكته وارتفاعه عن جدار المهبل ويصف حوافه من الداخل فيما اذا كانت حادة مشرشرة ويصف فتحة الغشاء واتساعها ومقدار قطر الفتحة واخيراً يذكر اذا كان هناك اي تمزق في الغشاء حديث او قديم، واذا كان هناك تمزق حديث عليه ان يقدر عمر هذا التمزق تقريباً ويصف موقعه بالنسبة لميناء الساعة وبذلك يكون غطى هذه الناحية من جميع جوانبها مما يتيح للطبيب الاجابة على اي استفسار قد يطرح فيما بعد، ومن هذه الاستفسارات :

هل من الممكن ان تكون الواقعة حدثت (بأدنى درجاتها وهي اختفاء الحشفة بين الشفرتين) دون الوصول الى غشاء البكارة ؟ ويجب على ذلك بعد الغشاء عن فتحة المهبل الى الداخل فإذا كانت المسافة صغيرة كان ذلك يعني عدم دخول القضيب الى فتحة المهبل .

هل من الممكن ان تكون حدثت الواقعة دون تمزق غشاء البكارة ؟

ويجب على ذلك قطر فتحة المهبل واتساعها فيما اذا كانت تسمح بدخول القضيب من خلال فتحة المهبل دون تمزق ام لا .

هل التمزق اذا كان هناك تمزق قديم ام حديث عمره ؟

يتبين ذلك خلال بيان الطبيب لوجود تمزق ام لا فيما اذا كان حديثاً أو قديم وعمر التمزق فيما اذا كان يتفق وتاريخ الواقعة ام لا .

وبعد ذلك يأخذ الطبيب مسحات مهبلية من داخل المهبل ومن فتحة المهبل ومن حولها ويتحرز عليها ويرسلها مع العينات الأخرى الى المختبر الجنائي طالباً التحري عن وجود حيوانات منوية ام لا ونوع وفصيلة دم الشخص القادمة منه ان وجدت ومن الممكن ايضاً اجراء اختبار فحص البصمة الكروموسومية عليها لبيان مصدرها ومقارنتها مع المشتبه به او بهم وهذا ما يسمى بفحص (DNA Fingerprinting) واخيراً يقوم الطبيب بتنظيم تقرير طبي مفصل بما قام به من فحص مشيراً الى الجهة ذات العلاقة التي طلبت منه اجراء الفحص ونتائج الفحوصات التي اجراها والنتيجة، وبعدها يقوم بأخذ

بصمة المجني عليها ويثبتها على رأس التقرير وذلك كوسيلة للاستعراف وإثبات ان التي تم فحصها هي نفس الإنسانية المعنية او المقصود فحصها حتى لا يظن احد بان التي تم فحصها هي انسانة ثانية وينهي بذلك الطبيب بينة رئيسية للمحكمة تجيب على استفسارات عديدة .

ونود ان نبين في هذا البحث انواع اغشية البكارة :

اغشية البكارة تنقسم من حيث البنية الى ثلاثة انواع هي :

أ. الغشاء الرقيق الغشائي .

ب. الغشاء اللحمي .

ج. الغشاء الغضروفي .

اما من حيث شكل فتحة غشاء البكارة فإنها تنقسم الى الاشكال التالية :

١- الغشاء الحلقي : وتكون شكل الفتحة حلقية وتختلف اتساعها من فتاة الى اخرى وتتراوح بين حجم رأس الدبوس وحتى الاصبعين وفي الحالات التي تسمح بدخول او ايلاج من خلال الفتحة الواسعة دون تمزق سميت بالأغشية المطاطية وهذه تسمية غير علمية اذ أنه لا يوجد شيء يدعى مطاطي وانما واسع الفتحة .

٢- الغشاء الهلالي : وهذا النوع تكون فتحته على شكل هلال او نصف دائرة وتختلف حجم الفتحة ايضا في هذا النوع من فتاة الى اخرى .

٣- الغشاء الجسري (ذو المصراعين) : ويكون هذا النوع من الاغشية ذو فتحتين تفصل بينهما جزء من الغشاء على شكل جسر وهذا النوع من الاغشية غالبا ما تمزق عند المواقعة الجنسية .

٤- الغشاء الغربالي : وهذا النوع من الاغشية يكون ذو عدة فتحات صغيرة تنتشر من خلال الغشاء على شكل غربال وهذا النوع لا بد وان يتمزق عند المواقعة الجنسية .

٥- الغشاء (الرتق) : وهذا الغشاء يغلق فتحة المهبل بالكامل بحيث لا يوجد أية

فتحة تسمح حتى بمرور دم الطمث عند سن البلوغ وعادة يكشف مثل هذا النوع في هذا السن حيث يتجمع دم الطمث مما يستدعي استشارة الطبيب ويتم إعادة احداث فتحة فيه للسماح للدم بالتزول من خلاله .

٦- الغشاء المشرشر الحواف : ويكون ذو حواف مشرشرة واسع الفتحة عادة وقد يسمح بإيلاج في الواقعة الجنسية دون تمزق .
أما من حيث اتساع الفتحة، فإن اغشية البكارة تنقسم الى ثلاثة اقسام وهي :

أ- اغشية ضيقة الفتحة : وهذا النوع وبكونه ذو فتحة ضيقة لا تسمح بإدخال أكثر من حجم اصبع الخنصر عبره وهذا النوع لا بد وان يتمزق عند الواقعة الجنسية وهو الأكثر رمزاً للعذرية عن غيره من الأنواع (انواع اغشية البكارة) .

ب- اغشية متوسطة الفتحة : وهذا النوع من الاغشية يسمح بإدخال جسم ذو حجم بقدر الإبهام وهذا النوع من الممكن ان يتمزق اثناء الواقعة الجنسية ومن الممكن ان يبقى سليماً دون تمزق لذلك لا يمكن الجزم بالعذرية في هذه النوع من الاغشية إلا اذا تمت المقارنة مع حجم القضيب للشخص المدعى عليه .

ج- اغشية ذات فتحة واسعة : وهذا النوع يكون ذو فتحة واسعة تسمح بإدخال أكثر من اصبعين من خلال فتحة الغشاء دون تمزق الغشاء وغالباً هذا النوع لا يتمزق بالممارسة الجنسية .



غشاء بكارة حلقي الشكل سليم من أي تمزق

• اسباب عدم تمزق غشاء البكارة بالمواقعة الجنسية :

١- الإيلاج غير التام للقضيب الى داخل المهبل والذي لا يتجاوز حدود غشاء البكارة وخاصة اذا كان عمق الغشاء في داخل المهبل عميقاً وخصوصاً عند الإناث السمينات .

٢- الإيلاج التام للقضيب عبر فتحة غشاء البكارة الواسع بشكل كبير او الحلقي الواسع المشرشر الحواف الذي يسمح بالتمدد دون ان يتمزق .

٣- الإيلاج التام للقضيب عبر فتحة غشاء البكارة معتدل الفتحة وذلك بسبب صغر حجم القضيب المنتعظ بحيث يكون قطره مقارب لقطر الفتحة الغشائية او اصغر منها .



غشاء بكارة حلقي الشكل سليم ذو فتحة ضيقة

معاناة الرجل (المدعى عليه) :

لقد اثّرنا دوماً أنه يجب مراعاة أهمية فحص الشخص المدعى عليه بنفس الأهمية للأنتى المجني عليها وذلك لما لذلك من أهمية كبيرة في اثبات الواقعة وبيان الأدلة على حدوثها ويجب فحص المدعى عليه بنفس الطريقة فحصاً كاملاً كما هو الحال بالنسبة للمجني عليها بدأً بالملايس وما علق بها من آثار من مكان وقوع الجريمة أو وجود بقع دموية قد تعود للمجني عليها وكذلك على وجود أي آثار لشدة أو عنف من آثار المقاومة أو ما علق به من جسم المجني عليها وحسب نظرية ريكاردو (ان أي تماس بين جسمين لا بد ان يترك احدهما أثراً على الآخر) مثل شعر أو وبر وغيره وبعد ذلك يتم معاناة جسم المدعى عليه وبيان ما فيه من اصابات وآثار المقاومة تدل على الشدة والعنف وكذلك يجب معاناة اعضاءه التناسلية من حيث وجود تشوهات خلقية في شكل القضيب او حجمه مما لا يسمح بالانتعاظ او الممارسة الجنسية

مما ينفي حدوث الواقعة الجنسية من الشخص المدعى عليه، وكذلك ممكن ان تثبت المعاينة الطبية للمدعى عليه نوعان من العلامات :

أ. علامات عامة : وتشمل الاصابات المختلفة من سحجات (خدوش) وكدمات على جسم الجاني في مواقع مختلفة تتوافق وطبيعة وشدة المقاومة التي حدثت اثناء الجريمة .

ب- علامات موضعية : على الأعضاء التناسلية فقد نجد آثار واقعة جنسية من سائل منوي على العانة والقضيب وسائل مهبلي على القضيب وحوله خلايا ظهارية من بطانة المهبل على القضيب وذلك من خلال المسحات التي تؤخذ كعينات من القضيب وما حوله .

هتك العرض

يعرف هتك العرض : بأنه كل فعل جنسي ما دون الواقعة واقله الملامسة ويشمل كذلك اللواط او الواقعة الشرجية . ودور الطبيب الشرعي في مثل هذا النوع من الجرائم محدود ويقتصر على فعل هتك العرض باللواط .

اللواط (الواقعة الشرجية) : ويقصد به واقعة ذكر لذكر او ذكر لأنثى من خلال فتحة الشرج . وأما مواد القانون التي نصت على هذه الجريمة في قانون العقوبات الأردني فهي من المادة (٢٦٩) الى (٢٩٩) وتبين لنا جريمة هتك العرض من الممكن ان تكون بالرضا او بغير عنف او تهديد ومن الممكن ان تكون بانعدام الرضا بالعنف والشدة او الحيلة والخداع وعلى جميع الأحوال فإن هتك العرض غالباً لا يترك اثرأ كبيراً والآثار التي يتركها تزول عادة في وقت قصير .

تظهر علامات هتك العرض من خلال المعاينة الطبية للمجنني عليه على هذا الشكل :

أ. علامات عامة : وخاصة اذا كان الفعل تم بالشدة والعنف وتكون هناك

اصابات مختلفة من سحجات كدمات على جسم المجني عليه بأشكال مختلفة ومتعددة وفي مناطق مختلفة من الجسم .

ب. العلامات الموضعية : ونقصد بها العلامات التي يشاهدها الطبيب حول فتحة الشرج وفي داخلها وتمثل هذه العلامات بما يلي :

١- الاحمرار : وهو علامات حيوية وحديثة تدل على الاحتكاك بين الجسم الصلب الراض كالقضيبي في حالة الانتصاب او ما في حكمه مع فتحة الشرج وهذا يزول عادة سريعاً في غضون ساعات قليلة ويكون ايضاً ناتج عن حالات مرضية معينة مثل الاسهال الشديد او الديدان الشعرية والحكة والحساسية الشرجية .

٢- التمزق : او التشقق في جدار او بطانة فتحة الشرج وهذا التشقق قد يكون اصابياً ناتجاً عن عملية المواقعة الشرجية في الحالة الأولى ويسمى الشق الشرجي الجراحي ويكون عادة موقعه في المنطقة الخلفية من فتحة الشرج في منطقة الساعة الثانية عشرة من مياء الساعة ويكون قديماً مزمناً محاط بتليف ومنطقة بيضاء ولا يصاحبه علامات اخرى مهمة مثل التكدم والعلامات الحيوية الاخرى .

اما التمزق الناتج عن المواقعة الجنسية فيكون في اي مكان من فتحة الشرج ويكون حديثاً وفيه العلامات الحيوية ويرافقه اصابات مثل التكدم في فتحة الشرج مع توسع فتحة الشرج وارتخاء العضلة العاصرة الشرجية واختفاء الثنايا والمنعكسات الشرجية .

٣- توسع فتحة الشرج : بعد المواقعة الشرجية وخاصة المتكررة تتوسع فتحة الشرج وتبدو واسعة وقد يشاهد الطبيب الاست من خلالها وفي حال التكرار او التعود في حالات الشذوذ الجنسي فإنها تتوسع بمجرد أخذ وضعية الفحص بشكل لا إرادي انعكاسي عصبي وقد تكون على شكل فتحة قمعية مع ارتخاء شديد بالعضلة .


٤- اختفاء الثنايا الشرجية : تختفي هذه الثنايا في بطانة فتحة الشرج

وتنمىح بسبب تكرار الواقعة ونتيجة الاحتكاك المستمر بين القضيب المتعظم وبطانة الشرج وهذه علامة تكرار الفعل .

٥- المتعكسات الشرجية : تختفي المتعكسات الشرجية او تقل للمؤثرات الخارجية بحيث لا تتفاعل معها وتبقى في حالة إرتخاء ولا تنقبض وهذه علامة ايضاً على الواقعة الحديثة والقديمة .

وعلى جميع الاحوال يجب ان تتوفر العلامات الموضعية حتى تكون قرينة على وقوع الفعل وتبقى كذلك لا ترقى الى درجة الدليل إلا بوجود الحيوانات المنوية في فتحة الشرج او حولها وإثباتها عن طريق الفحص المخبري ومعرفة نوع وفصيلة دم الشخص القادمة منه واجراء فحص الكرموسومات لإثبات مصدرها وعلاقتها بالمدعى عليه .

وهنا يجب الإشارة الى ان فعل هتك العرض في مثل هذه الجريمة (الواقعة الشرجية) لا يشترط فيها ايلاج القضيب في فتحة الشرج حتى يشكل جريمة وانما ملاسة القضيب لجسم المجنى عليه يعتبر فعل هتك عرض .



توسع وتليف في محيط فتحة الشرج وفتحة ذات شكل قمعي ناتج عن تكرار اللواط

أنواع الشذوذ الجنسي

- ١- السفاح : وهو المواقعة الجنسية بين الأصول والفروع ممن هم محرمون شرعاً مثل الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وابن الأخ وابن الأخت وغيرهم . وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون ولا تلاحق إلا بشكوى من احد الأشخاص الواقعة عليهم الجريمة او احد الاقارب حتى الدرجة الرابعة . وفي اغلب الحالات التي تعاملنا معها من خلال الطبيب الشرعي كانت شكوى كيدية لا اساس لها من الصحة ولكن هناك كثير من الحالات الصحيحة وتم اثباتها وعالج قانون العقوبات هذه الجريمة في المواد (٢٨٦) و (٢٨٥) .
- ٢- الاستمناء (نكاح الكف) : وقد يصل الى درجة الافراط حتى يصبح مرض نفسي عند بعض الأزواج ويكون من الاسباب التي تستدعي الزوجة طلب التفريق ويتشر هذا النوع من الشذوذ بين الشباب المراهقين قبل سن الرشد والعزاب خاصة .
- ٣- الترجسية (عشق الذات) : ويعشق الشخص في هذه الحالة نفسه ذكراً كان او انثى ويعتبر حالة مرضية نفسية بحتة .
- ٤- الوثنية الشهوانية : وهي بلوغ اللذة الجنسية بالنظر او الحصول على خصوصيات الجنس الآخر من ملابس او ادوات او النظر الى اعضائه التناسلية او لملايسه .
- ٥- اشتهااء الميت : وهي المواقعة الجنسية مع الاموات لبلوغ اللذة الجنسية وقد تحدث عند بعض الشاذين فيقومون بالاجهاز على ضحيتهم ثم بعد موت الجنني عليها يقوم بمواقعتها وهذه اقصى حالات السادية ويثبت بعد ذلك من خلال المعاينة الطبية ان المواقعة الجنسية غير حيوية .
- ٦- الولع بالحيوان : وتتم هذه الحالات عادة مع الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها في المحيط غالباً ما تحدث في المناطق الريفية في دول العالم الثالث مع الحميم والبيغال والقطط اما في دول العالم المتقدم فقد تتم في الحياة المدنية وخاصة مع الكلاب .

٧- عشق الصغار والمسنين : وقد تحدث مثل هذه الجرائم ويكون المجني عليها طفلة صغيرة او امرأة عجوز مسنة وهذه من الوقائع التي تصل الى الطب الشرعي للكشف عليها .

٨- السحاق : وهي الواقعة الجنسية بالمشتهاء المجانس بين الاناث وتتم عادة في المجتمعات النسائية المغلقة مثل السجون النسائية والمعسكرات وسكن الطالبات ولا تصل غالباً مثل هذه الحالات الى الطب الشرعي وتتم عادة بالرضا.

٩- الماسوخية : وهي تقبل الأذى والتعذيب من الطرف المقابل اثناء العمل الجنسي لبلوغ اللذة الجنسية وقد تكون على شكل أذى جسماني او نفسي بالشتيم او التحقير .

١٠- السادية : وهي حالة عكس الحالة السابقة اذ يقوم الفاعل بايقاع الضرر بالطرف الآخر حتى يشعر بالألم ويصل الآخر الى اللذة الجنسية وقد تصل الى التعذيب الجسدي والنفسي الشديدين .

١١- الشبق الجنسي : وهي حالة من الافراض في ممارسة الجنس لدى بعض الاناث الى درجة انها تطلب الواقعة الجنسية في اي وقت وفي اي مكان.

١٢- اللواط المعناد : (Homosexual) .

١٣- الجماعه الفميه : (Oral sex) .

الزنا

الزنا : وهي واقعة ذكر لأنثى غير زوجته برضاها، والزنا من الجرائم الجنسية التي تتم عادة بالرضا ولا يجوز ملاحقة اي من الطرفين إلا بشكوى من الزوج او الولي في حالة عدم وجود الزوج . وهناك شروط للشكوى لإثبات الجريمة نصت عليها المادة (٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٤) من قانون العقوبات الأردني. ودور الطب الشرعي في مثل هذه الجريمة أصعب بكثير من جرائم

الاغتصاب وذلك ان الجريمة تتم بالرضا لذلك من الصعب اثباتها من خلال
العلامات الموضعية او العامة واهم ما فيها من علامات هي اثبات وجود
حيوانات منوية مغايرة للحيوانات المنوية للزوج ومطابقة للشخص المدعى عليه
كشريك في هذه الجريمة .

مضاعفات الجرائم الجنسية

ان جميع الجرائم الجنسية السابق ذكرها في هذه المباحث لها مضاعفات
قد تظهر بعد حدوث مثل هذه الوقائع وتمثل فيما يلي :

١- الحمل غير الشرعي : وقد يحدث الحمل حتى في ادنى درجات الواقعة
وبدون ايلاج القضيب في المهبل او القذف المباشر فيه .

٢- الاجهاض والوضع : وقد تقوم الحامل بمحاولات الاجهاض نفسها عند
معرفة الحمل غير المشروع وقد تصل الى نهاية الحمل وتضع طفل غير
شرعي .

٣- انتقال الأمراض الجنسية : وهذه من اكثر المضاعفات شيوعاً قد تصل الى
درجة الأمراض الخطيرة وأهم هذه الأمراض هي :

أ- السيلان : ناتج عن مكورات السيلان وتنقل العدوى مباشرة وتظهر
خلال يومين الى عشرة ايام .

ب- السفلس : وينتج عن العدوى باللولبيات الشاحبة وفترة حضانتها
من ٢١ يوم الى ثلاثة اشهر وتظهر على مراحل .

ج- القرح الرخو : وتسببها عادة عصبية ذو كربي الناعورية وتظهر
على شكل قرح موضعي محدد في المنطقة التناسلية .

د- الثاليل الزهرية : وقد ترافق بالغالب الامراض الحمجية الاخرى
وخاصة السيلان على شكل حبيبات وتاليل في المناطق التناسلية وقد
تظهر كذلك على فتحة الشرج .

هـ- الورم الحبيبي اللمفي الأري : وهي على شكل قرحة تظهر عادة على سطح الفرج ناتجة عن حمى خبيثة .

و- التهاب الكبد الوبائي : وينتقل عن طريق الحيوانات المنوية او السائل المهبلي وحتى اللعاب .

ز- متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) : وهذا اخطر الأمراض العصرية الناتجة عن الإصابة بفيروس (HIV) ويؤدي الى خلل جهاز المناعة بالجسم وبالنتيجة الوفاة وينتقل عن طريق المواقعة الجنسية أو اللعاب .

٤- افتضاض غشاء البكارة .

٥- الاصابة بحالات نفسية .

الوحدة السادسة الإجهاض

- تعريف الإجهاض .
- الإجهاض غير المشروع .
- الإجهاض الجنحي .
- الإجهاض الجنائي .
- الإجهاض العلاجي .

الاجهاض غير المشروع

يعرف الاجهاض غير المشروع :

بأنه الاجهاض الذي يتم بإجرائه وضع حد للحمل دون سبب مشروع.
هذا ولم يحدد القانون العمر الرحمي للجنين في تعريف الاجهاض وإنما اعتبر انتهاء الحمل في اية مرحلة من عمره يعتبر اجهاضاً على عكس المفهوم الطبي والذي عرف الاجهاض بأنه وضع حد للحمل وانهاؤه ما قبل الأسبوع السادس والعشرون .

ويقسم الاجهاض غير المشروع من النواحي القانونية الى نوعين من الاجهاض :

١ . الاجهاض الجنحي ويشمل :

- أ- اجهاض الحامل لنفسها .
- ب- اجهاض الحامل من قبل الغير برضاها .
- ج- اجهاض الحامل من قبل الغير من دون علم الفاعل بحملها .

٢ . الاجهاض الجنائي ويشمل :

- أ- اجهاض الحامل من قبل الغير دون رضاها .
 - ب- اجهاض الحامل من قبل الغير وهو على علم بحملها .
 - ج- اذا افضي النوع الأول من الاجهاض الجنحي الى وفاة الحامل .
- والقانون الأردني متمثلاً في قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ نص على منع ومعاقبة كل من يقوم بالاجهاض غير المشروع وجاء ذلك في المواد التالية :

٣٢١ ق. ع ١- كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل تعاقب بالحبس من ٦ اشهر الى ثلاث سنوات .

٣٢٢ ق. ع ٢- أ. من أقدم بأية وسيلة كانت على اجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

ب. وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

٣٣٦-٤- من تسبب بإحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة ٣٣٣ بإجهاض حامل وهو على علم بحملها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

٣٢٣ ق. ع ١- من تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشرة سنوات .

٢- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة .

المادة ٣٢٤- تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٣٢٢) و (٣٣٣) للمحافظة على شرف احدى فروع او قريباته حتى الدرجة الثالثة .

المادة ٣٢٥ - اذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيياً او جراحاً او صيدلياً او قابلة يزداد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

البيئة الطبية في الإجهاض غير المشروع :

ويأتي دور البيئة الطبية والفحص الطبي في حالات الاجهاض غير المشروع بإثبات او نفي وجود الحمل أولاً والتحري عن أية علامات أو آثار للوسائل والمواد المستعملة في اجراء الاجهاض .

كما أن معاناة المرأة والجنين من الأسباب الضرورية لبيان وجود اسباب وعلامات مرضية فيهما وعن تشوهات خلقية في الجنين الداعية للإجهاض الطبيعي وتعتبر هذه الاجراءات الضرورية التي يجب ان تسبق اثاره شبيهة الاجهاض غير المشروع .

فهناك الكثير من الأمراض والأسباب في جسم المرأة أو الجنين تؤدي الى الاجهاض التلقائي ويجب ان يفهم ايضاً أن الاجهاض الجنائي أو غير المشروع لا يتم باستعمال أية شدة أو عنف على جسم الحامل وإنما يتم بالشدة والعنف التي تصيب الرحم ومكوناته من عنق أو الجنين أو مشيمة أو السائل الأمينوسي وهذا يتعلق مباشرة بالوسائل المتبعة لإجراء الاجهاض أو الوسائل التي تحدث ضرراً بالغاً بالرحم ومحتوياته والتي لا بد وأن تؤدي بالضرورة الى الاجهاض .

أما الوسائل المتبعة في الاجهاض غير المشروع وما تتركه من آثار في جسم الحامل أو الجنين فإنها تعتمد على خبرة الشخص الذي قام بالاجهاض وعلى ضوء ذلك فإن البيئة الطبية تكون محدودة بالوسائل المستعملة ومحكومة بالخبرة الفنية فيمن يقوم بعملية الاجهاض .

وغالباً ما يتم الاجهاض غير المشروع بوسائل علمية طبية ومن قبل اطباء متخصصين وفي مثل هذه الحالات نادراً ما تكتشف لذلك فإن حالات الاجهاض غير المشروع تعتبر قليلة .

إنما يتم الكشف عن حالات الاجهاض غير المشروع التي تستخدم وسائل بدائية غير علمية وغير معقمة كأن تقوم الحامل بتعريض نفسها لإصابات وكدمات على منطقة البطن والرحم أو تقوم بإدخال مواد غريبة الى داخل الرحم مثل الصابون أو انايب مطاطية أو حقن الرحم بالماء أو اية مواد سائلة أخرى .

أو تقوم المرأة باستعمال مواد وأدوية أو اعشاب تعتقد انها تؤدي الى الاجهاض .

وفي جميع هذه الحالات غالباً ما تؤدي الى مضاعفات خطيرة وقد تؤدي

الى الوفاة نتيجة النزيف الحاد او اتانات الدم او الإصابة بالسدة الدموية والدهنية في اوعية الرئين .

وعلى الطبيب ان يقوم بمعانة المرأة معانة عامة ويبحث عن علامات الحمل الخارجية أولاً لإثبات الحمل أولاً فيقوم بفحص حلمتي الثدي وملاحظة وجود الكلف على وجه المرأة والتشققات الجلدية في البطن والفخذين وترهل البطن ثم يقوم بفحص الأعضاء التناسلية من الخارج ويتأكد من وجود علامات شدة عليها من الخارج نتيجة استخدام وسائل لفتح المهبل ثم يقوم بفحص المهبل من الداخل وعنق الرحم ويتشدد في الفحص في هذه المنطقة بسبب تأثر عنق الرحم بالوسائل المستخدمة ويتأكد من أن عنق الرحم مفتوح أو مغلق. بعد ذلك يقوم الطبيب بإجراء فحص الحمل للمرأة ويبقى هذا الفحص ايجابي عادة مدة لا تقل عن الأسبوعين في حال حدوث الإجهاض في فترة قريبة من الفحص .

هذا في حالات ايقاع الكشف على الأحياء أما في حالات الوفيات نتيجة الاجهاض غير المشروع فإن البينة الطبية تتجاوز البينات السابقة الي التحري عن علامات ومضاعفات الاجهاض وسبب الوفاة تشريحاً ومخبرياً وبالتشريح يتبين للطبيب حجم الرحم وعلامات الحمل فيه ومكان انغراس المشيمة فيه وعلامات الشدة الواقعة عليه .

وعلى الرغم مما ورد في قانون العقوبات الأردني من منع للإجهاض بشتى انواعه واسبابه وخاصة فيما يتعلق بالجنين مثل التشوهات الخلقية او تعرض الحامل للأشعة او لأمراض معدية قد تسبب في تشوه الجنين إلا أن قانون الصحة العامة والدمستور الطبي الأردني سمح بنوع واحد من الاجهاض وهو الاجهاض العلاجي والذي يشكل فيه استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل أو صحتها .

فقد جاء في نص المادة من قانون الصحة العامة على أنه :

- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل أو

اجراء عملية اجهاض لأي حامل وإنما يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار توليد مرخصة اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت او للمحافظة على صحتها شريطة :

١. ان يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل بإجراء العملية وفي حال عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق فتأخذ هذه الوثيقة من زوجها او المسؤول عنها .

٢. ان يشهد طبيبان مرخصان على أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها .

- على المسؤول عن المستشفى او دار التوليد ان يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها وان يحتفظ بمدة عشر سنوات بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين .

- وعلى الرغم مما ورد في قانون العقوبات لا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص او الاشخاص الذين أجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض وفقاً لما تقدم انهما اقترفوا جريمة اجهاض .

وأما قانون نقابة الأطباء فقد نص على أنه :

- يحظر على الطبيب اجراء الاجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل ويشترط حين إذن :

١. ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر في مستشفى مرخص .

٢. ان يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة بالإجهاض .

٣. ان ينظم منه اربع نسخ او أكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة وزوجها او وليها وتحفظ نسخة في ملف المريضة .

٤. اذا رفضت الحامل اجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتنال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها .

ومما سبق يتبين ان هناك حالات ضرورية ويسمح فيها اجراء الاجهاض العلاجي وفي هذا السياق هناك موضوع مهم جداً قد يثار وهو ما المقصود في قانون الصحة العامة المحافظة على صحتها .

فالصحة وحسب التعريف الطبي لا تشمل فقط الصحة العضوية وإنما تشمل ايضاً الصحة النفسية وقد يسأل شخص ما ألا يؤثر الحمل على نفسية المرأة وصحتها النفسية اذا كان اصلاً الحمل غير مشروع ، وخاصة اذا كان الحمل نتيجة حالة اغتصاب او سفاح وكيف تكون حالة المرأة النفسية اذا عرفت وخلال مراجعاتها الدورية عند الطبيب المعالج ان الجنين في بطنها مشوه. لذلك اننا نرى انه من الواجب توضيح هذا الأمر وإعادة تفسير القانون وحسب التعريف العام للصحة .

ومن المعروف ان ما قصد به في قانون الصحة العامة (المحافظة على صحتها) الصحة البدنية العضوية وهي الأمراض التي قد يسببها الحمل او يسارعها وايقافها مثل الاصابة بارتفاع الضغط والزلال اثناء الحمل وهو ما يسمى بتسمم الحمل (Tòxaemia) والإصابة بالسكري اثناء الحمل بشكل يهدد فيه حياة الأم او ان تكون الحامل مصابة بأمراض مزمنة سابقاً لا يسمح فيها بالحمل بسبب تأثيرها وتفاقمها اثناء الحمل كل ذلك امر مقنع وضروري لإجراء الاجهاض العلاجي .

أما حالات الشروع بالاجهاض فإن القانون لا يلاحقها وذلك لعدم ورود نص في ذلك وإنما اشترط القانون حدوث الاجهاض كاملاً حتى يصبح جريمة تلاحق من قبل القانون .

الوحدة السابعة
الموت

- تعريف الموت .
- انواع الموت : أ - الموت الظاهري او الحياة المعلقة.
- ب- الموت السريري .
- جـ- الموت الحقيقي .
- تشخيص الموت .
- علامات الموت المبكرة .
- علامات الموت المتأخرة .

الموت

تعريف الموت :

من الصعب وضع تعريف خاص بالموت وذلك لما يترتب عليه من آثار كثيرة ذات أهمية وحساسية اجتماعية وحقوقية، فالسر الإلهي للروح ما زال أمراً غير معروف فيقول عز وجل : « قل الروح من أمر ربي » وقد اختلف العلماء والأطباء على تعريف الموت إلا أنه من المتفق عليه ما يلي :

« ان الموت هو توقف الجهاز العصبي واجهزة الدوران والتنفس عن العمل دونما رجعة » .

ويقسم الموت الى ثلاث انواع وهي :

١ . الحياة المعلقة أو (الموت الظاهري) :

وهي عبارة عن حالة خاصة تنخفض فيها الوظائف الفسيولوجية الجسمانية للأجهزة المختلفة الى أدنى حد يمكن ان تدوم معه الحياة .

فتضع الطبيب في حيرة من حيث التشخيص فقد لا يستطيع قياس الضغط الشرياني ولا يستطيع سماع دقات القلب أو الاحساس بالنبض في منطقة الرسغ أو الاماكن الأخرى لقياس النبض كما وأنه لا يلاحظ حركة الصدر والبطن التي تحدث اثناء التنفس ولا يستطيع سماع الشهيق والزفير بواسطة السماعة الطبية في الصدر وكذلك تندنى المنعكسات العصبية الى أدنى درجاتها وقد لا تظهر للطبيب اثناء الفحص السريري .

وقد يحدث الموت الظاهري ارادياً كما هو الحال عند بعض المسنين المصابين بأمراض عقلية او عصبية وقد يحدث لا إرادياً كما هو الحال عند الأطفال حديثي الولادة حيث يشاهد عند المولود لتوه فلا يدي المولود علامات الحياة ولو ترك بعض دقائق بدون انعاش فإنه سيموت . وقد يحدث

كذلك في حالات الغرق بالماء، وفي حالات الصعق الكهربائي، وحالات الارتجاج الدماغي ولذلك فإن مثل هذه الحالات تحتاج الى الإنعاش السريع والمستمر ويجب الاستمرار في الانعاش دون كلل او ملل او فقدان الأمل ولمدة ساعات تصل الى اربع او ست ساعات وهناك كثير من الحالات الواقعية تم اسعافها وانعاشها وعادت الى الحياة دون تخلف اي عاهة او اعاقا وعاش اصحابها بعدها حياة طبيعية .

واذكر على ذلك واقتتين حدثتا في الولايات المتحدة الأمريكية مع اطفال، الأولى وكان يبلغ من العمر سنتين غفل الأهل عنه فوقع في بركة السباحة وبعد فترة تجاوزت الربع ساعة انتبه الأهل اليه وشاهده والده في الماء فأسرع الوالد الى انتشاله من الماء وفي نفس الوقت كانت الوالدة قد طلبت الاسعاف الفوري وقام والده بإجراء الاسعافات الأولية حتي وصل الاسعاف وكان الطفل في حالة موت ظاهري لا يظهر عنده تنفس ولا يسمع نبضات القلب وبأمر المسعفون بإجراء عملية انعاش مباشرة وتم نقله الى المستشفى مباشرة وهناك استمرت الاجراءات الطبية العلاجية الإسعافية .

وبعد حوالي اربع ساعات عاد التنفس الى طبيعته وبدأ النبض يحس في الشرايين ثم بعد حوالي ثمانية ساعات بدء يستعيد وعيه واستمر تحت العلاج داخل المستشفى حتى شفي تماماً وأعيد تأهيله وعاد الى المنزل وعاش حياة طبيعية في كنف عائلته وتسمى مثل هذه الحالات في الغرق (Near Drawing) .

اما القصة الثانية قد حدثت اثناء لعب الاطفال بالكرة في موسم الشتاء بجانب بحيرة سطحها متجمد واثنا ذلك قذف احد الأطفال الكرة فوق سطح البحيرة واسرع احدهم خلفها لالتقاطها وحين وصل بالقرب منها غطس بالماء امام أعين زملائه واختفى عن الانظار داخل البحيرة وعندها صرخ الأطفال طالبين النجدة واسرع الناس الذين كانوا في الجوار الى الاتصال بفرق الاسعاف والدفاع المدني وقد وصلت هذه الطواقم الى المكان بعد عشرين

دقيقة بدء الغطاسون البحث عنه في داخل البحيرة وبعد حوالي نصف ساعة تم انتشاله من الماء مباشرة وقاموا بمحاولة إنعاشه فقاموا بنقله الى المستشفى مع استمرار الانعاش وقد استمرت هذه المحاولات حوالي ست ساعات وبعدها استعادت الأجهزة الحيوية بالجسم عملها مع بقائها في حالة غيبوبة وبقي على هذه الحال مدة ثلاثة ايام بعدها استعاد نشاطه وعاد بعدها الى ممارسة حياته على طبيعتها .

وكثيراً ما تطلعتنا الصحف اليومية بأن شخص توفي وعاد بعدها الى الحياة . وقد يعلن الاطباء وفاة شخص ما ويتم نقله الى غرفة الموتى وهناك نسلم بأنه عاد الى الحياة، وهناك الكثير من هذه الوقائع الحقيقية التي حدثت في بلادنا وربما سمعنا بها عن قرب وخاصة في القرى التي لا يوجد فيها طبيب ويعلن عن وفاة شخص ما وعند غسله يستعيد وعيه ويعود الى الحياة .

واذكر قصة حدثت في إحدى القرى الأردنية حيث اعلن عن وفاة شخص من اهل القرية واجتمع الناس والأهل وقاموا بتغسيله ثم تكفينه وفي هذه القرية كانت المقبرة عبارة عن قبور على شكل مغارة وتسمى بالعامية (القمصية) وقاموا بوضعه في قبره وعادوا الى القرية وقاموا بتعزية أهل الميت ومواساتهم وبعد العشاء ذهب كل الى بيته وفي هذه الاثناء استيقظ الميت ونظر الى نفسه فعرف ما حدث به فدفع غطاء المغارة برجله وخرج من المقبرة وعاد الى منزله وهناك أخذ يقرع الباب واشتد عليه البرد فرد اهل البيت من الطارق فأجاب أنا فلان فصعق الأهل من الخوف وقالوا فلان قد مات فقال لهم افتحوا الباب فسوف اشرح لكم ما حصل وقد عرفوه من صوته ففتحو الباب له وعاد الى بيته وعاش بعدها عشرة سنوات ثم مات ودفن .

من خلال ما استعرضنا من وقائع تبين لنا اهمية تشخيص الوفاة والتأكد منها قبل الدفن وهناك كثير من الناس وفي اثناء الصدمة بحدوث الوفاة يتشككون بأن الميت ربما لم يميت ودفن حياً .

٢. الموت السريري

وهذه المرحلة تتبع عادة الوفاة الظاهرية ويتوقف الجهاز العصبي عن العمل دون رجعة وقد يتبعه بعد ذلك بقية الأجهزة، جهاز تلو الآخر حتى يحل الموت الحقيقي .

وقد يحدث كذلك مثل هذا النوع من الموت وحالات الاصابات والأمراض الدماغية والعصبية مثل حوادث السير والسقوط او اصابة الدماغ بالتنزيف او التلف نتيجة نقص الاوكسجين العوز الاوكسجيني الدماغى او في حالات التسمم بالكحول او المخدرات مما يؤدي بالنهاية الى موت الدماغ مع بقاء الاجهزة الاخرى تعمل ارادياً او بواسطة الأجهزة الطبية الانعاشية وهذا النوع من الموت هو الأنسب لعمليات نقل الأعضاء وزراعتها ويتم النقل وزراعة العضو وفقاً لقوانين الانتفاع بأعضاء جسم الانسان رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٧ فقد نصت المادة الخامسة على ما يلي :

— للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي ويكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية :

أ. اذا كان المتوفى قد اوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية .

ب. اذا وافق احد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل او وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأبوين .

جـ. اذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب احد بجثته خلال ٢٤ ساعة من الوفاة على ان يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام .

المادة السادسة : للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى ونزع اي من اعضائه اذا تبين ان هناك ضرورة علمية لذلك على ان يكون المتوفى قد وافق على ذلك خطياً بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، او بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة .

المادة السابعة : لا يجوز ان يؤدي نقل عضو في اي حال من الحالات الى احداث تشوه ظاهري في جثة المتوفي يكون فيها امتهان لحرمة المتوفي .

المادة الثامنة : لا يجوز فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي، ويشترط بذلك ان يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل .

المادة الثانية فقرة - ب - : اذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفي لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف الجريمة فإنه يسمح له بنزع القرنية منها وذلك وفقاً للشروط التالية :

- ١ . ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين .
- ٢ . ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفي خطياً دون اكراه .
- ٣ . لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي بقصد الربح .

بناءً على ذلك نستنتج ما يلي :

يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع ان يؤذن باستئصال قرنية العين منهما خلال ثلاثة ساعات من وقت الوفاة اذا استوفيت اي من الشروط التالي :

- ١ . ان يكون المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل الخطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية .
- ٢ . اذا وافق احد ابوي المتوفي في حالة وجودهما على النقل او وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأبوين .
- ٣ . اذا كان المتوفي مجهول الهوية ولم يطالب احد بجثته خلال (٢٤ ساعة) بعد الوفاة على ان يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام او الطبيب الشرعي .

٣. الموت الحقيقي (موت الخلايا) :

وفي هذه المرحلة تتوقف جميع اجهزة الجسم الحيوية عن العمل دون القدرة على العودة الى عملها ذاتياً ويتوقف كذلك كل نشاط حي في وحدة تركيب الجسم وهي الخلية، وتظهر علامات الوفاة المبكرة ويتبعها العلامات المتأخرة او التغيرات الرمية الاخرى التي تظهر بعد الوفاة .

وفي هذه المرحلة من الوفاة لا يصلح فيها نقل الاعضاء من جسم الميت الى جسم الحي سوى قرنية العين وذلك خلال ستة ساعات من حدوث الوفاة وفي بعض الحالات قد تبقى صالحة حتى بعد مرور عشر ساعات اذا كانت العينين مغلقتان بعد الوفاة وتم حفظ الجثة في الثلجة مما يحافظ على صلاحية القرنيات .

٤ التغيرات الرمية والمغزى من تفسيرها :

تنقسم التغيرات الرمية او علامات الوفاة الى نوعين الأول وهي :

١- العلامات المبكرة (غير اكدية في تشخيص الوفاة) :

أ. الإرتخاء الرمي الأول : وهي ارتخاء عضلات الجسم وعدم استجابتها لأي من المؤثرات الخارجية وتعكس عادة توقف الجهاز العصبي عن العمل مما يؤدي الى شلل كامل في العضلات وانعدام المنعكسات العصبية المختلفة وعدم الاستجابة للألم والحرارة واللمس وغيرها .

ب. تغيرات العين : هناك تغيرات ايضاً تصيب العين ومنها توسع حدقتي العينين وعدم استجابتها للمنعكسات الضوئية او الحركية فتكون متوسعة وثابتة وبفحص العين من الداخل بواسطة منظار فحص العين (Oftalmoscop) يتبين وجود تقطع لمسار الدم في أوردة شبكية العين وتظهر هذه العلامة خلال عشرة ثواني بعد الوفاة وعند الضغط على كرة العين من الخارج فإن بقايا الدم في أوردة شبكية العين تختفي تماماً ولا تعود الى الظهور .

وكذلك يظهر جفاف قرنية العين وتعكر صفائها وخاصة اذا كانت الجفون مفتوحة ومعرضة للظروف الجوية ويحدث ذلك بعد مرور ثلاثة ساعات تقريباً في حالة العين المفتوحة ويحدث بعد ستة ساعات في حالة العين المغلقة تقريباً، وقد يستمر صفاء العين حتى مرور اكثر من عشر ساعات اذا كانت الجثة محفوظة بالثلاجة والعينين مغلقتين .

جـ. علامات توقف جهاز التنفس عن العمل : ويتم ملاحظة ذلك من خلال مراقبة حركات التنفس لعضلات الصدر والبطن فنشاهد ثباتها وعدم حركتها وكذلك من الممكن التأكد من ذلك بوضع ورقة على صدر المتوفى او بطنه وكذلك يختفي صوت الشهيق والزفير وذلك من خلال محاولة سماعها بواسطة السماعه الطبية فلا يسمع صوت الهواء بالصدر .
وعند وضع مرآة عند فتحة طاقتي الأنف والفم فإنه لا يحدث تكوين للبخار على المرآة .

د. علامات توقف جهاز الدوران والقلب عن العمل : يترتب على ذلك توقف النبض في الشرايين وعند محاولة احساس دقات القلب على الجهة اليسرى من الصدر باليد أو إحساس النبض في منطقة الرسغ أو الرقبة فإنه لا يتم إحساس أي نبض في الشرايين وعند محاولة سماع دقات القلب بواسطة السماعه الطبية فإننا لا نسمع شيئاً وكذلك عند إجراء تخطيط كهربائي للقلب فإن النتيجة تكون ظهور خط مستقيم وتختفي الموجات الكهربائية القلبية وليس من الضروري أن يتوقف القلب في حالة توقف التنفس ففي يستمر القلب في العمل في حين يكون التنفس قد توقف نهائياً ومثال ذلك ما يحدث في حالات الشنق القضائي فيتم توقف التنفس في حين يستمر القلب بالعمل لمدة قد تصل الى خمس عشرة دقيقة وان ظهور جميع هذه العلامات السابقة ليس امراً أكيداً على حدوث الوفاة ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تشخيص الوفاة فهناك اسباب كثيرة تظهر فيها مثل هذه العلامات للفاحص ولكنها تعود وتعمل وعليه فإنها تعتبر علامات غير اكيدة لتشخيص الوفاة .

٢- العلامات المتأخرة للوفاة :

هي العلامات التي تظهر على الجثة بعد مرور مدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً وهي :

أ. انخفاض درجة الحرارة :

تحتفظ الجثة عادة بحرارتها أو بالحرارة التي كانت عليها وقت الوفاة مدة ساعة إلى ساعتين بعد ذلك تبدأ درجة حرارة الجثة بالإنخفاض تدريجياً حتى تصل إلى درجة حرارة الجو المحيط بها حينها تتوقف عند هذه الدرجة وقد بين بعض العلماء ان الجثة تفقد (١,٥) درجة فهرنهايت تقريباً بالساعة حتى تعادل درجة حرارة الجو المحيط .

ويعتمد انخفاض درجة حرارة الجثة على عوامل عدة أهمها :

١. درجة حرارة الجسم قبل الوفاة :

فإذا كان هناك ارتفاع في درجة حرارة الجسم مثل حالات الحمى أو الانتانات المختلفة فإن انخفاض درجة الحرارة يكون بدرجة ابطأ من الحالات العادية .

٢. سبب الوفاة :

انتان الدم تكون فيه درجة الحرارة عالية وفي حالة التلج تنخفض فيه درجة الحرارة .

٣. المكان الذي توجد فيه الجثة :

مكان مغلق أو مكان بالعراء مكان مغطى أو مكان مكشوف كل ذلك له تأثير على مقدار فقدان درجة الحرارة .

وتعتبر درجة حرارة الجثة أكثر دقة واعتماداً في تقدير المدة التي مضت على الوفاة وتحديد ساعة الوفاة وقد بينت الدراسات العلمية الحديثة وجود معادلة لحساب المدة التي مضت على الوفاة اعتماداً على درجة حرارة الجثة وهي :

$$98,5 - \text{درجة حرارة الجثة بالفهرنهايت} = \frac{\text{عدد الساعات التي مضت على الوفاة}}{1,5}$$

ويتم قياس درجة حرارة الجثة شرجياً بواسطة ميزان حرارة خاص حيث يتم ادخاله الى عمق الشرج ويتم قياس درجة الحرارة مرة او مرتين كل ساعة ويمكن قياس حرارة الجثة كذلك تحت الكبد ٣-٥ دقائق لذلك يستفاد من قياس حرارة الجثة في تشخيص الوفاة وفي تقدير المدة التي مضت على الوفاة آخذين بعين الاعتبار العوامل الآتية الذكر وكلما كنا أقرب الى وقت الوفاة كلما كان تحديد المدة التي مضت على الوفاة ادق .

ب. الزرقة الرمية أو التلونات الانحدارية :

ويقصد بها التلون الذي يحدث بعد حلول الموت بزمن يسير في المناطق المنخفضة الحرة من الجسم تبعاً لوضعيته باستثناء مواضع الانكفاء في الجثة ويغلب على التلون في الاحوال الاعتيادية اللون الاحمر المزرق او البنفسجي . ويتنتج عادة هذا التلون او الزرقة الرمية عن ترسب الدم في الأوعية الدموية الدنيا حسب وضعية الجثة بفعل قانون الجاذبية العام وبخاصة الاوعية الدموية الدقيقة والشعيرات بما تسمح به مرونة جدارها بفترة الارتخاء الرمي الأولى بعد الموت .

ويظهر هذا التلون كذلك في باطن الجثة وفي الاحشاء والاعضاء الداخلية وبخاصة القلب والرئتين .

ويبدأ تشكل الزرقة الرمية وظهورها بعد مرور حوالي عشرون دقيقة الى نصف ساعة تقريباً على توقف القلب النهائي وتستمر بالظهور حتى تكتمل على شكل بقعة واحدة بعد مرور حوالي ٢-٤ ساعات وتثبت بعد مرور حوالي ٥-٦ ساعات تقريباً اذ قبل هذه المدة تكون مرنة وغير ثابتة اذ يمكن ان تتحول وتنقل من مكان الى آخر تبعاً الى تحرك الجثة والوضعية الموجودة عليها. ولذلك تظهر الأهمية الطبية القضائية للزرقة الرمية فيما يلي :

١- تشخيص الموت :

تعتبر الزرقة من اهم العلامات الأكيدة لتشخيص الوفاة مع العلم ان الزرقة الرمية قد تظهر في حالات نادرة اثناء الحياة في الساعات الاخيرة قبل الموت في بعض الامراض مثل الكوليرا والطاعون الاختناق وهبوط الكلى ويجب الانتظار عند حدوث الوفاة مدة نصف ساعة على الأقل قبل نقل الجثة من سريرها الى الغرفة السوداء حتى تظهر الزرقة الرمية ويتم التأكد من حدث الوفاة .

٢- تحديد المدة التي مضت عليها الوفاة وزمن الوفاة :

ويتم ذلك من خلال معرفتنا بالمراحل الزمنية التي تمر بها من حيث بدء ظهورها بعد عشرون دقيقة الى نصف ساعة واكتمالها بعد مرور ٣-٤ ساعات وثباتها بعد مرور مدة ٥-٦ ساعات تقريباً وكلما كنا اقرب الى ساعة الوفاة كلما كان تحديد الوقت ادق .

٣- تحديد وضعية الجثة بعد الموت فيما اذا تم تحريكها او العبث بها :

وذلك من خلال معرفة المدة التي تظهر وتثبت فيها الزرقة الرمية ومعرفة اماكن ظهورها في الاماكن المنحدرة او المنخفضة من الجسم باستثناء مواقع الانكاء ففي وضعية الاستلقاء العادي على الظهر تظهر على الجزء الخلفي للأطراف باستثناء منطقة الكتفين او اللوحين والإليتين .
 وفي حالة مشاهدتها في الاطراف من الأسفل فإن ذلك يدل على ان الجثة كانت في حالة تعليق مثل الشنق .

٤- اعطاء فكرة أولية عن اسباب الوفاة :

ويتم ذلك من خلال اللون المتميز للزرقة الرمية في بعض الحالات الخاصة

مثل تلونها باللون الوردي الباهت في حالات الاختناق والتسمم بأول أكسيد الكربون أو اللون الأحمر البنفسجي المسود فإنه يدل على الاختناق وقد يشاهد اللون الوردي أو الأحمر القاني في حالات التسمم بالسيانيد وتكون الزرقاء الرممية بلون باهت جداً قليلة الظهور في حالات فقر الدم الشديد أو النزف الشديد قبل الوفاة واللون القهوائي الغامق في حالة التسمم بكلوروات البوتاسيوم وبايكرومات البوتاسيوم والنيتروبنزين .

وقد يظهر كذلك اللون الوردي الفاتح في حالات البرودة الشديدة والغرق .

جـ. التيسس الرمي (الصمل الموتى) :

وهو التيسس والتصلب التدريجي الحاصل في العضلات الجسمية المختلفة ويبدأ عادة في العضلات الصغيرة وينتهي بالعضلات الكبيرة بالجسم ويشمل العضلات الخارجية والداخلية في الجسم وينتج هذا التيسس عن تفاعلات كيميائية معقدة تعتمد على مخزون الخلية من الطاقة المتمثلة في ثالث فوسفات الأدينوزين وتحوله إلى ثاني فوسفات الأدينوزين اللازم لانتقاس العضلات وتكوين الأكتومايسين الناتج من التحام مادة الأكتين مع الميوسين بوجود شوارد معينة خاصة كلوريد البوتاسيوم وانخفاض نسبة ثالث فوسفات الأدينوزين يؤدي إلى حدوث الصمل أو التيسس الرمي .

وكما ذكرنا سابقاً فإن التيسس يبدأ بالعضلات الصغيرة فيحل أولاً في عضلات جفني العينين فالوجه والكفين ثم اليدين والمرفقين فالركبتين والكفين ويبدأ ظهور التيسس الرمي على شكل مقاومة بسيطة عند ثني المفاصل بعد مرور ٤-٥ ساعات تقريباً حتى يكتمل ويتشرب ليعم الجسم بالكامل بعد مرور حوالي ١٠-١٢ ساعة تقريباً ويصبح الجسم اثنه بلوح خشبي أو معدني .

ويحمد ظهور واختفاء التيبس الرمي على عدة عوامل أهمها :

١- مخزون العضلة من الكلايوجين :

لذلك فإنه يظهر بشكل أسرع عند هزيلي البنية وعند الأطفال والنساء بشكل عام ويتأخر عند الأشخاص جيدي البنية كما انه يظهر بشكل أسرع عند الأشخاص الذين بذلوا مجهود عضلي قبل الوفاة منه عند الأشخاص المستريحين .

٢- درجة الحرارة :

يظهر التيبس الرمي بشكل أسرع في الجو الحار منه في الجو البارد وكذلك يظهر بشكل أسرع عند الأشخاص الذين سبب وفاتهم ارتفاع درجة حرارة الجسم اثر مرض خمجي او التهابي .

أما المغزى من تفسير التيبس الرمي فهو ما يلي :

١- تشخيص الوفاة :

فالصمل الموتى عند اكتماله يعتبر من العلامات الاكيدة لوقوع الموت الجسماني ودليلاً قاطعاً على حدوث الوفاة .

٢- تقدير المدة التي مضت على الوفاة :

ان معرفتنا بطريقة وزمن حدوث التيبس الرمي يدل على المدة التي مضت على الوفاة وذلك من خلال معرفتنا بأنه يبدأ بالتشكل بعد مرور حوالي ٤-٥ ساعات ويكتمل بعد مرور حوالي ١-١٢ ساعة ويثبت على هذه الحال ثم يبدأ بالتفكك والانحلال بعد ١٨ ساعة تقريباً حتى يعود ويرتخي الجسم ثانية بالإرتخاء الرمي الثانوي بعد مضي حوالي ٢٤ ساعة تقريباً ويخفئ التيبس الرمي بالتسلسل بنفس الترتيب الذي يظهر به في العضلات الصغيرة فالكبيرة .

٣- الحالة التي توفي عليها الشخص :

وذلك من خلال سرعة حدوث التيس الرمي في الاجهاد العضلي او
الاصابة ببعض الامراض وارتفاع درجة الحرارة .

التوتر الرمي او الاصمئلال الحيوي :

وهذه حالة خاصة يحدث فيها تيس رمي مفاجئ في مجموعة عضلية
واحدة نتيجة حالة من الانفعال العصبي والنفسي كأن تصيب عضلات اليد
المنقبضة على المسدس مباشرة في حالة انتحار سلاح ناري وقد نجد بعض
الاعشاب او الحصى والرمل في يد الغريق وقد يصيب التوتر الرمي كل
عضلات الجسم بالكامل وقد سجلت حالات من هذه النوع في الحرب
العالمية.

د. التعفن او التفسخ :

وهي عملية تحلل الانسجة الرقيقة واللينة في الجسم نتيجة الموت ويتم
ذلك بعمليتين :

١- التحلل الذاتي او التلقائي : وهي تحلل الانسجة اللينة نتيجة الحمائر
والانزيمات المختلفة داخل الخلية بعيداً عن اي فعل جرثومي ومثال ذلك
تحلل الجنين الميت داخل رحم الأم .

٢- التحلل الجرثومي : يتم غزو الجسم بعد الموت بالجراثيم المختلفة من خارج
وداخل الجسم ويعتبر الدم من افضل الاجواء الملائمة لنمو وتكاثر الجراثيم
وانتشارها في الجسم ويتم التحلل بهذه العملية من خلال عمليات كيميائية
معقدة والتي يتم من خلالها تحويل الانسجة الرقيقة اللينة الى سائل
وغازات بحيث تنتهي العملية بتحويل الجسم الى هيكل عظمي .
يبدأ العفن بالحلول عادة بعد مضي ٢٤-٣٦ ساعة في الطقس المعتدل

ويكون اسرع في المناطق الحارة الرطبة فقد يظهر خلال ساعات قليلة من الوفاة وفي المناطق الباردة فإنه يتأخر بالظهور وكذلك فإن التفسخ يحدث أسرع في الجثث المكشوفة في العراء منه في الجثث الموجودة في الماء ويتأخر ظهوره في الجثث المدفونة بالتراب .

وأول عمليات التفسخ هي ظهور بقعة بلون اخضر مسود في اسفل البطن في الجانب الأيمن ويرجع ذلك الى قربها من المصران الأعور (Ceacum) ثم ينتشر بشكل تدريجي الى كل البطن والصدر والرأس فالأطراف ويرافق ذلك انبعاث رائحة كريهة تغطي عليها رائحة غاز كبريتيد الهيدروجين ثم يتفخ الجسم بشكل تدريجي عام وترق وتتميع الطبقة الخارجية من البشرة خلال بضعة ايام حتى يسهل سلخ الطبقة السطحية لتظهر تحتها منطقة بلون احمر وسخ ورطب الملمس .

ويظهر على سطح الجلد فقاعات ويلاحظ احتقان الارعية الدموية على سطح البطن والصدر بلون اخضر وعلى شكل تشجرات تسمى بالتشجر الرمي .

وفي الاسبوع الثاني تسيل الأنسجة الرقيقة ويتفخ البطن والصفن والقضيب والثديان عند الأنثى مع جحوظ في العينين ويندفع اللسان من الفم والرحم عبر المهبل والمستقيم على القناة الاستيه وعبر الاست .

اما الاسبوع الثالث فإنه يسهل اقتلاع الاظافر والشعر بسهولة وتغير معالم الجثة من حيث اللون والشكل والمظهر الخارجي .

وتستمر عملية التعفن حتى تتحول الانسجة الرقيقة الرخوة الى سائل ثم ينكشف العظم وتتحول الجثة الى هيكل عظمي واثاء عملية التعفن هناك انواع من الذباب تضع بيوضها في فتحات الجسم المختلفة الرطبة التي تشكل بيئة مناسبة لنموها وتكاثرها حتى تفقس وتتحول الى بيضة ثم الى ذبابة وتفيد هذه الحشرات من خلال معرفة دوراتها الحياتية في تقدير المدة التي مضت على الوفاة في حال تعذر ذلك من خلال العلامات التفسخية وتقدمها .

العوامل التي تلعب دوراً في تعجيل أو في إعاقة التعفن :

- ١- الجراثيم : هناك نوعان من الجراثيم تلعب دوراً مهماً في عملية التفسخ وهي الجراثيم الهوائية واللاهوائية، وان وجود مثل هذه الجراثيم في الجثة يسارع في عملية التفسخ مثل حالات الانتانات وعدم وجودها يبطيء أو لا يظهر التفسخ الجرثومي مثل حالات الاجنة داخل الرحم .
- ٢- درجة الحرارة : من اهم العوامل التي تساعد على حدوث التفسخ وذلك من خلال تهيئة الجو المناسب لتكاثر ونمو الجراثيم في الجثة ونلاحظ ان الجثث المدفأة او الموجودة في اماكن حارة تتعفن بشكل اسرع من تلك الموجودة في اماكن باردة .
- ٣- الرطوبة والتيارات الهوائية : ان ارتفاع نسبة الرطوبة مع الحرارة والهواء يسارع في عملية التفسخ لذلك فإن الجثث في الهواء تتعفن بشكل اسرع من تلك التي توجد في الماء ومن ثم بشكل اقل من التي تكون مدفونة بالتراب.
- ٤- الانجماد : ان الانجماد يعيق عملية التفسخ من خلال إعاقة عملية التحلل الذاتي وإعاقة نشاط وتكاثر الجراثيم بالجثة لذلك فإن الجثث التي تكون في المناطق المتجمدة لا تتحلل ولا تتفسخ ابداً وتحتفظ الجثة بجميع معالمها وملامحها وما عليها من اثار شدة وعنف او اضرار طبية قضائية .

هـ. التحنيط الطبيعي :

ويقصد به حفظ الجثة من التفسخ بشكل طبيعي وذلك في الجثث التي توجد في ظروف جوية وبيئية معينة مثل ارتفاع درجة الحرارة بشكل مستمر وانخفاض الرطوبة وانعدامها مع وجود تيارات هوائية ساخنة وانعدام الحياة الجرثومية والخشيرية مما يؤدي الى جفاف الجثة من خلال عملية تبخر السوائل من داخل الجسم وحفظ الانسجة والتصاقها بالعظام .

وان أهم فائدة لهذه العملية حفظ ملامح الجثة وما بها من اضرار قضائية تفيد في عملية الاستعراف على الجثة وتشخيص الاصابات وسبب الوفاة فيها .
وهناك نوع آخر من التحنيط الصناعي وهو الذي يتم بتداخل طبي في لحفظ الجثة عن طريق حقنها بمادة الفورمالين في حالات نقل الجثث من بلد الى آخر .

و. التصبن او التشمع الشحمي :

وهي عملية تصبن شحوم الجثة من خلال درجة الحوامض الشحومية غير المشبعة وتحويلها الى حوامض مشبعة فتتحول من سائلة او شبه سائلة الى شحوم صلبة . وتحدث هذه الظاهرة في اجواء عالية الرطوبة وغالباً ما تحدث للجثث المتواجدة بالماء وتحافظ على ملامح الجثة مساعدة بذلك عملية الاستعراف على هوية الجثة وتحفظ ما بها من اصابات وأضرار قد تدل على ظروف الحالة القضائية .

ويبدأ عادة التشمع بالظهور بعد مضي حوالي أربع اسابيع ويظهر بشكل اوضح بعد فترة ١٢ اسبوع تقريباً ويكتمل بعد ٥-٦ اشهر او حتى السنة ويشمل التشمع كل الأنسجة الشحمية في الجسم .

• ملاحظة : من الممكن ان يشاهد في الجثة علامات التفسخ والتحنط والتشمع في آن واحد في بعض الحالات .

الوحدة الثامنة
موت الفجأة

- تعريف موت الفجأة .
- موت الفجأة المتوقع .
- موت الفجأة غير المتوقع .
- الأمراض التي تؤدي الى موت الفجأة .

موت الفجأة

كثير من الناس ومن الأطباء يصابون بالحيرة عند مواجهتهم حالة من حالات الوفيات المفاجئة ومن النواحي الطبية الشرعية فإن وفاة الفجأة تعتبر حالة قضائية اذا كانت تثير شبه جنائية . وتقسم وفاة الفجأة الى قسمين :

١. الموت المفاجيء المتوقع (Expected Sudden Death) .

وهذه الحالات تحدث عادة عند الاشخاص المصابين بأمراض معينة نتيجةها الحتمي هي حدوث الوفاة ولكن لا يعرف متى يحدث ذلك وان حدث في اي وقت ما فإنه يكون متوقعا وبعض الأطباء يكونون على علم بذلك فيقفون على اسباب المرض ويحذرون الأهل ويهأؤونهم لذلك ويخبروهم بأن هؤلاء الاشخاص معرضون للوفاة في اي لحظة ما حتى لا تكون صدمة لهم او مفاجأة وعند حدوث الوفاة كثير من الاطباء ومنهم المعالجون الذين هم على علم السيرة المرضية للمتوفى يخشون من تحرير شهادة وفاة او حتى كتابة تقرير يبين فيه الاسباب المؤدية للوفاة ولا يمكننا لوهمهم على ذلك وخاصة اذا نظرنا للأمر من النواحي القانونية القضائية إذ أن من الممكن ان يقوم اسنان بقتل شخص مريض ومتوقع وفاته في اية لحظة لأسباب شخصية وخاصة الطمع يارث مادي أو أي سبب آخر .

وكثير من الأطباء العامون ايضا وفي نفس الوقت يركبون خطأ فادحاً في هذه الاحوال اذ يقومون بتحرير تقرير طبي يشعر بوفاة الشخص المعني او يقومون بتحرير شهادة وفاة للتصريح بالدفن وبعضهم لا يقوم حتى من التأكد من وفاة الشخص او الكشف عليه وهذا خطأ طبي وقضائي وقد يعرض الطبيب نفسه للوقوع في المشاكل والمسائلة القضائية وعلى سبيل المثال أحب أن اورد مثلاً واقعياً على هذه الحالات (لقد قامت امرأة بزيارة طبيب عام في عيادته الخاصة وأخبرته ان زوجها قد توفي وأنها بحاجة الى تقرير طبي يبين فيه سبب الوفاة حتى لا يتم تشريح الجثة ويصرح بدفنه وأنها على استعداد لدفع

اتعاب الطبيب كامله فوافقها الطبيب وقام بتحرير تقرير طبي يشعر فيه بوفاة ذلك الشخص ويبين سبب الوفاة وأخذت هذه المرأة التقرير وقامت بدفع تعاب الطبيب الذي لم يكلف نفسه بالكشف على الجثة والتأكد أولاً من صحة وفاته وعدم وجود شبه جنائية وذهبت المرأة بعد ذلك الى الاحوال الشخصية وأصدرت شهادة وفاة زوجها وقامت بإجراء حصر ارث واجراءات قانونية اخرى تبين على اثرها بعد ذلك ان ذلك الشخص على قيد الحياة وان الزوجة قامت بهذه العملية حتى تستولي على مال زوجها مما أوقع ذاك الطبيب في مأزق ومسؤولية قضائية عوقب على أثرها) .

وهناك بعض الاطباء يقومون فعلاً بالكشف على جثة المتوفى وبعد التأكد في ان الوفاة قد حدثت فعلاً وبعد ان يتأكد للطبيب كذلك عدم وجود شبه جنائية ويطلع على السيرة المرضية للمتوفى يقوم بتحرير تقرير طبي يبين فيه حدوث الوفاة وأغلبهم يقع في هذا الخطأ وهو سبب الوفاة فأكثر الاطباء يكتبون في تقاريرهم ان سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس عن العمل وهذا خطأ اصبح شائع بين كثير من الاطباء فتوقف القلب والتنفس عن العمل تعتبر من علامات الوفاة الأولية التي ذكرناها سابقاً في مبحث الموت .

لذلك علينا ان نبين هنا عند وصف الوفاة لابد الأخذ بعين الاعتبار امور هامة وهي :

١- سبب الوفاة : (Cause of Death) وعادة يجب ان يكون السبب الحقيقي للوفاه مرضي يكون الطبيب على علم به مسبقاً وخاصة اذا كان الشخص المتوفى قيد العلاج وتحت الاشراف الطبي ويقوم بتحديثه وبيان هذا السبب بذكر المرض المؤدي للوفاه مثل احتشاء عضلة القلب او هبوط القلب او النزيف الدماغي او غيرها من الأمراض التي تؤدي فعلاً للوفاة . وقد يقوم الطبيب الشرعي ببيان سبب الوفاة في بعض الحالات اذا قام بالكشف على الجثة وتشريحها ويبين السبب الحقيقي للوفاه من المرض الذي يكشفه خلال التشريح ويسمى (Post mortem pathophysiology)

وبسبب حساسية التشريح ووقعها النفسي عند الكثيرين من الناس يمكن للطبيب العام او الاختصاصي المعالج ان يقوم بالكشف على الجثة وبعد ان يستبعد اية اسباب اخرى للوفاة او اية شبه جنائية ان يكتب في تقريره سبب الوفاة المرضي .

٢- **كيفية الوفاة (Manner of Death)** : وهي بيان فيما اذا كانت الوفاة حدثت لأسباب طبيعية او غير طبيعية ونقصد بها ظرف الوفاة اذا كانت طبيعية لأسباب مرضية او غير طبيعية لأسباب عرضية او انتحارية او قتل .

٣- **آلية حدوث الوفاة (Mechanism of Death)** : وهي بيان الطريقة التي أدت الى الوفاة هل حدثت الوفاة على مراحل نتيجة حالة مرضية سابقة او حدثت فجأة لأسباب غير متوقعة (Unexpected sudden death).

٢. وفاة الفجأة غير المتوقعة (Unexpected Sudden Death)

وهنا احب ان اشير الى تعريف الموت المفاجيء بشكل عام وهي الوفاة التي تحدث بشكل مفاجيء لأسباب طبيعية عند اشخاص يدون ظاهرياً انهم اصحاء لا يعانون من أي مرض كان أو يكونون قد اصابوا او عانوا من حالة مرضية معينة ذات اعراض طفيفة غير ملفتة للنظر او الاهتمام .


وان وفاة الفجأة غير المتوقعة كثيراً ما تثير الشبهة الجنائية وخاصة مما ذكرت اعلاه غالباً ما تحدث عند اشخاص اصحاء وظاهرياً مما يستدعي بالمدعي العام او رجل القضاء الطلب من الطبيب الشرعي تشريح الجثة للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة واستبعاد الشبهة الجنائية واهم الأمراض التي تؤدي الى وفاة الفجأة عادة هي :

أ- امراض تتعلق بجهاز القلب والدوران

ان اكثر الاسباب المؤدية الى وفاة الفجأة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية واكثرها شيوعاً هي احتشاء عضلة القلب الناتج عن انسداد الشرايين التاجية


الرئيسية بالأثير وما بنسبة تزيد عن ٧٠٪ او بخثرة دموية واكثر الشرايين التاجية عرضة لهذه الأمراض هي الشريان التاجي الأمامي النازل الأيسر ومن ثم الشريان التاجي الايمن ومن اهم اسباب انسداد الشرايين التاجية ارتفاع الدهون بالدم وخاصة الكوليسترول ذو النوعية قليلة الكثافة LDH وغالباً ما تكون لها علاقة بالوراثة او بالتغذية .

كذلك من الاسباب المتعلقة بجهاز القلب اعتلال عضلة القلب (Cardiomyopathy) وهبوط القلب نتيجة ارتفاع توتر الضغط الشرياني وتضييق أو توسع الصمامات القلبية والتشوهات الخلقية بالقلب والتهاب عضلة القلب الحاد أو التهاب الغشاء التاموري المحيط بالقلب وغيرها من الامراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية مثل ام الدم (Aneurysm) .



احتشاء عضلة القلب

ناجمة عن انسداد الشريان التاجي بخثرة (جلطة) دموية



توسع وهبوط في الصمام المترالي



صمام صناعي في القلب في حالة وفاة فجأة

ب. الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي

هناك كثير من امراض الجهاز التنفسي قد تؤدي الى حدوث وفاة الفجأة واهم هذه الأمراض هي :

تضييق وانسداد المسالك التنفسية لاسباب مرضية مثل الحساسية والربو والأورام المختلفة وقد تكون هذه عادة ذات سيرة مرضية معروفة او غير معروفة وتكتشف بطريق الصدفة اثناء التشريح ومن الامراض الأخرى النزيف الرئوي الحاد نتيجة تمزق احدى الشرايين الرئيسية في الرئة او الامراض السرطانية التي تؤدي الى نزيف رئوي حاد ومفاجيء يصعب السيطرة عليه وغيرها من الامراض الرئوية كذلك من الاسباب كثيرة الشبوع وخاصة عند الاطفال هي الالتهاب الرئوي الحاد (Pneumonia) وكذلك عدم اكتمال نمو الرئتين عند الاطفال والتشوهات الخلقية في الرئتين وهناك امراض اخرى استرواح الصدر العرضي (Spontaneous Pneumothorax) نتيجة انفجار فقاعة هوائية مفاجئة وكذلك من الامراض الرئوية الشائعة التي تؤدي الى حدوث وفاة الفجأة هي الانصمام الرئوي او السدة الدموية او الدهنية في الاوعية الدموية الرئيسية للرئتين وتحدث عادة عند الأشخاص الذين يقضون فترة زمنية طويلة في حالة وقود في الفراش لاسباب مرضية او الأشخاص الذين يصابون بكسور في الأطراف السفلية او يتعرضوا الى مداخلات جراحية كبيرة وفي حالات الاجهاض وغيرها من الاسباب التي تؤدي الى انصمام الاوعية الدموية الرئوية بخثرة دموية او دهنية .

ج. امراض متعلقة بالجهاز العصبي

كذلك امراض الجهاز العصبي المؤدية الى وفاة الفجأة كثيرة الشبوع وتقع في الدرجة الثانية بعد امراض القلب وخاصة عند البالغين او كبيرى السن ومن اهم هذه الامراض :

النزيف الدماغى المفاجيء ويحدث هذا غالباً عند الأشخاص المتقدمين

بالسن والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وخاصة الذين يهملون في تناول العلاج وغير مسيطر على مرضهم طبيًا مما يؤدي إلى انفجار إحدى الأوعية الدماغية الدموية فجأة والذي في كثير من الأحيان يكون خارج عن السيطرة الطبية مما يؤدي إلى حدوث الوفاة . ومن اسباب النزيف الدماغى المفاجيء ايضا انفجار ام الدم (Berry Aneurysm) . وقد يحدث هذا عند الشباب وصغيري السن أما عند الشيوخ فهناك ما يسمى بام الدم المتعدد الناتج عن تصلب شرايين الدماغ (Atheroscleretic) Aneurysm .

ومن الأمراض الدماغية الشائعة ايضا كثيرة الحدوث هي الجلطات الدماغية او الخثرات الدموية في الأوعية الدماغية والجيوب السحائية وما يصاحبها من رزمة دماغية ضاغطة على المراكز الحيوية مما يؤدي الى وفاة الفجأة.

وكذلك هناك امراض اخرى منها ما يكون معروفاً وتم تشخيصه مسبقاً ومنه غير مكتشف او غير مشخص من قبل الاطباء ويكتشف بالتشريح مثل بعض الأورام الدماغية والتي تؤدي الى زيادة الضغط داخل الجمجمة مما يؤدي الى فتق اللوزتين الدماغية والمراكز الحيوية وحدث الوفاة اضافة الى ما يصاحبها من وذمة دماغية .

وهناك امراض اخرى قد تؤدي الى وفاة الفجأة مثل الصرع وخاصة في حالات النوبات المتكررة . كذلك فقد تحدث نوبات الصرع اثناء العمل في مكان مرتفع وتؤدي الى السقوط او تحدث اثناء السباحة او في اي ظرف آخر يؤدي الى حدوث الوفاة .

ومن الأسباب الدماغية الاخرى التهاب السحايا الدماغية والتهابات الدماغ وخاصة الفيروسية منها والالتهابات الفمجية الاخرى كالحجرات .

د. اسباب متعلقة بالجهاز الهضمي

كذلك هناك الكثير من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي قد تؤدي الى حدوث الوفاة فجأة وعادة يسبقها بعض لاعراض البسيطة غير الملفتة للنظر ومن اهم هذه الامراض :

التزيف المريئي او المعدي او المعوي المفاجيء الناتج عن وجود دوالي المريء او قرحة نازفة وتقرحات معوية او امراض سرطانية تؤدي الى نزيف مفاجيء بالجهاز الهضمي سرعان مما يؤدي الى حدوث الوفاة وقد يكون لذلك علاقة بأمراض الكبد وعوامل التخثر بالدم .

ومن الاسباب الاخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي انسداد الامعاء المفاجيء او التواء الامعاء الغليظة وإنفجار الامعاء والالتهابات الزائدة الدودية التي تؤدي الى انفجارها والتهاب الغشاء البيرتوتي وتسمم الدم .

كذلك من امراض الجهاز الهضمي الخطيرة التهابات البنكرياس الحادة والأورام الخبيثة في الجهاز الهضمي وامراض الكبد المختلفة .

هـ. اسباب تتعلق بالجهاز البولي التناسلي

وكذلك امراض الجهاز البولي كثيرة وشائعة وقد تؤدي الى حدوث الموت المفاجيء ومن أهمها هبوط الكلى الحاد المزمن وانسداد المسالك البولية بالحصى وغيرها والامراض السرطانية والأورام المختلفة والتشوهات الخلقية بالجهاز البولي .

وكذلك اصابة الجهاز التناسلي بأمراض مختلفة وخاصة السرطانية ومنها مضاعفاتها تؤدي الى حدوث وفاة الفجأة .

وكذلك انفجار الرحم والحمل خارج الرحم وخاصة في قناة فالوب وانفجاره والتزيف المفاجيء المصاحب لهذه الأمراض .

و. اسباب عامة اخرى

هناك اسباب اخرى مرضية قد تؤدي الى حدوث الموت المفاجيء مثل امراض الدم المختلفة من اثانات الدم (Septicaemia) الى الامراض الخبيثة مثل سرطان الدم او الامراض الوراثية التي تؤدي الى تحلل الدم المفاجيء وفقر الدم الشديد (Anaemia) وغيرها من الاسباب مثل اورام او التهابات بعض الغدد الصماء واصابتها بالأورام السرطانية التي تزيد او تقلل من الهرمونات

الضرورية والتي تؤدي الى الوفاة المفاجأة وكذلك انواع من الحساسية المفرطة العامة .

- موت المهد او موت الفجأة عند الأطفال :

يعرف على انه الموت الذي يحدث عند الاطفال في سن الأربع شهور الى نهاية السنة الثانية من العمر نتيجة اسباب غير معروفة او غير مكتشفة ويتم تشخيصه بعد التشريح واستبعاد اية اسباب اخرى للوفاة ظاهرة مرضية او مخبرية وهذا النوع من الوفاة اجريت عليه دراسات كثيرة في دول مختلفة من العالم لمعرفة الاسباب الحقيقية التي تؤدي اليه ووضعت كثير من الفرضيات ومنها :

حساسية الطفل للحليب او الفصص بالحليب ومنها أيضاً الحساسية للغبار المتواجد في البيوت والغرف وبعضها ما يتعلق بالتركيب الوراثية للطفل وغيرها الكثير ولذلك سمي هذا النوع من الوفاة بمتلازمة الموت الفجائي غير المتوقع عند الأطفال (Sudden infant death syndrome) لذلك فإن وفاة الفجأة بشكل عام تعتبر من اهم المواضيع والتي يتعامل معها الاطباء والتي في النهاية تبين الأهمية الطبية للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة وبالتالي اجراء الدراسات العلمية اللازمة واتخاذ الاجراءات الوقائية مما يساهم في تقدم العلوم الطبية وتحقيق العدالة في حالة اثاره الشبهة الجنائية .

الوحدة التاسعة
الإختناق

- تعريف الاختناق .
- اسباب الاختناق .
- انواع الاختناق .
- كم النفس .
- الضغط على العنق .
- الغصص .
- الشرق .
- الشنق .
- رباط حول العنق .
- اسباب الوفاة بالاختناق .
- العلامات التشريحية للاختناق .

الاختناق "Asphyxia"

ويقصد بالاختناق القصور ونقص الاكسجين المعم الى مختلف انسجة خلايا الجسم وخاصة الجهاز العصبي حيث اكثر خلايا الجسم حساسية لنقص الاوكسجين هي الخلايا العصبية .

وأهم اسباب الوفاة في حالات الاختناق هي :

- ١- انسداد المسالك التنفسية : وهذا يؤدي الى عدم وصول الهواء والاكسجين الى الرئتين وبالتالي حدوث نقص الاكسجين المعم في خلايا الجسم وبالتالي حدوث الوفاة .
 - ٢- شلل عضلات التنفس : وهذا يؤدي الى توقف حركة الصدر وبالتالي عدم دخول الاوكسجين الى الرئتين .
 - ٣- انسداد الأوعية الدموية المغذية للدماغ : وخاصة في حالات الضغط على الرقبة بواسطة رباط حول العنق او بواسطة الشنق .
 - ٤- النهي العصبي : نتيجة الضغط على المركز السباتي في العنق مما يؤدي الى توقف القلب المفاجيء وحدوث الوفاة .
- وبعد ان تعرفنا على الأسباب المؤدية للوفاة في حالات الاختناق فإنه يسهل علينا دراسة انواع الاختناق واسباب الوفاة في كل حالة من هذه الحالات والمظاهر التشريحية لكل منهما وظروفها .

أهم أنواع الاختناق :

١- الخنق بواسطة كتم النفس :

يتم هذا النوع من الخنق بواسطة سد الفم والأنف باليد أو بأي أداة أخرى مثل مخدة أو منشفة أو التراب أو الماء وغالباً ما يكون هذا النوع من الخنق جنائياً ولكنها قد تكون كذلك عرضية خاصة في حالات السكر الشديد وسقوط الشخص على وجهه في التراب أو الماء أو أي جسم آخر يؤدي إلى سد الأنف والفم ولكن أغلب الحالات في هذا النوع تكون ظروفها جنائية حيث يقوم الجاني بسد الأنف أو الفم لضحيته بواسطة اليد أو أية أداة أخرى مثل المخدة في محاولة منه لإخفاء علامات الشدة والضغط على الفم والأنف .

وسبب الوفاة في مثل هذا النوع من الخنق هو عدم وصول الهواء والأكسجين إلى الرئتين وارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الدم مما يؤدي إلى اعتلال خلايا الجسم وخاصة الدماغ مما يؤدي إلى حدوث الوفاة .

أما بالنسبة للمظاهر التشريحية في الخنق بواسطة كتم النفس فتمثل في العلامات الموضعية والعلامات العامة .

العلامات الموضعية :

أغلب الحالات في كتم النفس يؤدي إلى حدوث سحجات وكدمات صغيرة حول الأنف والفم وخصوصاً إذا كان المجني عليه يستطيع المقاومة وكذلك يمكن مشاهدة كدمات داخل الشفتين بفعل ضغطها مع الأسنان . ويمكن تمييز السحجات حول الفم والأنف وخاصة إذا كانت ظفريه هلالية الشكل .

العلامات العامة :

١. إحتقان عام : يشاهد ان الجثة في حالة إحتقان عام وشديد نتيجة

نقص الأوكسجين في الدم وارتفاع ثاني أوكسيد الكربون وغالباً ما نشاهد هذا الاحتقان وبشكل اوضح في الوجه والرأس وتكون الزرقه الرميه محتقنه شديدة الظهور .

٢. ظهور بقع نزفيه نقطيه في ملتحمه العينين : فنلاحظ عند فتح العينين وقلب الجفون وجود بقع نزفيه واضحه في ملتحمه العينين داخل الجفون وهذه اكثر العلامات التي تشير شبهة الاختناق وتحدث نتيجة ارتفاع الضغط في الشعيرات الدموية الدقيقة مما يؤدي الى تمزقها وحدوث نزف على شكل بقع او نقط صغيرة .

٣. وجود بقع نزفيه عى الوجنتين : وعلى مقدم الصدر وقد نشاهد هذه البقع ايضاً في داخل الجثة عند تشريحها على سطح الرئتين وعلى سطح الغشاء التاموري .

٤. وجود احتقان في معظم احشاء الجثة الداخلية ومشاهدتها بشكل واضح عياناً ومجهرياً .

٥. وجود وذمه رئوية دماغية نتيجة نقص الأوكسجين المعمم .

٢- الخنق البدوي بالضغط على العنق

يتم هذا النوع من الخنق بواسطة الضغط على مقدم العنق باليد او بكلتا اليدين حتى تحدث الوفاة وفي مثل هذا النوع من الخنق فإن أهم اسباب الوفاة فيه تكون :

١. انسداد المسالك التنفسية العليا وعدم وصول الهواء والاكسجين للرئتين .
 ٢. النهي العصبي نتيجة الضغط على المركز السباتي . أما بالنسبة لظروف هذا النوع من الخنق فإنها دائماً تكون جنائية وأكثر ما نشاهدها في حالات القتل دفاعاً عن الشرف غسلاً للعار .
- وأهم المشاهدات والمظاهر التشريحية في هذا النوع من الخنق.

أ- وجود كدمات وسحجات على مقدم العنق وقد تكون ذات شكل هلالتي تعكس الأداء المسبب لها وهي الاظافر وقد تكون على شكل اليد حيث نشاهد اربعة سحجات في جهه يقابلها سحجة خامسة على الجهة المقابلة. وقد تكون هناك عدة سحجات متفرقة في حال محاولة المجني عليه ابعاد يد الجاني عن عنقه .

ب- وجود احتقان عام وشامل داخلي وخارجي وخاصة في الوجه والرأس .

ج- وجود بقع نزفية في الجفون من الداخل وملتحمة العينين وعلى الوجنتين وعلى مقدم الصدر .

د- وجود كدمات في داخل عضلات العنق عند التشريح حيوية .

هـ- وجود كسور في العظم اللامي وأكثر ما يحدث هذا الكسر في الخنق اليدوي بسبب الضغط المباشر والقوة المستخدمة على هذا العظم .

و- من الممكن مشاهدة كسر في الغضروف الدرقي .

ز- وجود بقع نزفيه داخلية على سطح الرئتين وغشاء التامور القلبي .

ح- وجود وذمة رئوية واحتقان شديد في احشاء الجسم . وتوسيع في الحويصلات الهوائية .

أما اذا كانت الوفاة سببها النهي العصبي فإن جميع هذه المشاهدات تكون معدومة وغير ظاهرة وذلك بسبب توقف القلب المفاجيء ويتم تشخيص الوفاة بالنهي العصبي بعد استبعاد أية اسباب اخرى للوفاة وبعد التأكد من ظروف الوفاة التي حدثت فيها .

٣- انسداد الفم من الداخل (الغصص) (Gagging)

وتحدث هذه الطريقة للإختناق نتيجة وجود جسم غريب داخل الفم

وغالباً ما يكون هذا النوع من الخنق جنائياً من حيث الظرف الذي يحدث فيه حيث يقوم الجاني بوضع جسم غريب داخل الفم ويدفعه بقوة في داخل الحلق حتى يندفع اللسان الى الخلف مما يؤدي الى حدوث وذمة في انسجة البلعوم مع الإفرازات اللعابية الزائدة مما يؤدي الى انسداد المسالك التنفسية العليا ومن الممكن ان تحدث مثل هذه الحالات بشكل عرضي وخاصة عند الأطفال والأشخاص المعاقين المتخلفين عقلياً حيث من الممكن ان يقوموا بوضع كميات كبيرة من الخبز في أفواههم ويقومون بدفعها الى الداخل مما يؤدي الى نفس النتيجة أما سبب الوفاة الرئيسي في مثل هذه الحالات يكون :

١ . انسداد مجرى التنفس وعدم وصول الأكسجين الى الرئتين ومن ثم باقي خلايا الجسم .

٢ . قد يحدث كذلك في مثل هذه الحالات نهي عصبي مما يؤدي الى توقف القلب المفاجيء ولكن بنسبة أقل من باقي انواع الخنق .

العلامات التشريحية

العلامات الموضعية :

في هذه الحالة يجد الطبيب الشرعي علامات العنف في داخل الفم والبلعوم وقد يجد آثاراً لشدة وعنف حول الفم وعلامات مقاومة على الوجه والتي تحدث من الضحية اثناء مقاومته للجاني وكذلك يشاهد الطبيب الشرعي عادة وجود جسم غريب في داخل الفم والبلعوم مع اندفاع اللسان الى الخلف بالإضافة الى وجود تكدمات في سقف الفم والحلق وذمة وإفرازات في داخل البلعوم .

العلامات العامة :

لا تختلف كثيراً عن العلامات التي نشاهدها في بقية انواع الاختناق مثل البقعة النزفية في العينين وجحوظهما وبقع نزفية على الوجنتين والوجه مع

احتقان الوجه ويقع نزفية على سطح الرئتين والقلب مع احتقان عام وشديد في معظم احشاء الجسم وزيادة ميوعة الدم بالإضافة الى وجود وذمة رئوية شديدة مع توسع في الحويصلات الهوائية .

٤- انسداد الحنجرة والقصبه الهوائية (الشرق) (Chocking)

ان هذا النوع من الاختناق يحدث نتيجة دخول جسم غريب الى القصبه الهوائية وغالباً ما يكون بشكل عرضي مما يؤدي الى انسداد المجاري التنفسية وخصوصاً مع زيادة الافرازات وتوادم المنطقة وقد يحدث انقباض مفاجيء للقصبه الهوائية مما يزيد التضيق والانسداد وبالتالي حدوث الاختناق وقد يحدث كثيراً ان يكون سبب الوفاة في مثل هذه الحالات نتيجة النهي العصبي اما بالنسبة للعلامات والمظاهر التشريحية فبالإضافة الى العلامات العامة من :

١ . احتقان الوجه وجحوظ العينين .

٢ . بقع نزفية في الجفون وملتحمة العينين والوجه والصدر .

٣ . احتقان شديد للاحشاء الداخلية وخصوصاً الرئتين وقد يكون هناك انكماش رئوي اذا حدثت الوفاة بشكل سريع ومفاجيء .

٤ . وذمة رئوية حادة مع بقع نزفية على سطح الرئتين مع توسع في الحويصلات التنفسية بالإضافة الى ذلك فإننا نجد الجسم الغريب في داخل القصبه الهوائية مع تفرح حول الجسم وذمة موضعية وافرازات مخاطية تحيط به .

٥ . الاختناق بالشنق (Hanging Suspension)

يتم الاختناق بالشنق بواسطة وضع رباط حول العنق غالباً ما يكون متحرك حتى يشتد ويزداد ضيقاً حول العنق ومن حيث الظروف التي يحدث فيها فهي اما ان تكون بقصد الانتحار وهذا الغالب في مثل هذه الحالات وقد تكون عرضية او تكون قضائية في حالات الاعدام بالشنق ومن الممكن ان



حالة شنق معلق

تكون جنائية في بعض الحالات وليس شرطاً حتى يحدث الشنق ان يكون الجسم في حالة وقوف تام فمن الممكن ان يحدث الشنق والجسم في حالة جلوس على الركبتين ويمكن الاستدلال على ظرف الحالة من خلال معاينة مسرح الجريمة ومعاينة الجثة في مكان حدوث الوفاة وبعد تشريحها واستبعاد اية اسباب سمية او عنفية اخرى ادت الى الوفاة ومن أهم المشاهدات التي يلاحظها الطبيب مايلي :

- ١ . طبيعة مسرح الجريمة بما في ذلك من فوضى وآثار العنف او وجود اعداد مسبق للإنتحار يستدل عليه من خلال رسالة الانتحار .

٢. وجود اية اربطة حول اليدين والرجلين او غيرها من اشياء على الجثة.
 ٣. وجود علامات شدة وعنف واصابات في الجثة .
 ٤. التاريخ والسيرة المرضية والسلوكية للمجني عليه من امراض نفسية وعقلية سابقة .
 ٥. وجود العلامات الحيوية للشنق وطريقة وضع الرباط حول العنق .
 ٦. استبعاد أية اسباب اخرى للوفاة وخاصة تحليل دم عن السموم والعقاقير المختلفة .
 ٧. ملاحظة الزرقة الرمية على الجثة وموقعها .
- أما بالنسبة لأسباب الوفاة لحالات الشنق فإنها تعود الى ما يلي :
- أ- انسداد الأوعية الدموية العنقية من شرايين وأوردة مما يمنع وصول الدم الى الدماغ وبالتالي احداث أذية نقص الأكسجين المعمم في الدماغ.
- ب- انسداد المسالك التنفسية نتيجة الضغط على العنق وعدم وصول الهواء الى داخل الرئتين .
- ج- النهي العصبي نتيجة الضغط على المركز السباتي العنقي .
- د- كسر فقرات العنق، تمزق او انقطاع النخاع الشوكي .
- هـ- قد يكون اكثر من سبب من الأسباب المذكورة مجتمعة .

العلامات والمظاهر التشريحية في الشنق

العلامات الموضعية :

١. الحز الرقبى (اثر الرباط حول العنق) : يلاحظ وجود أثر للرباط حول العنق عادة يكون على شكل حز رقبى واحد بلون بني يتجه بشكل مائل الى الأعلى باتجاه العقدة التي يكون الجسم معلقاً منها والتي


تكون عادة خلف الأذن أو على زاوية الفك أو في المنطقة القفوية من الرأس ويكون الحز واضحاً تماماً إلا في بعض الحالات التي تحدث فيها الوفاة بشكل سريع نتيجة النهي العصبي وفي حالة الارتكاز على الركبتين .

٢. وجود بعض السحجات حول الحز الرقبى نتيجة احتكاك الحبل مع الرقبة أثناء فترة النزاع وحركة المجني عليه أو محاولته توسيع أو شد الحبل عن العنق باليدين .

٣. وجود تكدم في انسجة العنق الداخلية تحت الجلد .

٤. وجود تمزق في بعض الحالات في الشرايين السباتية .

٥. وجود كسر مع خلع في الفقرات العنقية وتمزق النخاع الشوكي وخاصة في الشنق القضائي بسبب السقوط بقوة من مسافة عالية وفي هذه الحالات فإن علامات الخنق قد لا تكون ظاهرة بسبب سرعة حدوث الوفاة .



علامات موضعية ظاهرة بشكل واضح على العنق ناتجة عن رباط حول العنق

العلامات العامة :


١. احتقان الوجه مع تورم وجحوظ بالعينين وخروج اللسان من الفم .
 ٢. ظهور البقع النزفية في الوجه والعنق فوق مستوى الرباط .
 ٣. توقف إفراز اللعاب مباشرة مع توقف القلب عن العمل ووجود خروج لإفراز اللعاب يدل على أن الشنق حدث قبل الوفاة وهذه من العلامات الحيوية الهامة في الشنق .
 ٤. ازرقاق اطراف الأصابع في اليدين والقدمين .
 ٥. وجود الزرقة الرمية في الأطراف في اليدين والأطراف السفلية .
 ٦. وجود احتقان مع انتصاب القضيب والأعضاء التناسلية .
 ٧. وجود احتقان في جميع احشاء الجثة المختلفة .
 ٨. وجود بقع نزفية على سطح الرئتين مع وجود سائل أو زبد مدمم في القصيبات الهوائية .
- ومما سبق فإننا نلاحظ ان تشخيص الوفاة في الشنق يعتمد بالدرجة الأولى على التشريح ووجود علامات الشنق التي ذكرناها سابقاً مع استبعاد أية اسباب اخرى للوفاة .

٦- الحنق برباط حول العنق (Strangulation)

- يتم الاختناق في هذا النوع بواسطة شد رباط حول العنق بقوة ولمدة كافية لإحداث الوفاة وغالباً ما يكون الرباط حول العنق اكثر من دوره وبالنسبة لظروف الوفاة في هذه الحالة فهي دائماً جنائية ومن الممكن في بعض الحالات ان تكون بشكل عرضي ولكن في حالات نادرة اما بالنسبة للعلامات والمظاهر العامة والتشريحية فهي العلامات الموضعية :
١. اثر للرباط حول العنق على شكل حز أو أكثر رقبى وهو ما يسمى



صورة توضح الحز الرقبي وعلامات المقاومة



صورة توضح تمزق في الشريان السباتي

١. (Ligature Mark) ويعتمد ظهور هذا الأثر على طبيعة الجسم أي الرباط المستعمل فإذا كان ذو طبيعة قاسية فإنه يترك أثراً واضحاً أما إذا كان ذو طبيعة لينة فمن الممكن ان لا نشاهد او يكون الأثر بسيط بالكاد ان يلاحظ ويكون اثر الرباط بشكل اقوي عادة .
٢. وجود سحجات وجروح حول الحز اذا كان من النوع الخشن نتيجة احتكاك الرباط بالجلد ومحاولات الدفاع بواسطة اليدين .
٣. وجود تكدم في انسجة العنق تحت الجلد .
٤. ميوعة زائدة واسوداد في الدم .
٥. بقع نزفية على سطح الرئتين والسطح الخارجي للقلب .
- أ. بالنسبة لأسباب الوفاة بالخنق بواسطة رباط حول العنق فهي :
 ١. انسداد المسالك التنفسية الرئيسة .
 ب. انسداد الشرايين السباتية والأوردة الوداجية .
 ج. النهي العصبي .

٧- الاختناق بالضغط على الصدر (Traumatic Asphyxia)

ويحدث هذا النوع من الاختناق نتيجة الضغط بقوة شديدة على الصدر بشكل يمنع حركة الصدر مثل وقوع الصدر تحت الردم من صخور وأتربة أو أي جسم آخر مثل الجلوس على صدر شخص ضعيف لا يستطيع المقاومة وغالباً ما يكون مثل هذا النوع من الاختناق لأسباب عرضية ومن الممكن ان يكون في بعض الحالات لأسباب جنائية .

أما بالنسبة للعلامات والملاحظات فهي احتقان شديد مع تورم في الوجه مع وجود بقع نزفية في ملتحة العينين والعنق والجذع والأطراف وأما بالنسبة للعلامات الموضعية فيعتمد ذلك على طبيعة وشكل وحجم الجسم وشدة الضغط على الصدر .

وأما بالنسبة لسبب الوفاة في هذا الحالة فإنه يكون ناتج عن عدم القدرة على تحريك عضلات الصدر والعضلات التنفسية مما يؤدي الى انعدام وصول الهواء الى الرئتين وبالتالي الاختناق .

الوحدة العاشرة الفرق

- كيفية التعامل مع حالات الفرق .
- علامات الوفاة بالفرق .
- تشخيص الوفاة بالفرق .
- اسباب الموت بالفرق .

الغرق Drowning

من أهم المشاكل التي ما زالت تواجه الطبيب الشرعي هي حالات الوفاة التي يتم انتشالها من الماء وخاصة تلك التي تكون متعفنة أو التي أصابها التشويه أثناء وجودها بالماء مما قد تتعرض له من ارتطام بالصخور أو السفن أو الأسماك وغيرها من العوامل .

ومن هذه المسائل هي تحديد هوية الجثة والتعرف عليها ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة سواء كانت نتيجة الغرق أو غيرها .

والغرق غالباً ما يحدث بشكل عرضي ومن الأسباب أو الظروف الأخرى الرئيسية للغرق هي الانتحار ومن الممكن أن تكون بشكل أقل جنائية أما بالنسبة للمشاهدات والعلامات الظاهرية والتشريحية للوفاة بالغرق فإنها غير مخصصة (Not Specific) أي أنه لا دلالة لها أكيدة على الوفاة بالغرق إذ أن كل العلامات والمشاهدات قد تحدث لأي حالة وفاة توجد داخل الماء سواء كانت الوفاة قبل أو في لحظة الغرق أو بعد ذلك .

لذلك فإن تحليل سبب الوفاة بالغرق يكون ظرفياً واستنتاجياً بعد استبعاد أية أسباب أخرى للوفاة بعد التشريح وظهور نتائج الفحوصات المخبرية لاحقاً .

كيفية التعامل مع حالات الغرق أولاً : تحديد هوية الجثة .

ويتم التعرف على الجثة من خلال الأهل والأقارب الذين يقومون بالتعريف عليها في حالة كون الجثة حديثة الوفاة أما إذا كانت قديمة وقد أصابها التعفن والتشويه فيتم اتباع الخطوات التالية :

- أ. ضبط الملابس ومحتوياتها وفحصها .
 - ب. تقدير عمر الجثة .
 - جـ. تحديد الجنس من الأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية .
 - د. اجراء القياسات اللازمة للجثة من طول القامة وغيرها .
- و- اخذ البصمات وتحديد أية علامات فارقة اخرى من وشم او تشويه او آثار مرضية او عمليات جراحية او تداخلات علاجية للأسنان .

ثانياً : معرفة سبب الوفاة .

ويتم ذلك من خلال فحص الجثة بدقة وللبحث عن الأسباب الاصابية او المرضية او السمية وبعد استبعاد هذه الاسباب يتم البحث عن العلامات والملاحظات المعتادة في حالات الفرق كذلك من الممكن بيان اية اسباب ساعدت على حدوث الفرق مثل وجود مواد سمية او كحول او امراض الجهاز العصبي او القلب .

العلامات الخارجية للفرق

يقوم الطبيب الشرعي بتثبيت العلامات الخارجية والتحقق منها على الرغم من قلة اهميتها بالنسبة لتشخيص الوفاة بالفرق وأهم هذه العلامات ما يلي :

- ١- وجود زبد رغوي خارج طاقتي الأنف ومن الفم وقد يكون زبدًا ابيض أو مدمم .
- ٢- وجود تجاعيد في الجلد باليدين والقدمين .
- ٣- الزرقة الرمية تكون وردية اللون او باهتة وذلك بسبب برودة الماء .
- ٤- انتصاب الجلد ومساماته والشعر بما يشبه جلد الأوزة .

- ٥- تغير لون الجلد الى اللون البرونزي او البني القاتم في حالات التعفن .
- ٦- وجود اجسام مختلفة في يدي الفريق من اعشاب او اجسام اخرى :
في حالات التوتر الرمي .

والعلامات التشريحية ما يلي :

- ١- وجود وذمة رئوية وزيادة في حجم ووزن الرئتين .
 - ٢- وجود زبد رغوي في القصبات والقصبات الهوائية وبعض الامعاء المتواجدة في الماء ومن فضلات المعدة ومحتوياتها .
 - ٣- توسع النصف الأيمن من القلب .
 - ٤- زيادة ميوعة الدم ويميل لونه الى اللون القاتم .
 - ٥- امتلاء المعدة بالماء من المكان الذي حدث فيه الفرق .
 - ٦- وجود البلورات المائية في الرئتين والاحشاء الاخرى (Diatoms) .
 ٧. احتقان في معظم الاحشاء .
 ٨. قد نجد علامات التصبن في الجثة في حال مرور فترة زمنية على وجودها بالماء .
- ان كل هذه العلامات التي ذكرناها لا تدل بالضرورة على ان الوفاة سببها الفرق وإنما هي علامات مساعدة على تشخيص الوفاة بعد استبعاد اية اسباب اخرى للوفاة .

أما بالنسبة لأسباب الوفاة بالفرق فهي :

- ١- الاختناق الميكانيكي نتيجة دخول الماء داخل المسالك التنفسية والرئتين وتكون الوفاة بالماء العذب اسرع منها بالماء المالح وذلك بسبب تحلل الدم في الماء العذب وزيادة تركيزه في الماء المالح .

الوحدة الحادية عشرة
الطب الشرعي النفسي

- علاقة الامراض النفسية بالقانون .
- الامراض الذهانية .
- الأمراض العصابية .
- اضطراب الشخصية .
- التخلف العقلي .

الطب الشرعي النفسي

لقد تعددت وتنوعت الاختصاصات الفرعية للطب الشرعي لتشمل بالإضافة الى الطب السريري والمرضي الطب الشرعي للاسنان والسموم والامصال والبيطري والنفسي .

والطب الشرعي النفسي في الدول المتقدمة يعتبر من اساسيات القضاء فكثير من القضايا الجنائية يتم فيها استجواب المتهم من قبل الطبيب النفسي الشرعي وذلك للوصول الى الحقائق التالية :

- ١ . الحالة النفسية للمتهم وخلوه من الأمراض العقلية .
 - ٢ . مدى مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة .
 - ٣ . اهلية المتهم للمحاكمة او الإستجواب اولاً .
- وطالما اثرت مسائل نفسية في العديد من القضايا والجرائم المتنوعة سواء كانت متعلقة بالمتهم او متعلقة بالمجنني عليه .
- وهناك نصوص قانونية تعرضت لهذه المسائل نذكر منها على سبيل المثال:

مادة ٩١/ق.ع :

يفترض في كل انسان بأنه سليم العقل او بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس .

مادة ٢٩٢/ق.ع :

- ١ . يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً او تركها اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله او عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله .

٢. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبيه شفاؤه وانه لم يعد خطراً على السلامة العامة .

المادة ٢٩٣/ق.ع :

من واقع انثى (غير زوجة) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او عقلي او نفسي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات .

المادة ٢٩٧/ق.ع :

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه .

لذلك يتضح لنا اهمية الحالة العقلية والنفسية للمتهم او المجني عليه فإذا ثبت ان المتهم مصاب بمرض نفسي او عقلي يجعله لا يدرك كنه افعاله فإن ذلك يعفيه من المسؤولية والعقاب .

ولذا ثبت ان المجني عليها والمجني عليه في الاغتصاب او هتك العرض بعجز نفسي او عقلي فإن ذلك يكون من الظروف المشددة في ايقاع العقوبة حسب القانون .

ومن هنا تبرز أهمية الطب النفسي في الحالات الطبية القضائية . ولذلك من الواجب علينا ان نوضح المقصود بالأمراض النفسية وتصنيفاتها .

يقصد بالأمراض النفسية هي الامراض التي تؤدي الى اضطراب في التفكير والسلوك او العاطفه دون ان يكون هناك سبب عضوي في الدماغ او في انحاء الجسم الاخرى اي أنه اضطراب وظيفي وليس عضوي .

وهناك تصنيفات كثيرة للأمراض النفسية ولكن الشائع هو انها تقسم الى الأنواع الرئيسية التالية :

١- الأمراض الذهانية (Psychoses) :

وهي الحالات التي يكون فيها المريض فاقد البصيرة مع وجود هلاوس حسية (بالحواس الخمسة) مثل هلاوس سمعية فيسمع اصواتاً وأوهام فكرية (متعلقة بالأفكار) مختلفة قد تكون أوهام اضطهادية (زورقة) أو أوهام العظمة وهذه الحالات يرفض المريض فكرة انه مريض ويرفض المعالجة وأهم انواع هذه الأمراض هي :

- أ. داء الفصام العقلي (Schizophrenia) .
- ب. داء الهوس (Hypomania) .
- ج. داء الهوس الاكتيبي (Maniac Depression) .
- د. الاكتئاب الذاتي (Endogenous Depression) .

٢- الأمراض العصائية (Neuroses) :

وهي الحالات التي لا يكون فيها المريض فاقد للبصيرة ولا توجد هلاوس وأوهام وإنما حالات من الخوف والقلق والهلع واضطراب النوم مع اعراض جسمانية مختلفة كالرعدة والتعرق والخفقان واحمرار الوجه والرغبة في التبول . وهذا النوع من المرض يتردد على أكثر من طبيب من أجل تشخيص حالته وتخفيف مرضه ذلك لإدراكه بأنه مريض وأهم الحالات العصائية هي :

- أ. القلق النفسي (Anxiety neuroses) .
- ب. الاكتئاب الانفعالي (Reactive Depression) .
- ج. الوسواس (Obsession) :
وسواس تسلطي اذا لم ينفذ الفكرة
وسواس تصدي قهري اذا نفذ الفكرة
- د. الهستيريا (Hysteria) :
انقلابي يتحول من نفسية الى جسمية
انفصالي

٣- اضطراب الشخصية :

وهي الصفات التي تكون لدى الشخص يتصف بها وتميزه عن غيره وهي صفات وراثية بنسبة ٨٠٪ و صفات مكتسبة بنسبة ٢٠٪ وتكون هذه الصفات شخصية الانسان وقد تكون هذه غير طبيعية ولكن لم تحصل هناك انتكاسة مرضية نتيجة تعرض الشخص الى ظروف معينة تؤدي الى ظهور المرض بصورة واضحة ومن أهم هذه الحالات في اضطراب الشخصية :

أ. الشخصية الوسواسية : وهي حالة وسط بين المرض الطبيعي ولا يصرف الشخص على هذه الوسواس وقت كبير ولكن تحت ظروف معينة وتأثير معين قد تظهر اعراض المرض .

ب. الشخصية الفصامية .

ج. الشخصية العصابية .

د. الشخصية السايكوباتية : وهم الأشخاص الذين لا يستفيدون من تجربتهم القديمة فيكرر فعله باستمرار ويمكن وضعه بالسجن او المستشفى ويفضل ان يوضع بالسجن لأنه يستفيد اكثر ولا يستجيب للعلاج لأنها شخصية مورثة .

٤- التخلف العقلي :

وهي التي تصيب الأطفال منذ الولادة واغلب الحالات الوراثية تؤدي الى عدم نمو الدماغ بصورة كاملة وهذا يؤدي الى تأخر او توقف عملية الفهم لدى الأطفال فيصبح عمرهم العقلي اقل من عمره الحقيقي .

ومن انواع التخلف هي :

أ. التخلف العقلي البسيط : وهي التي يستطيع فيها الطفل الدخول الى الصف الرابع الابتدائي ويستطيع اجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة .

- ب. التخلف العقلي المتوسط : وفي هذه الحالة تكون هناك محدودية أكثر من الفهم وفي اجراء العمليات الحسابية من الحالة السابقة .
- ج. التخلف العقلي الشديد : وفي هذه الحالة يكون هناك اضطراب او عاهة جسمية واضحة مع التخلف العقلي ولا يستطيع المريض العناية بنفسه .

وتقاس درجة او عامل الذكاء حسب المعادلة التالية :

$$\text{درجة الذكاء (معامل الذكاء)} = \frac{\text{العمر العقلي}}{\text{العمر الحقيقي}} \times 100$$

والعمر العقلي يتم تقديره نسبياً بطريقة تقديرية .

ويصنف الناس حسب معامل الذكاء الى ما يلي :

- ١- الطبيعي = درجة ذكاء ٩٥-١١٥ ونسبتها ٧٠٪ من الناس .
 - ٢- فوق الطبيعي = درجة ذكاء ١١٥ - ١٣٠ ونسبتها ٨٪ من الناس .
 - ٣- عبقري = درجة ذكاء ١٣٠ - ١٤٥ ونسبتها ٢٪ من الناس .
 - ٤- أكثر من ١٤٥ ونسبته ١٪ .
- وأما بالنسبة لدرجة الذكاء في حالات التخلف فهي :
- ٧٠-٩٥ متخلف عقلي بسيط ٨٪ .
- ٥٠-٧٠ متخلف عقلي متوسط ٢٪ .
- أقل من ٥٠ - متخلف عقلي شديد ١٪ ويحتاج الى مستشفى خاص للتأهيل .

المراجع

- 1- Pathology Illustrated - Goran, Macfarlane / Callander.
- 2- Lecture, Notes of Pathology - A. D Thomson, R. E. Cotton.
- 3- Textbook of Medical Physiology - Guyton & HALL.
- 4- Basic Histology - L. Carlos Jungueira, Carneiro, Kelly.
- 5- Forensic medicine for lawyers - J.K Mason, CBE, MD FRC Path, DMJ Path.
- 6- Forensic Pathology - Bernard Knight, MD, MRCP, FRC Path, DMJ Path.
- 7- Paediatric Forensic Medicine and Pathology - J. K. Mason.
- 8- Fundamentals of Forensic Medicine - SAHAR M. KAMEL, MD.
- 9- Forensic Science - Geoffrey Davies.
- 10- Forensic Neuropatholgy - Jane E. Leestma, MD.
- ١١- مجموعة من اساتذة الطب الشرعي في كليات الطب - الطب الشرعي والسموميات بالجامعات العربية .
- 12- Practical Forensic Odontology - Derek H Clark, CSTJ, PHD.
- ١٣- الدكتور ضياء نوري حسن/ جامعة بغداد/ الطب القضائي وآداب المهنة: الاستاذ طارق شفيق نبيل. الاستاذ توفيق سالم. الاستاذ منير مزاوي.
- ١٤- ١٩٧٧ مجموعة التشريعات الجزائية .
- ١٥- قانون الصحة العامة الأردني .

١٦- (قانون نقابة الاطباء) الدستور الطبي الأردني .

١٧- قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان .

علم الأمراض والطب الشرعي



الدكتورة

مهسا أبو ياسين
إختصاصي علم الأمراض

الدكتور

محمود حسن الله
إختصاصي الطب الشرعي



Bibliotheca Alexandrina



1157634

الرواد والمرجع الأصديق للكتاب الجامعي الأكاديمي
دار زهران للنشر والتوزيع

تلفاكس: 0096265331289 ص.ب: 1170 عمان - الرمز البريدي: 11941
Email: zahran.publishers@gmail.com www.zahranpublishers.com

ZAHARAN
زهرا
للنشر
PUBLISHERS